



CENTRE RÉGIONAL DE PHYTOSOCIOLOGIE CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL

INVENTAIRE DE LA FLORE VASCULAIRE DE HAUTE-NORMANDIE (Ptéridophytes et Spermatophytes) : RARETÉS, PROTECTIONS, MENACES ET STATUTS

Version n° 2a / 26 septembre 2005



**Ministère de l'Écologie
et du Développement Durable**
Direction Régionale de l'Environnement
HAUTE-NORMANDIE



**Ouvrage réalisé avec le soutien de la Direction Régionale de l'Environnement de
Haute-Normandie et du Conseil Régional de Haute-Normandie**

**CENTRE RÉGIONAL DE PHYTOSOCIOLOGIE
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL**

INVENTAIRE DE LA FLORE VASCULAIRE DE HAUTE-NORMANDIE (Ptéridophytes et Spermatophytes) : RARETÉS, PROTECTIONS, MENACES ET STATUTS

Version n° 2a / 26 septembre 2005

Coordination scientifique : Benoît TOUSSAINT et Philippe HOUSSET

Conception et développement informatique : Alexis DESSE et David MARIEN

Direction scientifique : Frédéric HENDOUX

En collaboration avec le Collectif botanique de Haute-Normandie

Didier ALARD, Jacques BARDAT, Jérôme CHAÏB, † Charlie COOPER, Daniel DEROCK, Alain DESCHANDOL, Carine DOUVILLE, Jérôme DUMONT, Magali FONTAINE, Rémy FRANCOIS, Pierre-Noël FRILEUX, Éliane GUÉRY, René GUÉRY, Christophe HENNEQUIN, Philippe HOUSSET, Michel JOLY, Jean-Paul LEGRAND, Sébastien KEPKA, Christine LE NEVEU, Julien MARY, Philippe LÉVÊQUE, David PEIFFER, Cédric POUCHARD



**Direction Régionale de l'Environnement
HAUTE-NORMANDIE**



**Ouvrage réalisé avec le soutien de la Direction Régionale de l'Environnement de
Haute-Normandie et du Conseil Régional de Haute-Normandie**

INTRODUCTION

En 2000, la parution de la première version de l'« Inventaire de la flore vasculaire de Haute-Normandie (Ptéridophytes et Spermatophytes) : raretés, protections, menaces et statuts » marquait une évolution majeure dans la connaissance de la flore de cette région. Ce travail de synthèse organisé par le Centre Régional de Phytosociologie / Conservatoire Botanique National de Bailleul (CRP/CBNBL) était signé par le Collectif Botanique de Haute-Normandie sous la coordination scientifique de Vincent BOULLET, alors directeur scientifique du CRP/CBNBL, avec la collaboration d'Alexis DESSE.

En 2001, la Haute-Normandie a vu naître son antenne régionale du CBN que j'ai l'honneur et le plaisir de coordonner. La création de cette antenne, entre autres au travers de son activité d'inventaire, et la contribution des données floristiques apportées par le réseau de collaborateurs bénévoles ont permis de réaliser cette mise à jour du Catalogue floristique régional qui fait état de nouvelles observations floristiques pour la région, de taxons redécouverts et pour certains considérés longtemps comme disparus, d'autres en revanche n'ont pas été revus et une majorité ont vu s'affiner tout particulièrement la connaissance sur leur fréquence. Cette deuxième version s'imposait donc afin d'apporter à l'ensemble de la communauté des botanistes les fruits de ces nouvelles investigations.

Ce présent ouvrage est une nouvelle œuvre du Collectif Botanique de Haute-Normandie constitué depuis 1998, que j'ai eu le plus grand plaisir à animer durant ces quatre dernières années. Je tiens ici à remercier chaleureusement tous les membres du Collectif pour leur aide et leur enthousiasme à participer aux réunions (toujours longues et tardives !) au cours desquelles étaient débattues les différentes propositions de modifications de l'inventaire, le plus souvent en dégustant un excellent dessert préparé par l'un des membres du Collectif. Si je me dois de saluer plus particulièrement les plus « assidus » d'entre eux, Charlie COOPER, Carine DOUVILLE, Daniel DEROCK, Alain DESCHANDOL, Magali FONTAINE, René et Éliane GUÉRY, Christophe HENNEQUIN, Michel JOLY, Jean-Paul LEGRAND, Sébastien KEPKA (en remplacement de Michel DÉMARES), Christine LE NEVEU, Julien MARY, Philippe LÉVÊQUE et Cédric POUCHARD, tous les autres membres du Collectif dont certains sont aujourd'hui très éloignés de la Haute-Normandie ont, par la fourniture régulière de nombreuses données ou par des contributions plus ponctuelles, apporté leur pierre à la construction de ce nouveau catalogue. Cependant, l'année 2004 a été très douloureuse pour la communauté des botanistes avec la soudaine disparition de Charlie COOPER qui apportait, entre autres, une grande contribution à la connaissance des Graminées, Cypéracées et Joncacées de la région. Par ailleurs, le Conservatoire des Sites Naturels de Haute-Normandie en accueillant les réunions du Collectif dans ses locaux et en assurant une part de la logistique de ces réunions a largement contribué au bon déroulement du travail du Collectif et je tenais à l'en remercier très chaleureusement.

Par rapport à la version précédente de ce document, au-delà d'une mise à jour de la liste floristique et des coefficients régionaux de statut, rareté et menace, un important travail de mise en cohérence de certaines codifications a été réalisé (par exemple pour l'affectation des coefficients de menace DD et NE). Quelques évolutions notables, correspondant à des besoins, avis ou souhaits du Collectif et des utilisateurs du catalogue, ont également été apportées : hybrides non concernés par l'attribution d'un coefficient de menace (H), attribution de nom français au rang spécifique pour des espèces comportant plusieurs sous-espèces (seules nommées précédemment), définition de critères et d'une liste identifiant les « espèces d'intérêt patrimonial » et les « espèces invasives » ou « potentiellement invasives ».

Deux « chantiers » principaux ont concentré une part importante de la tâche de révision dont il convient de souligner le fastidieux « travail de fourmi » réalisé par mon collègue Benoît TOUSSAINT : la mise à jour taxonomique et nomenclaturale et la définition et l'application d'une nouvelle typologie de statuts d'indigénat et d'introduction.

La mise à jour taxonomique et nomenclaturale a été conduite afin de mettre en correspondance ce document avec l'ouvrage de détermination le plus utilisé dans le Nord de la France : la « Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines ». La précédente liste taxonomique de référence pour l'« Inventaire » correspondait, pour l'essentiel, à la 3^{ème} édition néerlandophone de cette flore (LAMBINON *et al.*, 1998). Avec l'édition, en janvier 2004, de la 5^{ème} édition francophone (LAMBINON *et al.*, 2004), de nombreuses modifications taxonomiques et

nomenclaturales sont venues, une nouvelle fois, bousculer nos habitudes et parfois nos certitudes... Même si certains botanistes regretteront qu'il faille désormais appeler le Chrysanthème des moissons « *Glebionis segetum* » ou que le genre *Scirpus* ait été « éclaté » en 6 genres différents, il nous a paru utile de tenir compte de ces évolutions pour l'édition de cet inventaire régional. Je tiens ici à remercier Ivan HOSTE, du Jardin Botanique National de Belgique qui nous a transmis l'index informatisé de la dernière édition de la Nouvelle Flore, ainsi que mon collègue Alexis DESSE qui a coordonné le délicat travail de comparaison et de mise à jour des index taxonomiques et organisé, plus généralement, le développement des outils informatiques liés à « DIGITALE », la base de données floristiques et phytosociologiques du CBN de Bailleul, sans lesquels le processus de révision n'aurait sans doute pu être mené à bien.

La typologie des statuts d'indigénat et d'introduction des plantes a subi un remaniement notable par rapport au système proposé par V. BOULLET dans la précédente édition. La nouvelle typologie est issue de la réflexion collective d'un groupe de travail composé de 4 botanistes du CBN de Bailleul (Benoît TOUSSAINT, Frédéric HENDOUX, David MERCIER et Philippe HOUSSET) et de 6 botanistes intéressés par ce sujet (Jacques LAMBINON, Frédéric DUPONT, Filip VERLOOVE, Daniel PETIT, Fabrice TRUANT et Guillaume DECOCQ). Une définition plus complète des critères d'attribution des différents statuts a été élaborée afin d'objectiver, tant que faire se peut, l'affectation du ou des statut(s) aux différents taxons. La catégorie précédemment nommée « Assimilé indigène » = Z (amphi- + archéonaturalisé) a notamment été profondément redéfinie (tant du point de vue conceptuel que terminologique). Bien entendu, dans ce domaine, aucun système n'est parfait et l'application de notre typologie s'est régulièrement heurtée à l'écueil des lacunes de connaissances.

Sur le plan de la présentation de ce document, afin d'en améliorer la lisibilité, nous avons opté pour une séparation, dans 2 nouvelles colonnes, des informations relatives aux usages culturels (nouvelle typologie) et à la fréquence culturelle. Les 6 colonnes relatives aux protections législatives ont été au contraire regroupées en une seule. Deux nouvelles colonnes identifient les « taxons d'intérêt patrimonial » et les « plantes invasives » ou « potentiellement invasives ».

Le bilan des modifications apportées ici par rapport à la version de 2000 montre combien le travail de terrain de tout le réseau de botanistes de la Haute-Normandie ainsi que la poursuite du travail d'informatisation et de valorisation des publications et herbiers historiques ou contemporains dans la base de données DIGITALE du CBN de Bailleul contribuent perpétuellement à accroître et affiner notre connaissance de la flore régionale :

- un peu plus de 150 taxons « nouveaux » (non notés à l'« état sauvage » précédemment), dont une quarantaine de plantes indigènes.
- un peu plus de 360 sont au moins concernés par une modification de leur indice de rareté et/ou de menace régionales (le statut a en outre souvent été révisé).

Mais ce bilan montre aussi toute l'humilité dont on doit faire preuve face à une telle entreprise d'inventaire de la flore d'une région. La flore évolue sans cesse, certaines espèces régressent (voire disparaissent), d'autres au contraire apparaissent, colonisent de nouveaux espaces et se répandent plus ou moins rapidement. Ce catalogue est donc, lui aussi, appelé à être prochainement révisé et nous recevrons avec gratitude toute remarque sur son contenu.

Je voudrais, pour terminer, adresser mes plus vifs remerciements à deux partenaires institutionnels du CBN de Bailleul qui soutiennent financièrement nos nombreuses missions d'inventaires, de recueil et de gestion de données (DIGITALE, Bibliothèque Botanique et Phytosociologique de France) et de conservation des plantes menacées sans lesquelles ce document n'existerait sans doute pas : la Direction Régionale de l'Environnement de Haute-Normandie (délégation régionale du Ministère chargé de l'Environnement, actuellement le MEDD) et la Région de la Haute-Normandie. Je n'omettrai pas de saluer ici le travail considérable d'inventaire mené dans les années 70 à 90 sur notre territoire régional par l'Institut Floristique Franco-Belge.

Ne doutons pas que ce nouveau catalogue floristique régional, qui s'inscrit dans la continuité du travail initié par Vincent BOULLET, constituera à son tour un outil majeur au service de l'évaluation et de la préservation du patrimoine floristique si malmené mais encore si riche de la Haute-Normandie.

Philippe HOUSSET (avec la contribution de Benoît TOUSSAINT)
Responsable de l'antenne de Haute-Normandie
Conservatoire Botanique National de Bailleul

LÉGENDES ET CODIFICATIONS

N.B. - Les intitulés des colonnes dans le catalogue sont indiqués entre crochets.

Colonne 1 - Famille [Famille]

La systématique suit la « Nouvelle flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines (J. LAMBINON *et al.*, 2004 - 5^{ème} édition) [en abrégé, FB5]. Les taxons sont rangés dans l'ordre alphabétique des familles. Les Ptéridophytes et les Gymnospermes sont listés avant les Angiospermes.

Colonne 2 - Taxon [Taxon]

Le champ systématique prend en considération l'ensemble des plantes vasculaires (Ptéridophytes et Spermatophytes) indigènes, naturalisées, subspontanées et adventices de la Région Haute-Normandie. Plus d'une centaine de plantes cultivées à des fins non strictement ornementales figurent également dans la liste.

Tous les rangs taxonomiques infraspécifiques [sous-espèce (*subsp.*), variétés (*var.*), formes (*f.*) et cultivars (' ')], sont pris en compte.

Dans le cas des genres *Rubus* et *Taraxacum*, seules les espèces effectivement signalées en Haute-Normandie ou dans les régions voisines sont mentionnées. De nombreuses autres restent néanmoins à rechercher.

La nomenclature principale de référence est celle de la « Nouvelle flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines (J. LAMBINON *et al.*, 2004 - 5^{ème} édition) [FB5]. La principale exception concerne le genre *Taraxacum* (référence : A.A. DUDMAN & A.J. RICHARDS, 1997 - Dandelions of Great Britain and Ireland).

Colonne 3 - Nom français [Nom commun]

Un important travail de standardisation des noms français avait été mené par Vincent BOULLET et proposé dans la version précédente de cet ouvrage.

Ce registre, s'inscrivant dans une perspective nationale, suivait le principe d'une nomenclature française unimodale et hiérarchisée autour des niveaux taxonomiques genre et sous-espèce (ou espèce à défaut). Cette construction française, proche dans son esprit du système taxonomique, impliquait un nom français unique pour chaque genre et une épithète (ou un complément de nom) unique pour chaque niveau de base, c'est-à-dire la sous-espèce quand ce niveau est représenté pour l'espèce considérée, ou, à défaut, l'espèce elle-même. Les principaux ouvrages de référence consultés ont été : LAMARCK & DE CANDOLLE (Flore française. 3^{ème} éd., 1805-1815), A. BOREAU (Flore du Centre de la France. 3^{ème} éd., 1857), M. GILLET & J.-H. MAGNE (Nouvelle flore française. 6^{ème} éd., 1887), G. BONNIER & G. de LAYENS (Tableaux synoptiques des Plantes vasculaires de la Flore de la France. 1894), E. LE MAOUT & J. DECAISNE (Flore élémentaire des jardins et des champs, 1855). Ils ont été complétés par des ouvrages plus récents à registre bimodal (nomenclature

française mêlant des noms français à structure taxonomique genre/espèce et des noms populaires), essentiellement : J. LAMBINON *et al.* (Nouvelle flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des Régions voisines. 4^{ème} éd., 1993) et D. AESCHIMANN & H.M. BURDET (Flore de la Suisse et des territoires limitrophes. « Le nouveau Binz », 1989).

Le nom français peut être accompagné entre crochets d'un (ou plusieurs) nom(s) commun(s) issu(s) soit du registre de noms vernaculaires, soit de registres complémentaires de noms français. D'une manière générale, ces noms communs ont été sélectionnés pour conserver un lien informatif avec le registre bimodal de la Nouvelle flore de la Belgique, dont l'expression territoriale est limitée par rapport à une problématique nationale de nomenclature française. Ce type de double information nom français unique / nom(s) commun(s) est également une présentation classique dans les flores françaises (voir références citées précédemment).

À l'usage, le registre standardisé a montré ses limites. Outre le fait que de nombreux noms français de genre, ou encore d'hybrides, soient totalement inusités (ex. : Ptéridion aigle pour la Fougère aigle), l'absence de nom français pour les espèces qui présentent une ou plusieurs sous-espèces (qui sont seules nommées) posait problème lorsqu'il s'agissait de nommer une plante déterminée au rang spécifique. Cet inconvénient avait d'ailleurs été souligné par l'auteur.

En outre, en cas d'innovation nomenclaturale liée à la reconnaissance de genres nouveaux, et donc en l'absence de tradition française pour ces genres, fallait-il en créer de toute pièce (ex : nouveau traitement du genre *Scirpus* scindé en *Bolboschoenus*, *Schoenoplectus*, *Isolepis*, *Trichophorum*...) ?

En définitive, dans l'attente d'un éventuel travail national d'homogénéisation sur ce sujet, nous avons opté ici pour une formule pragmatique permettant de pallier, au moins partiellement, les imperfections du registre de V. BOULLET sans pour autant en remettre en cause le principe :

- les espèces pour lesquelles une ou plusieurs sous-espèces sont signalées dans le référentiel porteront le nom français de la sous-espèce type suivi, entre parenthèses, de la mention « s.l. » (*sensu lato*)

ex. : *Pastinaca sativa* L. = Panais commun (s.l.) [Panais] *Pastinaca sativa* L. subsp. *sativa* = Panais commun
Helleborus viridis L. = Hellébore vert (s.l.) *Helleborus viridis* L. subsp. *occidentalis* (Reut. Schiffn) = Hellébore occidental

- en cas d'innovations nomenclaturales, le nom français usuel est proposé seul, entre crochets.

ex. : *Bolboschoenus maritimus* L. = [Scirpe maritime]
Persicaria maculosa S.F. Gray = [Renouée persicaire]

Les différentes variétés (var.) et formes (f.) d'une même sous-espèce ou espèce étaient jusqu'alors dépourvues de nom français (et non reportées, sauf exceptions, dans la précédente version publiée de ce document). Elles porteront ici celui du taxon nommé de rang supérieur, avec entre parenthèses l'abréviation du rang taxonomique inférieur considéré.

ex. : *Pimpinella major* (L.) Huds. var. *bipinnata* (G. Beck) Burnat = Boucage élevé (var.) [Grand boucage]
Solanum nigrum L. subsp. *nigrum* var. *nigrum* f. *chlorocarpum* (Spenner) Lindm. = Morelle noire (f.) [Crève-chien]

Colonne 4 - Statut Haute-Normandie [Stat. HN]

Sous la coordination du CBN de Bailleul, un groupe de botanistes issus des différents Collectifs botaniques régionaux (B. TOUSSAINT, J. LAMBINON, F. DUPONT, F. VERLOOVE, D. PETIT, F. HENDOUX, D. MERCIER, P. HOUSSET, F. TRUANT et G. DECOCQ) a élaboré en 2002 et 2003 une nouvelle typologie de statuts d'indigénat ou d'introduction des plantes. Un des objectifs de ce travail était d'identifier, le plus clairement possible, chacune de ces catégories de statut par rapport aux autres. De nouvelles catégories ou terminologies sont également proposées.

I = Indigène

Se dit d'une plante ayant colonisé le territoire pris en compte (d'indigénat) par des moyens naturels ou bien à la faveur de facteurs anthropiques, mais, dans ce dernier cas, présente avant 1500 après JC (= archéophytes). Les plantes dont l'aire d'indigénat est incertaine et qui étaient déjà largement répandues à la fin du XIX^e siècle seront, par défaut, considérées comme indigènes.

On inclut également dans cette catégorie, les plantes « Néo-indigènes », c'est-à-dire :

- apparues plus ou moins récemment (généralement après 1900) et spontanément dans le territoire mais présentes à l'état indigène dans un territoire voisin (extension d'aire) ;
- apparues en l'absence de facteur anthropique direct identifié comme responsable de l'introduction de diaspores (spores, semences ou organes végétatifs) dans le territoire considéré [exclusion des commensales des cultures, des plantes dispersées le long des voies de communications (réseaux ferroviaire, (auto)routier et portuaire maritime ou fluvial) ou introduites par transport de matériaux (friches urbaines et industrielles, cimetières et autres cendrées...)] ;
- observées dans une même station (population ou métapopulation) sur une durée au moins égale à 10 ans.

Il s'agit, en majorité, d'espèces hydrochores, thalassochores, anémochores ou zoochores (l'ornithochorie permet, en particulier, un transport sur de longues distances) inféodées à des milieux naturels ou semi-naturels. Certaines plantes installées sur les terrils, les murs et les toits pourront être considérées comme « Néo-indigènes » si elles répondent à tous les critères énumérés.

X = Néo-indigène potentiel

Se dit d'une plante remplissant les deux premières conditions d'affectation du statut de néo-indigène (extension de l'aire d'indigénat par migration spontanée) mais pour laquelle la persistance d'au moins une population sur une période minimale de 10 ans n'a encore été constatée. Ce statut temporaire évoluera, soit vers le statut I = indigène si la plante s'est maintenue, soit vers le statut A = adventice (disparue) si les populations se sont éteintes au cours de cette période décennale.

Z = Eurynaturalisé

Se dit d'une plante non indigène introduite fortuitement ou volontairement par les activités humaines après 1500 et ayant colonisé un territoire nouveau à grande échelle en s'y mêlant à la flore indigène.

Dans les conditions définies ci-dessus, à l'échelle régionale, on considérera un taxon comme assimilé indigène s'il occupe, ou a occupé jadis, au minimum 3,5 % du territoire d'au moins un district phytogéographique (valeur correspondant à un coefficient de rareté qualifié de AR ou plus commun, selon l'échelle de calcul de BOULLET, 1988) ou s'il a colonisé la majeure partie de ses habitats potentiels (même si ceux-ci sont rares).

N = Sténonaturalisé

Se dit d'une plante non indigène introduite fortuitement ou volontairement par les activités humaines après 1500 et se propageant localement comme une espèce indigène en persistant au moins dans certaines de ses stations.

À l'échelle régionale, on considérera un taxon comme sténonaturalisé s'il remplit à la fois les deux conditions suivantes :

- occupation de moins de 3,5 % du territoire de chaque district phytogéographique (valeur correspondant à un coefficient de rareté égal à Rare ou plus rare encore) et occupation d'une minorité de ses habitats potentiels. Au-delà, il sera considéré comme Eurynaturalisé (Z) ;
- observation, dans une même station, sur une durée au moins égale à 10 ans avec une vigueur significative des populations : au moins renouvellement régulier des effectifs pour les plantes annuelles et bisannuelles ou, dans le cas des plantes vivaces, propension à l'extension par voie sexuée ou végétative (dissémination ou formation de peuplements étendus), cela dans au moins une de leurs stations.

A = Adventice

Se dit d'une plante non indigène qui apparaît sporadiquement à la suite d'une introduction fortuite liée aux activités humaines et qui ne persiste que peu de temps (parfois une seule saison) dans ses stations.

Pour les espèces annuelles et bisannuelles, on considèrera, pour ce statut, une durée maximale de 10 ans d'observation dans une même station (au-delà, la plante sera considérée comme naturalisée). Pour les espèces vivaces (herbacées ou ligneuses), il n'aura pas été observé de propension à l'extension par voie sexuée ou végétative (dissémination ou formation de peuplements étendus) dans aucune de leurs stations.

S = Subspontané

Se dit d'une plante, indigène ou non, faisant l'objet d'une culture intentionnelle dans les jardins, les parcs, les bords de route, les prairies et forêts artificielles, etc. et s'échappant de ces espaces mais ne se mêlant pas ou guère à la flore indigène et ne persistant généralement que peu de temps. Les plantes se maintenant dans les anciens jardins ou parcs à l'abandon (reliques culturelles) sont également intégrées dans cette catégorie.

Pour les espèces annuelles et bisannuelles, on considèrera, pour ce statut, une durée maximale de 10 ans d'observation, dans une même station, des descendants des individus originellement cultivés (au-delà, la plante sera considérée comme naturalisée). Pour les espèces vivaces (herbacées ou ligneuses), il n'aura pas été observé de propension à l'extension des populations par voie sexuée ou végétative (dissémination ou formation de peuplements étendus) dans aucune de leurs stations.

C = Cultivé

Se dit d'une plante faisant l'objet d'une culture intentionnelle dans les espaces naturels, semi-naturels ou artificiels (champs, jardins, parcs...). Ce statut peut être décliné en 9 sous-catégories basées sur de grands types d'usages. Celles-ci sont reportées dans la colonne « Usage cultural » (voir ci-dessous).

E = taxon **cité par erreur** dans le territoire.


? = **indication complémentaire de statut douteux ou incertain** se plaçant après le code de statut (I?, Z?, N?, S?, A?, E?).

?? = taxon dont la **présence** est **hypothétique** en Haute-Normandie (indication vague pour le territoire, détermination rapportée en confer, ou encore présence probable à confirmer en absence de citation).

NB1 - La symbolique « **E?** » concerne des taxons cités sans ambiguïté dans le territoire mais dont la présence effective reste fort douteuse ; il s'agit généralement de taxons appartenant à des agrégats complexes, dont soit le contenu taxonomique a considérablement varié au cours de l'histoire botanique, soit la délimitation et la détermination posent d'importants problèmes. Entrent aussi dans cette catégorie, les citations taxonomiques apparemment douteuses ou incertaines en attente d'une confirmation. Après le code « E? », le statut éventuel à retenir en cas de validation ultérieure est indiqué entre parenthèses.

NB2 - Si le taxon possède plusieurs statuts, on indique en premier lieu le ou les statuts dominant(s) suivi(s) éventuellement entre parenthèses par le ou les autres statuts, dit(s) secondaire(s). Dans chaque groupe de statut (dominant / secondaire), la présentation des statuts se fait dans l'ordre hiérarchique suivant : I, X, Z, N, S, A, C.

Schéma récapitulatif



Colonne 5 - Rareté Haute-Normandie [Rar. HN]

E, RR, R, AR, AC, PC, C, CC = indice de rareté régionale du taxon [selon V. BOULLET 1988 et 1990, V. BOULLET et V. TREPS], appliqué aux seules plantes indigènes (I), néo-indigènes potentielles (X), naturalisées (Z et N), subspontanées (S), adventices (A) :

E : exceptionnel ;
RR : très rare ;
R : rare ;
AR : assez rare ;
PC : peu commun ;
AC : assez commun ;
C : commun ;
CC : très commun.

L'indice de rareté régionale est basé sur le coefficient de Rareté régionale selon la table suivante.

RARETÉ RÉGIONALE (selon grille 4x4 km)		
Calcul du Coefficient de Rareté régionale (Rr)		
$Rr_{(i)(z)} = 100 - 100 \times \frac{T_{(i)(z)}}{C_{(z)}}$ avec : $C_{(z)}$ = nombre total de mailles de la grille régionale en réseau (z désignant la taille unitaire de la maille en km²), $T_{(i)(z)}$ = nombre de mailles de la grille régionale où le taxon <i>i</i> est présent.		
	Région	Haute-Normandie
	Nombre total de carrés 4x4 km dans la région [C(16)]	857
Classe de rareté régionale	Intervalle de valeur du coefficient de rareté régionale (Rr)	Nb de carrés (4x4 km) de présence
Exceptionnelle (E)	$Rr \geq 99,5$	1-4
Très rare (RR)	$99,5 > Rr \geq 98,5$	5-12
Rare (R)	$98,5 > Rr \geq 96,5$	13-29
Assez rare (AR)	$96,5 > Rr \geq 92,5$	30-64
Peu commune (PC)	$92,5 > Rr \geq 84,5$	65-132
Assez commune (AC)	$84,5 > Rr \geq 68,5$	133-269
Commune (C)	$68,5 > Rr \geq 36,5$	270-544
Très commune (CC)	$36,5 > Rr$	545-857

Pour les plantes ou populations cultivées (statuts C), la fréquence culturale, dont la valeur obligatoirement subjective et variable ne repose pas sur le calcul d'un indice de rareté, est renseignée dans la colonne « Fréquence culturale » (voir ci-dessous).

Un **signe d'interrogation placé à la suite de l'indice de rareté régionale** « E?, RR?, R?, AR?, PC?, AC?, C? ou CC? » indique que la rareté estimée doit être confirmée. Dans la pratique, ce ? indique que l'indice de rareté régionale du taxon est soit celui indiqué, soit correspondant à l'indice supérieur ou inférieur à celui-ci. Ex. : R? correspond à un indice réel AR, R ou RR.

Lorsque l'incertitude est plus importante, on utilisera seul le signe d'interrogation (voir ci-dessous)

? = taxon présent en Haute-Normandie mais dont la rareté ne peut-être évaluée sur la base des connaissances actuelles (cas fréquent des infrataxons méconnus ou des taxons subspontanés, adventices, cultivés, dont la rareté ou la fréquence est actuellement impossible à apprécier).

D = taxon disparu (non revu depuis 1990 ou revu depuis mais dont on sait pertinemment que les stations ont disparu, ou bien qui n'a pu être retrouvé après investigations particulières). La notion de « disparu » se limite ici à celle de « visiblement disparu, ou encore de disparition épigée », ne pouvant raisonnablement tenir compte des cryptopotentialités des espèces (banque de diaspores du sol, voire organes dormants) et de la notion de « disparition hypogée ». Peut éventuellement concerner les plantes cultivées jadis [D].

D? = taxon présumé disparu dont la disparition doit encore être confirmée.

?? = taxon dont la présence est hypothétique en Haute-Normandie (indication vague pour le territoire, détermination rapportée en confer, ou encore présence probable à confirmer en absence de citation).

= taxon cité par erreur en Haute-Normandie.

() = cas particulier des taxons avec un doute sur l'identité taxonomique exacte des populations incriminées, avec indication de la rareté ou de la fréquence correspondante entre parenthèses (lié à un statut « Présumé cité par erreur » = E?).

Quand un taxon présente plusieurs statuts, la rareté globale à l'« état sauvage » (hors fréquence culturale) peut être déclinée et précisée pour chacun des statuts. Dans ce cas, les raretés par statut sont données entre accolades, dans l'ordre hiérarchique des statuts suivant : I, X, Z, N, S, A.

ex. : statut = IN(SC) / rareté = AC{R,RR,AC}.

Interprétation : la rareté globale du taxon (hors populations cultivées) = AC ; la rareté à l'état indigène = R ; la rareté à l'état naturalisé = RR et la rareté à l'état subspontané = AC.

Lorsque la distinction de l'indice de rareté de chacun des statuts est impossible, on indique d'abord l'indice de rareté relatif aux populations I ou Z, suivi, entre parenthèses, de l'indice correspondant à la « somme » des autres statuts (N, S, A).

ex. : statut = IN(SC) / rareté = AC{R,(AC)}.

Interprétation : la rareté globale du taxon (hors populations cultivées) = AC ; la rareté à l'état indigène = R ; la rareté des populations naturalisées + subspontanées = AC.

Colonne 6 - Menace Haute-Normandie [Men. HN]

Les catégories de menaces sont définies dans un cadre régional selon les critères de l'UICN 1994 adaptés au contexte territorial restreint de l'aire du taxon (V. BOULLET, 1998 ; voir annexe 1). Elles ne s'appliquent qu'aux seuls taxons ou populations indigènes (I ou I?), indigènes potentielles (X ou X?) ou eurynaturalisées (Z ou Z?). Dans ces deux derniers cas, les codes sont précédés respectivement d'un « X » ou d'un « Z ».

EX = taxon **éteint**.

EX? = taxon **préssumé éteint**.

EW = taxon **éteint à l'état sauvage**.

EW? = taxon **préssumé éteint à l'état sauvage**.

CR = taxon **gravement menacé d'extinction**.

EN = taxon **menacé d'extinction**.

VU = taxon **vulnérable**.

LR = taxon à **faible risque** ; comprend trois sous-catégories :

CD = taxon **dépendant de mesures de conservation** ;

NT = taxon **quasi menacé** ;

LC = taxon de **préoccupation mineure**.

DD = taxon **insuffisamment documenté**.

N.B. : une incertitude sur la rareté (?, AC?, R?, E? ...) induit automatiquement un coefficient de menace = DD (ou XDD ou ZDD).

NE : taxon **non évalué**.

N.B. : un doute sur le statut de la plante (I?, X? ou Z?) induit automatiquement un coefficient de menace = NE (ou XNE ou ZNE).

?? = taxon dont la présence est hypothétique en Haute-Normandie (indication vague pour le territoire, détermination rapportée en confer, ou encore présence probable à confirmer en absence de citation).

= taxon cité par erreur en Haute-Normandie.

() = cas particulier des taxons d'identité douteuse, avec indication des menaces correspondantes entre parenthèses (lié à un statut « Présumé cité par erreur » = E?).

Pour les statuts sténonaturalisé (N, N?), subspontané (S, S?), adventice (A, A?) et cultivé (C), la définition de menaces n'est guère adaptée. Quand un taxon est uniquement concerné par ces statuts, un **code « H »** est indiqué dans la colonne menaces. Par convention, le code « H » a également été affecté aux hybrides non fixés.

Colonne 7 - Usage cultural [Us. cult. HN]

Une typologie simplifiée des usages culturels a été dressée dans le cadre de la révision des statuts.

- s** - plantes de sylviculture (boisements artificiels, production de bois d'œuvre)
- i** - plantes industrielles (oléagineuses, textiles, utilisation à grande échelle en phytothérapie...)
- a** - plantes alimentaires (alimentation humaine et animale)
- f** - fixation et enrichissement des sols (plantations d'oyats, couverture de jachère, engrais verts)
- p** - plantes utilisées pour la structuration paysagère ou la « renaturation » (plantations de haies ou d'écrans, végétalisation de talus, « gazons fleuris »...)
- c** - plantes introduites dans la nature à des fins conservatoires (hors jardins botaniques)
- j** - plantes ornementales cultivées dans les jardins privés, les parcs urbains et les cimetières
- d** - autres usages (médecine populaire ; phytoremédiation ; lagunage ; plantes mellifères, stupéfiantes...)
- x** - usage indéfini

Si le taxon possède plusieurs usages culturels, on indique sans parenthèse le ou les usages dominant(s) suivi(s) entre parenthèses du ou des usages dit(s) secondaire(s). Lorsque le statut C = cultivé correspond à un statut secondaire, le ou les usages culturels figurent systématiquement entre parenthèses. Dans chaque groupe (dominant / secondaire), la présentation des usages se fait dans l'ordre hiérarchique suivant : s, i, a, f, p, c, d, j, x.

Les plantes strictement cultivées à des fins ornementales dans les jardins privés, parcs et cimetières (code j) n'ont pas été intégrées dans ce document.

Colonne 8 - Fréquence culturelle [Fréq. cult. HN]

La fréquence culturelle, dont la valeur est obligatoirement subjective et variable, ne repose pas sur le calcul d'un indice de rareté.

La codification est identique aux indices rareté :

- E** : exceptionnel ;
- RR** : très rare ;
- R** : rare ;
- AR** : assez rare ;
- PC** : peu commun ;
- AC** : assez commun ;
- C** : commun ;
- CC** : très commun.
- ?** : fréquence culturelle inconnue

Un **signe d'interrogation** placé à la suite de l'indice fréquence culturelle « E?, RR?, R?, AR?, PC?, AC?, C? ou CC? » indique que celui-ci doit être confirmé.

Colonne 9 - Intérêt patrimonial [Patrim. HN]

Les termes de « plante remarquable » ou de « plante d'intérêt patrimonial » sont régulièrement utilisés par les botanistes. Les Conservatoires botaniques nationaux et d'autres organismes en définissent presque systématiquement une liste dans le cadre des évaluations floristiques de site.

Il convenait donc de proposer une définition, un cadre commun à cette notion de « valeur patrimoniale ».

Le terme « **Plante d'intérêt patrimonial** » (notion de valeur, de transmission par les ancêtres) a été préféré à « Plante remarquable » (concept beaucoup plus large).

Sont considérés comme d'intérêt patrimonial à l'échelle régionale,

1. **tous les taxons bénéficiant d'une PROTECTION légale** au niveau international (annexes II et IV de la Directive Habitat, Convention de Berne), national (liste révisée au 1^{er} janvier 1999) ou régional (arrêté du 3 avril 1990) ;
2. **tous les taxons non hybrides indigènes (I), néo-indigènes potentiels (X) ou eurynaturalisés (Z) mais, dans ce dernier cas, non invasifs** (voir ci-dessous) présentant au moins un des 2 critères suivants :
 - **MENACE au minimum égale à « Quasi menacé » (NT, XNT ou ZNT selon le statut) en Haute-Normandie** ou à une échelle géographique supérieure (incluant le niveau de menace R = « rare » dans l'ancienne codification U.I.C.N.) ;
 - **RARETÉ égale à Rare (R), Très rare (RR), Exceptionnel (E), Présumé très Rare (RR ?) ou Présumé exceptionnel (E?)** pour l'ensemble des populations de statuts I, X ou Z de Haute-Normandie.

Par défaut, on affectera le statut de plante d'intérêt patrimonial à un taxon insuffisamment documenté (menace = DD) si le taxon de rang supérieur auquel il se rattache est lui-même d'intérêt patrimonial.

Dans le cas de taxons à statut multiple (par exemple : I(NA), Z(SC), etc.), **le statut de plante d'intérêt patrimonial n'est pas applicable aux populations cultivées, adventices, subspontanées**. Pour les plantes **naturalisées**, seules les populations des plantes relevant de la catégorie Z = eurynaturalisé peuvent être considérées comme d'intérêt patrimonial (pas les N = sténonaturalisé, à l'exception des 2 plantes protégées régionalement *Stratiotes aloides* et *Angelica archangelica*). L'application de cette règle se révèlera quelquefois délicate lorsque les informations historiques, chorologiques et/ou écologiques manqueront.

La codification est la suivante :

oui : taxon répondant strictement aux critères de sélection énoncés ci-dessus.

(oui) : taxon disparu ou présumé disparu dont le coefficient de Menace HN = EX, ZEX, EX? ou ZEX? (= « liste noire » régionale). En cas de redécouverte dans la région, ses populations de statut I, X ou Z acquerraient automatiquement le statut de plante d'intérêt patrimonial.

[oui] :

- soit taxon de présence douteuse dans la région (statut HN = E?) présentant potentiellement les critères de sélection d'une plante d'intérêt patrimonial et donc susceptibles d'intégrer cette catégorie en cas de confirmation de sa présence dans la région ;
- soit infrataxon de présence hypothétique dans la région (statut HN = ??) dont le taxon de rang supérieur répond aux critères de définition des plantes d'intérêt patrimonial. Par défaut, en cas de confirmation de sa présence, ses populations de statut I, X ou Z seront considérées comme d'intérêt patrimonial.

[(oui)] : taxon de présence douteuse dans la région (statut HN = E?) et considérés ou présumés disparus (Menace HN = (EX), (ZEX), (EX?) ou (ZEX?)). En cas de confirmation de sa présence (analyse de planches d'herbier par exemple), ses populations de statut présumé I ou Z seront considérées comme d'intérêt patrimonial (à titre posthume !).

Colonne 10 - Plantes invasives [Invas. HN]

Le terme de « plantes invasives » s'applique à des plantes naturalisées (N ou Z) induisant par leur prolifération dans les milieux naturels ou semi-naturels des changements significatifs de composition, de structure ou de fonctionnement des écosystèmes. Des impacts d'ordre économique (gêne pour la navigation, la pêche, les loisirs) ou sanitaire (toxicité, réactions allergiques...) viennent fréquemment s'ajouter à ces nuisances écologiques.

La sélection des espèces invasives en Haute-Normandie est essentiellement basée sur une synthèse nationale (MÜLLER, 2004), complétée par quelques cas régionaux avérés ou pressentis non traités au niveau national.

Deux cas ont été distingués :

A : taxon à caractère **invasif avéré**, relatif à des taxons naturalisés (N ou Z) et manifestement en extension dans la région

P : taxon à caractère **invasif potentiel**, relatif à des taxons naturalisés très localement (N) ou parfois simplement subspontanés (S) ou adventices (A), voire actuellement seulement cultivés. Compte tenu des informations relatives à d'autres territoires géographiques, ces taxons risquent à court ou moyen terme de passer dans la catégorie A « taxon à caractère invasif avéré ».

N.B. : lorsque la présence du taxon est à confirmer dans la région (Statut HN = ?? ou E?), le symbole P est placé entre parenthèses : **(P)**.

Colonne 11 - Législation [Législ.]

H2 = Protection européenne. Annexe II de la Directive 92/43 CEE : "Habitats, Faune, Flore" ;

H4 = Protection européenne. Annexe IV de la Directive 92/43 CEE : "Habitats, Faune, Flore" ;

H5 = Protection européenne. Annexe V de la Directive 92/43 CEE : "Habitats, Faune, Flore" ;

! = Protection européenne. Taxon prioritaire de la Directive 92/43 CEE : "Habitats, Faune, Flore".

B = Protection européenne. Annexe I de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, Conseil de l'Europe, 6 mars 1992.

N1 = Protection nationale. Taxon de l'Annexe 1 de l'arrêté du 20 janvier 1982 modifié par l'arrêté du 31 août 1995 ;

N2 = Protection nationale. Taxon de l'Annexe 2 de l'arrêté du 20 janvier 1982 modifié par l'arrêté du 31 août 1995.

R1 = Protection régionale. Taxon protégé dans la région Haute-Normandie au titre de l'arrêté du 3 avril 1990

Réglementation de la cueillette

C₀ = taxon inscrit dans l'Arrêté du 13 octobre 1989 (Journal officiel du 10 décembre 1989) modifié par l'arrêté du 5 octobre 1992 (Journal officiel du 26 octobre 1992) relatif à la liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire.

Aucun arrêté préfectoral de réglementation de la cueillette de ces espèces n'a été publié à ce jour en Haute-Normandie.

Protection CITES

Arrêté du 29 mars 1988 fixant les modalités d'application de la convention internationale des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) :

Symbolique : **A2** = Annexe II du Règlement C.E.E. n°3626/82 du Conseil du 3 décembre 1982 relatif à l'application dans la communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.

A2<>1 : désigne toutes les parties et tous les produits des taxons de l'Annexe II sauf :

- a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies) et
- b) les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons.

A2<>6 : désigne toutes les parties et tous les produits des taxons de l'Annexe II sauf :

- a) les graines et le pollen (y compris les pollinies) ;
- b) les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons ;
- c) les fleurs coupées des plantes reproduites artificiellement, et
- d) les fruits et leurs parties et produits de *Vanilla* spp. reproduites artificiellement

C = Annexe C : Liste des espèces faisant l'objet d'un traitement spécifique de la part de la Communauté (Règlement C.E.E. n° 3143/87 du 19 octobre 1987).

C(1) = Partie 1 : Espèces visées à l'article 3, paragraphe 1.

C(2) = Partie 2 : Espèces visées à l'article 3, paragraphe 2.

Symbolique complémentaire

Une étoile « * » en plus du symbole signifie que le statut se rapporte à un infrataxon appartenant à un taxon ayant ce statut, exemple : R1*= infrataxon inclus dans un taxon protégé. La lettre « p » en plus du symbole signifie que le statut concerne partiellement le taxon (le statut se situant à un rang inférieur), exemple : R1p = taxon concerné partiellement par l'arrêté du 17 août 1989.

Dans le cas des plantes citées par erreur (Statut HN = E), présumées citées par erreur (Statut HN = E?) ou de présence hypothétique (Statut HN = ??), les symboles décrits ci-dessus sont placés entre crochets : « [...] ».

Cette symbolique « [...] » a également été appliquée aux taxons protégés au niveau national ou international dont l'ensemble des populations régionales ne peut relever effectivement de ces mesures de protection en raison de leur statut (plantes cultivées et subspontanées, adventices, plantes sténonaturalisées).

Colonne 12 - Livres et listes rouges des plantes menacées [L. rouges]

E : rare, menacé ou endémique au niveau européen ; le code U.I.C.N. retenu à cette échelle est indiqué entre parenthèses

F1 : menacé en France (taxon prioritaire) ; le code U.I.C.N. retenu à cette échelle est indiqué entre parenthèses

R : inscrit à la liste rouge régionale des plantes menacées

La symbolique complémentaire (« p » et « * ») décrite ci-dessus s'applique également ici.

Dans le cas des plantes citées par erreur (Statut HN = E), présumées citées par erreur (Statut HN = E?) ou de présence hypothétique (Statut HN = ??), les symboles décrits ci-dessus sont placés entre crochets : « [...] ».

Cette symbolique « [...] » a également été appliquée aux taxons menacés au niveau national ou international dont l'ensemble des populations régionales n'est pas concerné par ce statut (plantes cultivées et subspontanées, adventices, plantes sténonaturalisées).

Niveau européen

Source : "Liste des plantes rares, menacées et endémiques en Europe (édition 1982)." Pour le Comité Européen pour la Sauvegarde de la Nature et des Ressources Naturelles, Collection Sauvegarde de la nature, 27 : 1-357, Strasbourg (COMITÉ DES PLANTES MENACÉES, 1983).

L'évaluation du niveau de menace suit ici l'ancienne codification de l'U.I.C.N. :

Ex = disparu

?Ex = éventuellement ou présumé disparu

E = en danger. Taxon en passe de disparaître ou dont la survie est peu probable si les facteurs responsables continuent à agir. Dans cette catégorie figurent les taxa dont le nombre a été réduit à un seuil critique ou dont les habitats ont diminué si radicalement qu'ils courent un danger imminent de disparition.

V = vulnérable. Taxon dont on estime qu'il entrera prochainement dans la catégorie En danger s'il y a persistance du danger. Dans cette catégorie figurent les taxa dont tout ou partie des populations diminuent en raison d'une surexploitation, d'une destruction importante de l'habitat ou d'autres perturbations de l'environnement ; également des taxa dont les populations ont été gravement diminuées ou dont la sécurité finale n'est pas encore assurée ; et enfin des taxa dont les populations demeurent abondantes mais dont de graves facteurs contraignent l'existence dans toute l'aire de répartition.

R = rare. Taxon dont les populations mondiales sont faibles et qui, n'étant pas actuellement en danger ou vulnérable, court néanmoins des risques. Ces taxa se situent généralement dans des aires ou des habitats géographiques limités ou sont dispersés sur une aire de répartition plus vaste.

I = indéterminées. Taxon que l'on sait Disparu, En danger, Vulnérable ou Rare, mais sur lequel on ne possède pas assez de renseignements pour préciser laquelle des quatre catégories est la bonne.

K = insuffisamment connu. Taxon que l'on soupçonne d'appartenir à l'une des catégories précitées mais à propos duquel on ne dispose pas de renseignements suffisants.

O = hors de danger. Taxon autrefois inclus dans l'une des catégories précitées mais qui est maintenant jugé relativement en sécurité en raison de l'efficacité des mesures de conservation qui ont été prises ou de la disparition de la menace qui pesait sur la survie.

NT = taxon qui n'est ni rare ni menacé.

En pratique, peuvent temporairement figurer dans les catégories En danger et Vulnérable des taxa dont les populations commencent à se régénérer à la suite de mesures correctives mais dont la régénération ne suffit pas à justifier leur transfert dans une autre catégorie.

Niveau national

Source : " Livre rouge de la flore menacée de France. Tome 1. Espèces prioritaires " (Louis OLIVIER, Jean-Paul GALLAND & Hervé MAURIN, 1995, Paris).

Même codification U.I.C.N. que pour la menace européenne.

Niveau régional

Ont été retenus pour la Liste rouge des taxons menacés en région Haute-Normandie, tous les **taxons indigènes, néo-indigènes potentiels ou eurynaturalisés (Statut HN = I, X ou Z) dont le niveau de menace régional est au minimum égal à « Vulnérable »** (VU, XVU, ZVU, EN, XEN, ZEN, CR,

XCR, ZCR, EW et ZEW). Par défaut, les infrataxons insuffisamment documentés (DD) de taxons de rang supérieur retenus selon les critères ci-dessous sont également intégrés dans la Liste rouge régionale.

Les taxons de la « Liste noire » (menaces = EX ou ZEX, EX?, ZEX?) sont signalés par le sigle **(R)**.

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

N.B. - Seuls les ouvrages cités figurent dans cette bibliographie sommaire.

AESCHIMANN, D. & BURDET, H.M., 1989. - Flore de la Suisse et des territoires limitrophes. « Le nouveau Binz ». 597 p. Neuchâtel.

BONNIER, G. & LAYENS, G. de, 1894. - Tableaux synoptiques des Plantes vasculaires de la Flore de la France. 412 p. Paris.

BOREAU, A., 1857. - Flore du Centre de la France. 3^{ème} éd., 2 vol., 1 : 356 p., 2 : 771 p., Paris.

BOULLET, V., 1988. - Étude préliminaire à la gestion expérimentale du Mont-Dubert. Région Nord/Pas-de-Calais, CRP/CBNBL, 71 p.

BOULLET, V., 1998. - Adaptation des catégories et des critères de menaces de l'U.I.C.N. (1994) concernant les plantes vasculaires à l'échelle régionale. Manuscrit, CRP/CBNBL, 21 p.

COMITÉ DES PLANTES MENACÉES, 1983. - Liste des plantes rares, menacées et endémiques en Europe (édition 1982). *Collection Sauvegarde de la Nature*, 27, Comité européen pour la sauvegarde de la nature et des ressources naturelles. : 357 p. Strasbourg.

DUDMAN, A.A. & RICHARDS, A.J., 1997. - Dandelions of Great Britain and Ireland. B.S.B.I. Handbook, 9, 341 p., London.

GILLET, M. & MAGNE, J.-H., 1887. - Nouvelle flore française. 6^{ème} éd., 782 p., Paris.

LAMARCK, J.-B. & DE CANDOLLE, A.-P., 1805-1815. - Flore française. 3^{ème} éd., 5 vol., 1 : 588 p., 2 : 590 p., 3 : 731 p., 4 : 930 p., 5 : 660 p., Paris.

LAMBINON, J., DE LANGHE, J.-E., DELVOSALLE, L. & DUVIGNEAUD, J. (et coll.), 1993. - Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des Régions voisines (Ptéridophytes et Spermatophytes). 4^{ème} éd., 1092 p., Meise.

LAMBINON, J., DE LANGHE, J.-E., DELVOSALLE, L. & DUVIGNEAUD, J. (et coll.), 1998. - Flora van België, het Groothertogdom Luxemburg, Noord-Frankrijk en de aangrenzende gebieden (Pteridofyten en Spermatofyten). 3^{ème} éd., 1091 p., Meise.

LAMBINON, J., DELVOSALLE, L. & DUVIGNEAUD, J. (et coll.), 2004. - Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des Régions voisines (Ptéridophytes et Spermatophytes). 5^{ème} éd., 1167 p., Meise.

LE MAOUT, E. & DECAISNE, J., 1855. - Flore élémentaire des jardins et des champs. 936 p., Paris.

MÜLLER, S. (coord.), 2004. - Plantes invasives en France. *Patrimoines Naturels*, 62. M.N.H.N. 168 p. Paris.

OLIVIER, L., GALLAND, J.-P. & MAURIN, H., 1995. - Livre Rouge de la flore menacée de France. Tome 1 : espèces prioritaires. Muséum National d'Histoire Naturelle / Conservatoire Botanique National de Porquerolles, Ministère de l'Environnement. 486 p. + annexes. Paris.

U.I.C.N., 1994. - Catégories de l'UICN pour les Listes Rouges. Union Mondiale pour la Nature (UICN), 22 p.

ANNEXE 1

CATÉGORIES ET CRITÈRES DE MENACE RÉGIONALE (adapté de l'UICN 1994) [V. BOULLET, 1998]

EX = taxon éteint

Un taxon est dit "Éteint" lorsqu'on ne peut raisonnablement douter que le dernier représentant régional est mort. Ne sont pas pris en compte dans l'établissement de cette catégorie, les individus cultivés d'origine horticole ou en provenance d'autres territoires que la région considérée, à l'exception de ceux introduits dans la nature.

Trois sous-catégories peuvent être envisagées :

- EX-t (Totalelement éteint) incluant la mort du dernier représentant régional sous quelque forme ou stade biologique que ce soit, y compris sous forme de diaspore (ou d'organe de résistance) dans les banques du sol, mais aussi dans les collections conservatoires et les herbiers ;*
- EX-a (Apparemment éteint) sans tenir compte des cryptopotentialités (banques du sol, herbiers et autres ressources conservatoires) ;*
- EX? (Présumé éteint) pour laquelle manque cependant un certain nombre de vérifications.*

Pour les taxons assimilés indigènes, les symboles de la catégorie et des sous-catégories sont précédés d'un "Z" (ZEX, ZEX-t, ZEX-a, ZEX?).

EW = taxon éteint à l'état sauvage

Un taxon est dit "Éteint à l'état sauvage" à l'échelle régionale lorsqu'il ne survit que dans le cadre d'une population (ou de populations) introduite(s) ou de population(s) cultivée(s) d'origine régionale. Un taxon est présumé "Éteint à l'état sauvage" lorsque des enquêtes détaillées menées dans ses habitats connus et/ou probables, à des périodes appropriées (rythmes circadien, saisonnier, annuel), et dans l'ensemble de son aire de répartition historique n'ont pas permis de noter la présence d'un seul individu. Les enquêtes devraient porter sur une durée adaptée au cycle et aux formes biologiques du taxon.

Trois sous-catégories peuvent être envisagées :

- EW-t (Totalelement éteint à l'état sauvage) incluant la mort du dernier représentant régional sous quelque forme ou stade biologique que ce soit, y compris sous forme de diaspore (ou d'organe de résistance) dans les banques du sol ;*
- EW-a (Apparemment éteint à l'état sauvage) sans tenir compte des cryptopotentialités (banques du sol) ;*
- EW? (Présumé éteint à l'état sauvage) pour laquelle manque cependant un certain nombre de vérifications.*

Pour les taxons assimilés indigènes, les symboles de la catégorie et des sous-catégories sont précédés d'un "Z" (ZEW, ZEW-t, ZEW-a, ZEW?).

CR = taxon gravement menacé d'extinction

Un taxon est dit "Gravement menacé d'extinction" à l'échelle régionale lorsqu'il est confronté à un risque d'extinction à l'état sauvage extrêmement élevé et à court terme, tel que défini par l'un quelconque des critères (A à D).

Pour les taxons assimilés indigènes, le symbole de la catégorie est précédé d'un "Z" (ZCR).

A - Réduction de population prenant l'une ou l'autre des formes suivantes :

1. Réduction grave, constatée ou estimée, d'au moins 80% au cours des 20 dernières années, en se basant sur l'un quelconque des éléments suivants (à préciser) :

(a) un indice de raréfaction basé sur la taille des populations régionales du taxon ;

- (b) *un indice de raréfaction aréale du taxon ;*
 - (c) *perte de l'optimalité écologique mesurée par un indice de raréfaction des habitats du taxon ;*
 - 2. Une réduction d'au moins 80%, projetée ou suspectée d'être atteinte dans les 20 prochaines années, basée sur l'un quelconque des (a), (b) ou (c) mentionnés ci-dessus.
- B - Zone d'occupation** représentant au plus 0,5% du réseau de référence, et estimations indiquant au moins une des deux possibilités suivantes :
- 1. Dangereusement fragmentée et n'existant que dans un seul site, à l'exception des sites de très grande permanence ;
 - 2. Déclin continu d'au moins 50% constaté au cours des 20 dernières années, ou projeté d'être atteint dans les 20 prochaines années de l'un quelconque des éléments suivants :
 - (a) *zone d'occupation ;*
 - (b) *zone d'occupation des habitats du taxon ;*
 - (c) *nombre de sites ou de sous-populations ;*
 - (d) *nombre d'individus.*
- C - Population** estimée à moins de 250 individus et l'un ou l'autre des phénomènes suivants :
- 1. Déclin continu estimé à 25% au moins au cours des 20 dernières années ;
 - 2. Structure de la population régionale prenant l'une ou l'autre des formes suivantes :
 - (a) *dangereusement fragmentée (c'est à dire aucune sous-population estimée à plus de 50 individus) ;*
 - (b) *tous les individus sont réunis en une seule sous-population.*
- D - Population** estimée à moins de 50 individus.

EN = taxon menacé d'extinction

Un taxon est dit "Menacé d'extinction" à l'échelle régionale lorsque, sans être "Gravement menacé d'extinction", il est néanmoins confronté à un risque d'extinction à l'état sauvage très élevé et à court terme, tel que défini par l'un quelconque des critères (A à D).

Pour les taxons assimilés indigènes, le symbole de la catégorie est précédé d'un "Z" (ZEN).

A - Réduction de population prenant l'une ou l'autre des formes suivantes :

- 1. Réduction grave, constatée ou estimée, d'au moins 50% au cours des 20 dernières années, en se basant sur l'un quelconque des éléments suivants (à préciser) :
 - (a) *un indice de raréfaction basé sur la taille des populations régionales du taxon ;*
 - (b) *un indice de raréfaction aréale du taxon ;*
 - (c) *perte de l'optimalité écologique mesurée par un indice de raréfaction des habitats du taxon.*
- 2. Une réduction d'au moins 50%, projetée ou suspectée d'être atteinte dans les 20 prochaines années, basée sur l'un quelconque des (a), (b) ou (c) mentionnés ci-dessus.

B - Zone d'occupation représentant au plus 1,5% du réseau de référence, et estimations indiquant au moins une des deux possibilités suivantes :

- 1. Dangereusement fragmentée et n'existant que dans cinq sites au plus, à l'exception des sites de très grande permanence ;
- 2. Déclin continu d'au moins 20% constaté au cours des 20 dernières années, ou projeté d'être atteint dans les 20 prochaines années de l'un quelconque des éléments suivants :
 - (a) *zone d'occupation ;*
 - (b) *zone d'occupation des habitats du taxon ;*
 - (c) *nombre de sites ou de sous-populations ;*
 - (d) *nombre d'individus.*

C - Population estimée à moins de 2500 individus et l'un ou l'autre des phénomènes suivants :

1. Déclin continu estimé à 20% au moins au cours des 20 dernières années ;
2. Structure de la population régionale prenant l'une ou l'autre des formes suivantes :
 - (a) *dangereusement fragmentée (c'est à dire aucune sous-population estimée à plus de 250 individus) ;*
 - (b) *tous les individus sont réunis en une seule sous-population.*

D - Population estimée à moins de 250 individus.

VU = taxon vulnérable

Un taxon est dit "Vulnérable" à l'échelle régionale lorsque, sans être "Gravement menacé d'extinction" ni "Menacé d'extinction", il est néanmoins confronté à un risque d'extinction à l'état sauvage élevé et à moyen terme, tel que défini par l'un quelconque des critères (A à D).

Pour les taxons assimilés indigènes, le symbole de la catégorie est précédé d'un "Z" (ZVU).

A - Réduction de population prenant l'une ou l'autre des formes suivantes :

1. Réduction grave, constatée ou estimée, d'au moins 20% au cours des 20 dernières années, en se basant sur l'un quelconque des éléments suivants (à préciser) :
 - (a) *un indice de raréfaction basé sur la taille des populations régionales du taxon ;*
 - (b) *un indice de raréfaction aréale du taxon ;*
 - (c) *perte de l'optimalité écologique mesurée par un indice de raréfaction des habitats du taxon.*
2. Une réduction d'au moins 20%, projetée ou suspectée d'être atteinte dans les 20 prochaines années, basée sur l'un quelconque des (a), (b) ou (c) mentionnés ci-dessus.

B - Zone d'occupation représentant au plus 3,5% du réseau de référence, et estimations indiquant au moins une des deux possibilités suivantes :

1. Dangereusement fragmentée et n'existant que dans dix sites au plus, à l'exception des sites de très grande permanence ;
2. Déclin continu d'au moins 10% constaté au cours des 20 dernières années, ou projeté d'être atteint dans les 20 prochaines années de l'un quelconque des éléments suivants :
 - (a) *zone d'occupation ;*
 - (b) *zone d'occupation des habitats du taxon ;*
 - (c) *nombre de sites ou de sous-populations ;*
 - (d) *nombre d'individus.*

C - Population estimée à moins de 2500 individus et l'un ou l'autre des phénomènes suivants :

1. Déclin continu estimé à 10% au moins au cours des 20 dernières années ;
2. Structure de la population régionale prenant l'une ou l'autre des formes suivantes :
 - (a) *dangereusement fragmentée (c'est à dire aucune sous-population estimée à plus de 1.000 individus) ;*
 - (b) *tous les individus sont réunis en une seule sous-population.*

D - Population très petite ou limitée, prenant l'une ou l'autre des formes suivantes :

1. Population estimée à moins de 1.000 individus ;
2. Population caractérisée par une restriction aiguë de sa zone d'occupation (représentant au plus 0,5% du réseau de référence) ou du nombre de sites (en règle générale moins de 5). Un tel taxon serait donc sensible aux effets d'activités humaines (ou à des événements stochastiques dont l'impact est accru par des activités humaines); il pourrait réagir très rapidement et dans un avenir imprévisible et, par conséquent, devenir "Gravement menacé d'extinction" ou même "Eteint" en un laps de temps très court.

LR = taxon à faible risque ; comprend trois sous-catégories :

CD = taxon dépendant de mesures de conservation ;

NT = taxon quasi menacé ;

LC = taxon de préoccupation mineure.

Un taxon est dit "Faible risque" à l'échelle régionale lorsque son évaluation a montré qu'il ne remplissait aucun des critères des catégories "Gravement menacé d'extinction", "Menacé d'extinction" ou "Vulnérable", en étant suffisamment documenté. Les taxons inclus dans la catégorie "Faible risque" peuvent être séparés en trois sous-catégories :

1. Dépendant de mesures de conservation (cd)

Les taxons qui font l'objet d'un programme de conservation continu, spécifique au taxon ou à son habitat, dont la cessation entraînerait le passage du taxon dans l'une des catégories menacées ci-dessus dans un délai de 5 ans.

2 Quasi menacé (nt)

Les taxons ne répondant pas aux critères de la catégorie "Dépendant de mesures de conservation", mais qui se rapprochent de ceux de la catégorie "Vulnérable".

3. Préoccupation mineure (lc)

Les taxons ne répondant pas aux critères de la catégorie "Dépendant de mesures de conservation" ni à celle de "Quasi menacé".

DD = taxon insuffisamment documenté

Un taxon est dit "Insuffisamment documenté" à l'échelle régionale lorsqu'on ne dispose pas d'assez d'informations pour évaluer directement ou indirectement son risque d'extinction en fonction de sa distribution et/ou du statut de sa population. Un taxon figurant dans cette catégorie peut avoir été bien étudié, et sa biologie être bien connue, sans que l'on dispose toutefois de données d'abondance et/ou de distribution appropriées. DD n'est donc ni une catégorie menacée ni équivalente à "Faible risque". L'inscription d'un taxon dans cette catégorie indique que davantage d'informations sont nécessaires et il faut donc admettre la possibilité que de futures recherches montreront qu'une catégorie menacée était appropriée. Il est important d'utiliser autant que se peut toutes les données disponibles. Dans de nombreux cas, le choix entre catégories menacées et DD devra faire l'objet d'un examen très attentif. Si l'on soupçonne que l'aire de répartition d'un taxon est relativement circonscrite, s'il s'est écoulé un laps de temps considérable depuis la dernière observation du taxon, un statut menacé pourrait être justifié.

NE : taxon non évalué.

Un taxon est dit "Non évalué" à l'échelle régionale lorsqu'il n'a pas encore été confronté aux critères.

Dans ce document, cette catégorie a été systématiquement appliquée aux taxons dont l'indigénat est douteux (statut = I?) ou dont le caractère d'eurynaturalisation est douteux (statut = Z?, appelant un ZNE pour le coefficient de menace).

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
ASPLENIACEAE	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L.	Doradille noire [Capillaire noire]	I	R	NT			oui			
ASPLENIACEAE	<i>Asplenium marinum</i> L.	Doradille maritime	I	E	CR			oui			R
ASPLENIACEAE	<i>Asplenium obovatum</i> Viv.	Doranille obovale (s.l.)	E?(I)	(D)	(EX)						
ASPLENIACEAE	<i>Asplenium obovatum</i> Viv. subsp. <i>billotii</i> (F.W. Schultz) O. Bolòs, Vigo, Masalles et Ninot	Doradille de Billot	E?(I)	(D)	(EX)						
ASPLENIACEAE	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	Doradille rue-de-muraille [Rue de muraille]	I	CC	LC						
ASPLENIACEAE	<i>Asplenium scolopendrium</i> L.	Doradille scolopendre [Scolopendre ; Langue de cerf]	I	AC	LC						
ASPLENIACEAE	<i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffmann	Doradille septentrionale	I	D	EX			(oui)			(R)
ASPLENIACEAE	<i>Asplenium trichomanes</i> L.	Doradille polytric (s.l.) [Fausse capillaire]	I	AC	LC						
ASPLENIACEAE	<i>Asplenium trichomanes</i> L. subsp. <i>quadrivalens</i> D.E. Mey.	Doradille quadrivalente [Fausse capillaire]	I	AC	LC						
ASPLENIACEAE	<i>Asplenium viride</i> Huds.	Doradille verte	E?(I)	(D?)	(EX?)						
ASPLENIACEAE	<i>Ceterach officinarum</i> Willd.	Cétérach officinal [Cétérach]	I	R	NT			oui			
AZOLLACEAE	<i>Azolla filiculoides</i> Lam.	Azolle fausse-filicule	Z	RR	ZNT				A		
BLECHNACEAE	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth	Blechne en épi	I	PC	LC						
DENNSTAEDTIACEAE	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	Ptéridion aigle [Fougère aigle]	I	CC	LC						
DRYOPTERIDACEAE	<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenkins	Dryoptéride écailleuse (s.l.)	I	PC	LC						
DRYOPTERIDACEAE	<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenkins subsp. <i>affinis</i>	Dryoptéride écailleuse	I	RR?	DD			oui			
DRYOPTERIDACEAE	<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenkins subsp. <i>borreri</i> (Newman) Fraser-Jenkins	Dryoptéride de Borrer	I	PC	LC						
DRYOPTERIDACEAE	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P. Fuchs	Dryoptéride de la Chartreuse	I	AC	LC						
DRYOPTERIDACEAE	<i>Dryopteris cristata</i> (L.) A. Gray	Dryoptéride à crêtes	I	D?	EX?			(oui)		N1	F1(E);(R)
DRYOPTERIDACEAE	<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffmann) A. Gray	Dryoptéride dilatée	I	AC	LC						
DRYOPTERIDACEAE	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	Dryoptéride fougère-mâle [Fougère mâle]	I	C	LC						
DRYOPTERIDACEAE	<i>Dryopteris</i> × <i>complexa</i> Fraser-Jenkins [<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenkins × <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott]	Dryoptéride complexe	E?(I)	(?)	(H)						
DRYOPTERIDACEAE	<i>Dryopteris</i> × <i>deweveri</i> (J. Jansen) Jansen et Wachter [<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P. Fuchs × <i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffmann) A. Gray]	Dryoptéride de de Wever	I	?	H						
DRYOPTERIDACEAE	<i>Dryopteris</i> × <i>uliginosa</i> (A. Braun ex Döll) O. Kuntze ex Druce [<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P. Fuchs × <i>Dryopteris cristata</i> (L.) A. Gray]	Dryoptéride des fanges	I	E	H						
DRYOPTERIDACEAE	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth	Polystic à aiguillons	I	AR	LC					C0	
DRYOPTERIDACEAE	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) Woyнар	Polystic à soies	I	PC	LC					C0	
DRYOPTERIDACEAE	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) Woyнар var. <i>hastulatum</i> (Ten.) Hayek	Polystic à soies (var.)	I	PC?	DD					C0*	
DRYOPTERIDACEAE	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) Woyнар var. <i>setiferum</i>	Polystic à soies (var.)	??	??	??					[C0*]	
DRYOPTERIDACEAE	<i>Polystichum</i> × <i>bicknellii</i> (Christ) Hahne [<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth × <i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) Woyнар]	Polystic de Bicknell	I	RR?	H						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
EQUISETACEAE	<i>Equisetum arvense</i> L.	Prêle des champs	I	C	LC						
EQUISETACEAE	<i>Equisetum fluviatile</i> L.	Prêle des bourniers	I	AR	VU			oui			R
EQUISETACEAE	<i>Equisetum hyemale</i> L.	Prêle d'hiver	I(C)	E	CR	j	R?	oui			R
EQUISETACEAE	<i>Equisetum palustre</i> L.	Prêle des marais	I	AC	LC						
EQUISETACEAE	<i>Equisetum sylvaticum</i> L.	Prêle des forêts	I	D	EX			(oui)			(R)
EQUISETACEAE	<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh.	Prêle d'ivoire	I	R	LC			oui			
EQUISETACEAE	<i>Equisetum xlitore</i> Kühl. ex Rupr. [<i>Equisetum arvense</i> L. x <i>Equisetum fluviatile</i> L.]	Prêle des rivages	I	D?	H						
HYMENOPHYLLACEAE	<i>Hymenophyllum wilsonii</i> Hook.	Hyménophylle de Wilson	E							[N1]	[F1(E)]
LYCOPODIACEAE	<i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank et C.F.P. Mart.	Huperzie sélagine [Lycopode sélagine]	I	D	EX			(oui)			(R)
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub	Lycopodielle inondée [Lycopode inondé]	I	D?	EX?			(oui)		N1	F1(R);(R)
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> L.	Lycopode en massue	I	E	CR			oui		H5;R1;C0	R
MARSILEACEAE	<i>Pilularia globulifera</i> L.	Pilulaire à globules [Pilulaire]	I	D	EX			(oui)		N1	E(V);(R)
OPHIOGLOSSACEAE	<i>Botrychium lunaria</i> (L.) Swartz	Botryche lunaire	I	D	EX			(oui)			(R)
OPHIOGLOSSACEAE	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	Ophioglosse commune [Langue de serpent]	I	RR	CR			oui		R1	R
OSMUNDACEAE	<i>Osmunda regalis</i> L.	Osmonde royale	I(C)	RR	CR	p	E	oui		R1;C0	R
POLYPODIACEAE	<i>Polypodium cambricum</i> L.	Polypode de Galles	I	D	EX			(oui)			(R)
POLYPODIACEAE	<i>Polypodium interjectum</i> Shivas	Polypode intermédiaire	I	AC?	DD						
POLYPODIACEAE	<i>Polypodium vulgare</i> L.	Polypode vulgaire	I	PC?	DD						
POLYPODIACEAE	<i>Polypodium xmantoniae</i> Rothm. [<i>Polypodium interjectum</i> Shivas x <i>Polypodium vulgare</i> L.]	Polypode de Manton	I	RR?	H						
THELYPTERIDACEAE	<i>Oreopteris limbosperma</i> (Bellardi ex All.) Holub	Oréoptéride des montagnes [Fougère des montagnes]	I	RR	CR			oui		R1	R
THELYPTERIDACEAE	<i>Phegopteris connectilis</i> (Michaux) Watt	Phégoptéride polypode	I	RR	EN			oui		R1	R
THELYPTERIDACEAE	<i>Thelypteris palustris</i> Schott	Thélyptéride des marais [Fougère des marais]	I	RR	CR			oui		R1	R
WOODSIACEAE	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth	Athyrium fougère-femelle [Fougère femelle]	I	AC	LC						
WOODSIACEAE	<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.	Cystoptéride fragile	I	D?	EX?			(oui)			(R)
WOODSIACEAE	<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman	Gymnocarpion du chêne	I	RR	EN			oui		R1	R
WOODSIACEAE	<i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffmann) Newman	Gymnocarpion du calcaire	I	E	CR			oui			R
CUPRESSACEAE	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A. Murray) Parl.	Petit-cyprès de Lawson [Cyprès de Lawson]	C		H	j(p)	C				
CUPRESSACEAE	<i>Juniperus communis</i> L.	Genévrier commun (s.l.)	I	PC	NT			oui			
CUPRESSACEAE	<i>Juniperus communis</i> L. subsp. <i>communis</i>	Genévrier commun	I	PC	NT			oui			
CUPRESSACEAE	<i>Thuja plicata</i> Donn ex D. Don	Thuya géant	C	?	H	pj	?				

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
CUPRESSACEAE	× <i>Cupressocyparis leylandii</i> (A.B. Jackson et Dallim.) Dallim. [<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw. ex Gord. × <i>Chamaecyparis nootkatensis</i> (D. Don) Spach]	Cupressocyparis de Leyland [Cyprès de Leyland]	C		H	pj	C				
PINACEAE	<i>Abies alba</i> Mill.	Sapin pectiné	C(S)	?	H	fp	PC				
PINACEAE	<i>Abies grandis</i> (Dougl. ex D. Don) Lindl.	Sapin géant	C(S)		H	fp	R				
PINACEAE	<i>Abies nordmanniana</i> (Steven) Spach	Sapin de Nordmann	C		H	pj	R				
PINACEAE	<i>Larix decidua</i> Mill.	Mélèze d'Europe	C(S)	R?	H	spj	PC?				
PINACEAE	<i>Larix kaempferi</i> (Lambert) Carr.	Mélèze du Japon	C	?	H	s(p)	PC?				
PINACEAE	<i>Larix ×marschlinii</i> Coaz [<i>Larix decidua</i> Mill. × <i>Larix kaempferi</i> (Lambert) Carr.]	Mélèze de Marchslins	C(N?)	?	H	sp(j)	?				
PINACEAE	<i>Picea abies</i> (L.) Karst.	Épicéa commun [Pesse]	C(S)	PC?	H	sp(j)	AC				
PINACEAE	<i>Picea sitchensis</i> (Bong.) Carr.	Épicéa de Sitka	C(S)	?	H	sp	R				
PINACEAE	<i>Pinus nigra</i> Arnold	Pin noir (s.l.)	C(NS)	AR?	H	s(pj)	PC?				
PINACEAE	<i>Pinus nigra</i> Arnold subsp. <i>laricio</i> Maire	Pin laricio [Pin de Corse]	C(NS)	?	H	s(pj)	PC?				
PINACEAE	<i>Pinus nigra</i> Arnold subsp. <i>nigra</i>	Pin noir [Pin noir d'Autriche]	C(NS)	R?	H	s(pj)	AR				
PINACEAE	<i>Pinus pinaster</i> Ait.	Pin maritime	C(N?S)	?	H	s(pj)	RR?				
PINACEAE	<i>Pinus strobus</i> L.	Pin de Weymouth [Pin Weymouth]	C(S)	?	H	j	RR?				
PINACEAE	<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pin sylvestre	C(NS)	AC?	H	s(pj)	AC				
PINACEAE	<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco	Pseudotsuga de Menzies (s.l.) [Sapin de Douglas]	C(S)	?	H	s(pj)	PC				
PINACEAE	<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco subsp. <i>glaucescens</i> (Schwerin) P.D. Sell	Pseudotsuga glauque [Sapin de Douglas]	??	??	??						
PINACEAE	<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco subsp. <i>menziesii</i>	Pseudotsuga de Menzies [Sapin de Douglas]	??	??	??						
PINACEAE	<i>Tsuga heterophylla</i> (Rafin.) Sarg.	Tsuga de Californie	C(S)	?	H	sj	?				
TAXACEAE	<i>Taxus baccata</i> L.	If commun [If]	C(INS)	PC?	DD	j(p)	PC			C0	
ACANTHACEAE	<i>Acanthus hungaricus</i> (Borbás) Baenitz	Acanthe de Hongrie	??	??	??						
ACERACEAE	<i>Acer campestre</i> L.	Érable champêtre	I(NSC)	CC	LC	pj	AC				
ACERACEAE	<i>Acer campestre</i> L. var. <i>campestre</i>	Érable champêtre (var.)	??	??	??						
ACERACEAE	<i>Acer campestre</i> L. var. <i>hebecarpum</i> DC.	Érable champêtre (var.)	I(NSC)	CC?	DD	pj	?				
ACERACEAE	<i>Acer negundo</i> L.	Érable négondo	C		H	pj	?		P		
ACERACEAE	<i>Acer platanoides</i> L.	Érable plane	I(NSC)	PC	LC	spj	?				
ACERACEAE	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Érable sycomore [Sycomore]	I(NSC)	CC	LC	spj	?				
ADOXACEAE	<i>Adoxa moschatellina</i> L.	Adoxe moscatelline	I	AC	LC						
AGAVACEAE	<i>Yucca gloriosa</i> L. var. <i>gloriosa</i>	Yucca glorieux (var.)	??	??	??						
AIZOACEAE	<i>Tetragonia tetragonioides</i> (Pallas) O. Kuntze	Tétragone étalée	C		H	a	RR				

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
ALISMATACEAE	<i>Alisma gramineum</i> Lej.	Plantain-d'eau graminé	E?(I)	(D?)	(EX?)					N2	
ALISMATACEAE	<i>Alisma lanceolatum</i> With.	Plantain-d'eau lancéolé	I	AR	NT			oui			
ALISMATACEAE	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Plantain-d'eau commun [Plantain d'eau]	I	AC	LC						
ALISMATACEAE	<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl.	Baldellie fausse-renoncule (s.l.)	I	RR	CR			oui		R1	E(Vp);R
ALISMATACEAE	<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl. subsp. <i>ranunculoides</i>	Baldellie fausse-renoncule	I	RR	CR			oui		R1*	R
ALISMATACEAE	<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl. subsp. <i>repens</i> (Lam.) Á. et D. Löve	Baldellie rampante	I	D?	EX?			(oui)		R1*	E(V);(R)
ALISMATACEAE	<i>Damasonium alisma</i> Mill.	Damasonie étoilée	I	E	CR			oui		N1	R
ALISMATACEAE	<i>Luronium natans</i> (L.) Rafin.	Luronium nageant	I	E	CR			oui		H2;B;N1	E(V);R
ALISMATACEAE	<i>Sagittaria sagittifolia</i> L.	Sagittaire flèche-d'eau [Fléchière]	I(C)	R	VU	p	E?	oui			R
ALLIACEAE	<i>Allium carinatum</i> L.	Ail caréné	I?(C)	D	NE	p	E				
ALLIACEAE	<i>Allium cepa</i> L.	Ail oignon [Oignon ; Échalotte]	C(S)	?	H	a	CC				
ALLIACEAE	<i>Allium fistulosum</i> L.	Ail fistuleux [Ciboule]	C		H	a	R				
ALLIACEAE	<i>Allium oleraceum</i> L.	Ail potager	I	R	NT			oui			
ALLIACEAE	<i>Allium porrum</i> L.	Ail poireau	C(S)	?	H	a	CC				
ALLIACEAE	<i>Allium sativum</i> L.	Ail cultivé (s.l.)	C(S)	?	H	a	CC				
ALLIACEAE	<i>Allium sativum</i> L. subsp. <i>sativum</i>	Ail cultivé	C(S)	?	H	a	CC				
ALLIACEAE	<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Ail civette [Ciboulette]	C(S)	?	H	a	C				
ALLIACEAE	<i>Allium scorodoprasum</i> L.	Ail rocambole [Rocambole]	C(S?)	?	H	a(p)	RR?				
ALLIACEAE	<i>Allium sphaerocephalon</i> L.	Ail à tête ronde	I	R	NT			oui			
ALLIACEAE	<i>Allium ursinum</i> L.	Ail des ours	I	PC	LC						
ALLIACEAE	<i>Allium vineale</i> L.	Ail des vignes	I	C	LC						
AMARANTHACEAE	<i>Amaranthus albus</i> L.	Amarante blanche	A	E?	H						
AMARANTHACEAE	<i>Amaranthus blitoides</i> S. Watson	Amarante à feuilles marginées	A	E	H						
AMARANTHACEAE	<i>Amaranthus blitum</i> L.	Amarante livide (s.l.)	I?(A)	?	NE						
AMARANTHACEAE	<i>Amaranthus blitum</i> L. subsp. <i>blitum</i>	Amarante livide	I?	?	NE						
AMARANTHACEAE	<i>Amaranthus blitum</i> L. subsp. <i>blitum</i> var. <i>blitum</i>	Amarante livide (var.)	I?	?	NE						
AMARANTHACEAE	<i>Amaranthus blitum</i> L. subsp. <i>emarginatus</i> (Moq. ex Uline et Bray) Carretero, Muñoz Garmendia et Pedrol	Amarante émarginée	A	?	H						
AMARANTHACEAE	<i>Amaranthus deflexus</i> L.	Amarante couchée	A	RR?	H						
AMARANTHACEAE	<i>Amaranthus graecizans</i> L.	Amarante africaine (s.l.)	A	?	H						
AMARANTHACEAE	<i>Amaranthus graecizans</i> L. subsp. <i>sylvestris</i> (Vill.) Brenan	Amarante sauvage	A	?	H						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
AMARANTHACEAE	<i>Amaranthus hybridus</i> L.	Amarante hybride (s.l.)	A(C)	?	H	j	?				
AMARANTHACEAE	<i>Amaranthus hybridus</i> L. subsp. <i>bouchonii</i> (Thell.) O. Bolòs et Vigo	Amarante de Bouchon	A?	?	H						
AMARANTHACEAE	<i>Amaranthus hybridus</i> L. subsp. <i>hybridus</i>	Amarante hybride	A(C)	?	H	j	?				
AMARANTHACEAE	<i>Amaranthus hybridus</i> L. subsp. <i>hybridus</i> var. <i>hybridus</i>	Amarante hybride (var.)	A	?	H						
AMARANTHACEAE	<i>Amaranthus hybridus</i> L. subsp. <i>hybridus</i> var. <i>patulus</i> (Bertol.) Thell.	Amarante hybride (var.)	??	??	??						
AMARANTHACEAE	<i>Amaranthus hybridus</i> L. subsp. <i>hybridus</i> var. <i>pseudoretroflexus</i> (Thell.) Carretero	Amarante hybride (var.)	??	??	??						
AMARANTHACEAE	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Amarante réfléchie	Z	AC?	ZDD						
AMARANTHACEAE	<i>Amaranthus spinosus</i> L.	Amarante épineuse	A	D	H						
AMARYLLIDACEAE	<i>Galanthus nivalis</i> L.	Galanthe perce-neige [Perce-neige]	ZC(S)	PC?	ZDD	j	CC			H5;C0;A2<>1	
AMARYLLIDACEAE	<i>Galanthus nivalis</i> L. var. <i>nivalis</i>	Galanthe perce-neige (var.) [Perce-neige]	ZC(S)	PC?	ZDD	j	CC			H5*;C0*;A2<>1*	
AMARYLLIDACEAE	<i>Leucojum aestivum</i> L.	Nivéole d'été	C(N)	E	H	j(p)	E{E,?}			[N1]	
AMARYLLIDACEAE	<i>Leucojum vernum</i> L.	Nivéole printanière	N	E?	H					C0	
AMARYLLIDACEAE	<i>Narcissus poeticus</i> L.	Narcisse des poètes	C(S)	E?	H	j	AC?			C0	
AMARYLLIDACEAE	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	Narcisse faux-narcisse (s.l.)	IC(NS)	PC?	DD	j	C			C0	
AMARYLLIDACEAE	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L. subsp. <i>major</i> (Curt.) Baker	Narcisse élevé [Jonquille d'Espagne]	C(NS)	?	H	j	C			C0*	
AMARYLLIDACEAE	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L. subsp. <i>pseudonarcissus</i>	Narcisse faux-narcisse [Jonquille]	I(NC)	PC	NT	j	AR?	oui		C0*	
AMARYLLIDACEAE	<i>Narcissus ×incomparabilis</i> Mill. [<i>Narcissus poeticus</i> L. × <i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.]	Narcisse incomparable	N(C)	D	H	j	?				
AMARYLLIDACEAE	<i>Narcissus ×medioluteus</i> Mill. [<i>Narcissus poeticus</i> L. × <i>Narcissus tazetta</i> L.]	Narcisse bicolore	N(C)	D	H	j	?				
AMYGDALACEAE	<i>Prunus armeniaca</i> L.	Prunier abricotier [Abricotier]	C		H	a	PC?				
AMYGDALACEAE	<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Prunier merisier (s.l.)	I(NC)	CC	LC	sa	AC?				
AMYGDALACEAE	<i>Prunus avium</i> (L.) L. subsp. <i>avium</i>	Prunier merisier [Merisier sauvage]	I(NC)	CC	LC	s	?				
AMYGDALACEAE	<i>Prunus avium</i> (L.) L. subsp. <i>juliana</i> (L.) Janchen	Prunier cerisier [Cerisier cultivé]	C(S)	?	H	a	AC?				
AMYGDALACEAE	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	Prunier myrobolan [Myrobolan]	C(S)	?	H	j	?				
AMYGDALACEAE	<i>Prunus cerasus</i> L.	Prunier griottier [Griottier]	C(N?S)	?	H	a	C				
AMYGDALACEAE	<i>Prunus domestica</i> L.	Prunier domestique (s.l.)	C(N?S)	?	H	a(p)	AC?				
AMYGDALACEAE	<i>Prunus domestica</i> L. subsp. <i>domestica</i>	Prunier domestique [Prunier]	C(S)	?	H	a	AC?				
AMYGDALACEAE	<i>Prunus domestica</i> L. subsp. <i>insititia</i> (L.) Bonnier et Layens	Prunier crêpe [Pruneautier ; Prunéolier]	C(N?S)	?	H	a(p)	?				
AMYGDALACEAE	<i>Prunus domestica</i> L. subsp. <i>italica</i> (Borkh.) Gams	Prunier d'Italie [Reine-claude et Prune-monsieur]	C		H	a	?				
AMYGDALACEAE	<i>Prunus domestica</i> L. subsp. <i>syriaca</i> (Borkh.) Janchen ex Mansf.	Prunier de Syrie	C		H	a	?				
AMYGDALACEAE	<i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A. Webb	Prunier amandier [Amandier]	C		H	a	RR?				

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
AMYGDALACEAE	<i>Prunus laurocerasus</i> L.	Prunier laurier-cerise [Laurier-cerise]	C(NS)	?	H	pj	CC				
AMYGDALACEAE	<i>Prunus laurocerasus</i> L. var. <i>caucasica</i> (Kirchner) Jaeger	Prunier laurier-cerise (var.) [Laurier-cerise]	??	??	??						
AMYGDALACEAE	<i>Prunus laurocerasus</i> L. var. <i>schipkaensis</i> Späth ex H. Späth	Prunier laurier-cerise (var.) [Laurier-cerise]	??	??	??						
AMYGDALACEAE	<i>Prunus mahaleb</i> L.	Prunier de Sainte-Lucie [Bois de Sainte-Lucie]	I	PC	LC						
AMYGDALACEAE	<i>Prunus padus</i> L.	Prunier à grappes [Cerisier à grappes ; Putiet]	C(!?NS)	?{?,E,?}	NE	p	?				
AMYGDALACEAE	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	Prunier pêcheur [Pêcher]	C		H	a	PC?				
AMYGDALACEAE	<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	Prunier tardif [Cerisier tardif]	N	E	H				A		
AMYGDALACEAE	<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunier épineux [Prunellier]	I	CC	LC						
AMYGDALACEAE	<i>Prunus ×fruticans</i> Weihe [<i>Prunus domestica</i> L. subsp. <i>insititia</i> (L.) Bonnier et Layens × <i>Prunus spinosa</i> L.]	Prunier frutescent [Prunellier à gros fruits]	N	?	H						
ANACARDIACEAE	<i>Cotinus coggygria</i> Scop.	Fustet des teinturiers [Arbre à perruque]	C		H	j(p)	AC?				
ANACARDIACEAE	<i>Rhus radicans</i> L.	Sumac radicaant	E								
ANACARDIACEAE	<i>Rhus toxicodendron</i> L.	Sumac toxique	C	?	H	p					
APIACEAE	<i>Aegopodium podagraria</i> L.	Égopode podagraire [Herbe aux goutteux]	I(NSC)	AC	LC	d	?				
APIACEAE	<i>Aethusa cynapium</i> L.	Éthuse ache-des-chiens [Petite ciguë]	I	AC	LC						
APIACEAE	<i>Aethusa cynapium</i> L. var. <i>agrestis</i> Wallr.	Éthuse ache-des-chiens (var.) [Petite ciguë]	??	??	??						
APIACEAE	<i>Aethusa cynapium</i> L. var. <i>cynapium</i>	Éthuse ache-des-chiens (var.) [Petite ciguë]	I	AC?	DD						
APIACEAE	<i>Aethusa cynapium</i> L. var. <i>gigantea</i> Lej.	Éthuse ache-des-chiens (var.) [Petite ciguë]	E?(!A?)	(?)	(NE)						
APIACEAE	<i>Ammi majus</i> L.	Ammi élevé	I	RR?	DD			oui			
APIACEAE	<i>Ammi visnaga</i> (L.) Lam.	Ammi visnage [Herbe aux cure-dents]	A	D	H						
APIACEAE	<i>Anethum graveolens</i> L.	Aneth odorant [Aneth ; Fenouil bâtard]	C		H	a	RR?				
APIACEAE	<i>Angelica archangelica</i> L.	Angélique officinale (s.l.)	NC	E	H	a	RR?			R1	[F1(Ep)]
APIACEAE	<i>Angelica archangelica</i> L. subsp. <i>archangelica</i>	Angélique officinale [Angélique]	NC	E	H	a	RR?			R1*	
APIACEAE	<i>Angelica sylvestris</i> L.	Angélique sauvage	I	C	LC						
APIACEAE	<i>Angelica sylvestris</i> L. var. <i>sylvestris</i>	Angélique sauvage (var.)	I	C	LC						
APIACEAE	<i>Anthriscus caucalis</i> Bieb.	Anthriscus des dunes [Cerfeuil des fous]	I	RR?	DD			oui			
APIACEAE	<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffmann	Anthriscus cerfeuil [Cerfeuil cultivé]	C(S)	?	H	a	C				
APIACEAE	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffmann	Anthriscus sauvage [Persil d'âne]	I	CC	LC						
APIACEAE	<i>Apium graveolens</i> L.	Ache odorante [Céleri]	I(C)	E	EN	a	AC?	oui			Rp
APIACEAE	<i>Apium graveolens</i> L. var. <i>dulce</i> (Mill.) DC.	Ache odorante (var.) [Céleri vert]	C		H	a	PC?				
APIACEAE	<i>Apium graveolens</i> L. var. <i>graveolens</i>	Ache odorante (var.)	I	E	EN			oui			R

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
APIACEAE	<i>Apium graveolens</i> L. var. <i>rapaceum</i> (Mill.) DC	Ache odorante (var.) [Céleri rave]	C		H	a	AC?				
APIACEAE	<i>Apium inundatum</i> (L.) Reichenb. f.	Ache inondée	I	RR	EN			oui			R
APIACEAE	<i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag.	Ache nodiflore	I	AC	LC						
APIACEAE	<i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag. var. <i>nodiflorum</i>	Ache nodiflore (var.)	I	AC	LC						
APIACEAE	<i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag. var. <i>ochreatum</i> (DC.) Bab.	Ache nodiflore (var.)	I	?	DD						
APIACEAE	<i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag.	Ache rampante	I	E	CR			oui		H2;B;N1	E(V);R
APIACEAE	<i>Apium »longipedunculatum</i> (F.W. Schultz) Rothm. [<i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag. » <i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag.]	Ache à long pédoncule	??	??	??						
APIACEAE	<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville	Bérule à feuilles étroites [Petite berle]	I	AR	NT			oui			
APIACEAE	<i>Bifora radians</i> Bieb.	Bifore rayonnante	A	D	H						
APIACEAE	<i>Bunium bulbocastanum</i> L.	Bunium noix-de-terre [Terrenoix]	I	E	CR			oui			R
APIACEAE	<i>Bupleurum affine</i> Sadler	Buplèvre voisin	E								
APIACEAE	<i>Bupleurum falcatum</i> L.	Buplèvre en faux	I	PC	LC						
APIACEAE	<i>Bupleurum fruticosum</i> L.	Buplèvre ligneux	C(N)	E	H	j	?				
APIACEAE	<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Buplèvre à feuilles rondes	I	D	EX			(oui)			(R)
APIACEAE	<i>Bupleurum subovatum</i> Link ex Spreng.	Buplèvre ovale	A	D	H						
APIACEAE	<i>Bupleurum tenuissimum</i> L.	Buplèvre menu	I	D	EX			(oui)			(R)
APIACEAE	<i>Carum carvi</i> L.	Carvi officinal [Cumin des prés ; Carvi]	C(N?)	D	H	a	D				
APIACEAE	<i>Carum verticillatum</i> (L.) Koch	Carvi verticillé	I(C)	RR	VU	p	E	oui			R
APIACEAE	<i>Caucalis platycarpus</i> L.	Caucalide à fruits plats	I	E	CR			oui			R
APIACEAE	<i>Chaerophyllum hirsutum</i> L.	Cerfeuil hérissé	S	D	H						
APIACEAE	<i>Chaerophyllum temulum</i> L.	Cerfeuil penché	I	CC	LC						
APIACEAE	<i>Cicuta virosa</i> L.	Cicutaire vireuse [Ciguë aquatique]	C		H	p	E?				
APIACEAE	<i>Conium maculatum</i> L.	Ciguë tachée [Grande ciguë]	I	AR	LC						
APIACEAE	<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret	Conopode dénudé	I	PC	LC						
APIACEAE	<i>Coriandrum sativum</i> L.	Coriandre cultivée [Coriandre]	C(S)	?	H	a	R?				
APIACEAE	<i>Crithmum maritimum</i> L.	Crithme maritime [Fenouil marin ; Perce-pierre]	I	RR	NT			oui		C0	
APIACEAE	<i>Cyclospermum leptophyllum</i> (Pers.) Sprague ex Britton et P.G. Wilson	Cyclosperme à feuilles menues	A	E	H						
APIACEAE	<i>Daucus carota</i> L.	Carotte commune (s.l.)	I(SC)	CC	LC	a	CC				
APIACEAE	<i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>carota</i>	Carotte commune [Carotte]	I(SC)	CC	LC	a	CC				
APIACEAE	<i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>gummifer</i> Hook. f.	Carotte porte-gomme	I	RR	NT			oui			

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
APIACEAE	<i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>hispidus</i> (Arcang.) Heywood	Carotte hispide	E								
APIACEAE	<i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>sativus</i> (Hoffmann) Arcang.	Carotte cultivée	C(S)	?	H	a	CC				
APIACEAE	<i>Eryngium campestre</i> L.	Panicaut champêtre [Chardon roulant]	I	AC	LC						
APIACEAE	<i>Eryngium maritimum</i> L.	Panicaut maritime	I	E	CR			oui		C0	R
APIACEAE	<i>Falcaria vulgaris</i> Bernh.	Falcaire des champs	I?N?(A)	E	NE						
APIACEAE	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Fenouil commun	N(S?C)	R	H	a	PC?				
APIACEAE	<i>Heracleum mantegazzianum</i> Somm. et Lev.	Berce du Caucase	N(SC)	RR	H	dj	R?		A		
APIACEAE	<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Berce commune [Branc-ursine]	I	CC	LC						
APIACEAE	<i>Heracleum sphondylium</i> L. var. <i>angustifolium</i> (Crantz) C.C. Gmel.	Berce commune (var.) [Branc-ursine]	I	?	DD						
APIACEAE	<i>Heracleum sphondylium</i> L. var. <i>sphondylium</i>	Berce commune (var.) [Branc-ursine]	I	CC	LC						
APIACEAE	<i>Heracleum sphondylium</i> L. var. <i>stenophyllum</i> (Gaudin) Moritz	Berce commune (var.) [Branc-ursine]	I	?	DD						
APIACEAE	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	Hydrocotyle commune [Écuelle d'eau]	I	AR	NT			oui			
APIACEAE	<i>Levisticum officinale</i> Koch	Livèche officinale [Céleri perpétuel]	C(S)	D	H	a	PC?				
APIACEAE	<i>Myrrhis odorata</i> (L.) Scop.	Myrrhede odorante [Cerfeuil musqué]	C(NS)	E?	H	j	RR?				
APIACEAE	<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir.	Oenanthe aquatique	I	R	VU			oui			R
APIACEAE	<i>Oenanthe crocata</i> L.	Oenanthe safranée [Pensacre]	I	R	NT			oui			
APIACEAE	<i>Oenanthe fistulosa</i> L.	Oenanthe fistuleuse	I	R	VU			oui			R
APIACEAE	<i>Oenanthe fluviatilis</i> (Bab.) C. Gmel.	Oenanthe fluviatile	I	RR?	DD			oui			
APIACEAE	<i>Oenanthe lachenalii</i> C.C. Gmel.	Oenanthe de Lachenal	I	RR	CR			oui			R
APIACEAE	<i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich	Oenanthe à feuilles de peucedan	I	D?	EX?			(oui)			(R)
APIACEAE	<i>Oenanthe pimpinelloides</i> L.	Oenanthe faux-boucage	I	E	CR			oui			R
APIACEAE	<i>Oenanthe silaifolia</i> Bieb.	Oenanthe à feuilles de silaüs	I	R	VU			oui			R
APIACEAE	<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffmann	Orlaye à grandes fleurs	I	D	EX			(oui)			(R)
APIACEAE	<i>Pastinaca sativa</i> L.	Panais commun (s.l.) [Panais]	IZ(C)	AC{AC,?}	LC{LC,DD}	a	R?				
APIACEAE	<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Panais commun [Panais]	I(C)	AC	LC	a	R?				
APIACEAE	<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i> var. <i>pratensis</i> Pers.	Panais commun (var.) [Panais]	??	??	??						
APIACEAE	<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i> var. <i>sativa</i>	Panais commun (var.) [Panais]	C		H	a	R?				
APIACEAE	<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i> var. <i>sylvestris</i> (Mill.) DC.	Panais commun (var.) [Panais]	??	??	??						
APIACEAE	<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>urens</i> (Req. ex Godr.) Celak.	Panais brûlant	Z	?	ZDD						
APIACEAE	<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A.W. Hill	Persil cultivé [Persil]	C(N?S)	?	H	a	CC				

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
APIACEAE	<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A.W. Hill var. <i>crispum</i>	Persil cultivé (var.) [Persil frisé]	C		H	a	CC				
APIACEAE	<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A.W. Hill var. <i>vulgare</i> (Noisette) Danert	Persil cultivé (var.)	C(N?S)	?	H	a	AC?				
APIACEAE	<i>Petroselinum segetum</i> (L.) Koch	Persil des moissons	I	D?	EX?			(oui)			E(V);(R)
APIACEAE	<i>Peucedanum carvifolia</i> Vill.	Peucedan à feuilles de carvi	I	E	CR			oui			R
APIACEAE	<i>Peucedanum carvifolia</i> Vill. var. <i>autumnale</i> (Holandre) Rouy et E.G. Camus	Peucedan à feuilles de carvi (var.)	??	??	??			[oui]			[R]
APIACEAE	<i>Peucedanum carvifolia</i> Vill. var. <i>carvifolia</i>	Peucedan à feuilles de carvi (var.)	??	??	??			[oui]			[R]
APIACEAE	<i>Peucedanum cervaria</i> (L.) Lapeyr.	Peucedan des cerfs	I	E	CR			oui			R
APIACEAE	<i>Peucedanum gallicum</i> Latourr.	Peucedan de France	I	D?	EX?			(oui)			(R)
APIACEAE	<i>Peucedanum oreoselinum</i> (L.) Moench	Peucedan oréosélin [Persil de montagne]	I	D?	EX?			(oui)			(R)
APIACEAE	<i>Peucedanum palustre</i> (L.) Moench	Peucedan des marais	I	E	CR			oui			R
APIACEAE	<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.	Boucage élevé [Grand boucage]	I	C	LC						(Rp)
APIACEAE	<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds. var. <i>bipinnata</i> (G. Beck) Burnat	Boucage élevé (var.) [Grand boucage]	I	D?	EX?			(oui)			(R)
APIACEAE	<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds. var. <i>major</i>	Boucage élevé (var.) [Grand boucage]	I	C	LC						
APIACEAE	<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	Boucage saxifrage [Petit boucage]	I	AC?	DD						
APIACEAE	<i>Pimpinella saxifraga</i> L. var. <i>saxifraga</i>	Boucage saxifrage (var.) [Petit boucage]	I	?	DD						
APIACEAE	<i>Pimpinella saxifraga</i> L. var. <i>seselifolia</i> Rouy et E.G. Camus	Boucage saxifrage (var.) [Petit boucage]	I	?	DD						
APIACEAE	<i>Sanicula europaea</i> L.	Sanicle d'Europe [Sanicle]	I	PC	LC						
APIACEAE	<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	Scandix peigne-de-Vénus [Peigne de Vénus]	I	RR	CR			oui			R
APIACEAE	<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L.	Sélin à feuilles de carvi	I	RR	CR			oui			R
APIACEAE	<i>Seseli annuum</i> L.	Séséli coloré	I	E	CR			oui			R
APIACEAE	<i>Seseli libanotis</i> (L.) Koch	Séséli libanotide	I	PC	LC						
APIACEAE	<i>Seseli libanotis</i> (L.) Koch f. <i>callayi</i> (J. Duvigneaud) J. Duvigneaud	Séséli libanotide (f.)	??	??	??						
APIACEAE	<i>Seseli libanotis</i> (L.) Koch f. <i>libanotis</i>	Séséli libanotide (f.)	I	PC	LC						
APIACEAE	<i>Seseli montanum</i> L.	Séséli des montagnes	I	R	NT			oui			
APIACEAE	<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz et Thell.	Silaüs des prés	I	R	NT			oui			
APIACEAE	<i>Sison amomum</i> L.	Sison amone	I	RR	VU			oui			R
APIACEAE	<i>Sium latifolium</i> L.	Berle à larges feuilles [Grande berle]	I	E	CR			oui			R
APIACEAE	<i>Tordylium maximum</i> L.	Tordyle élevé	I	E	CR			oui			R
APIACEAE	<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link	Torilis des champs (s.l.)	I	RR?	DD			oui			
APIACEAE	<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link subsp. <i>arvensis</i>	Torilis des champs	I	RR?	DD			oui			

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
APIACEAE	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Torilis des haies	I	CC	LC						
APIACEAE	<i>Torilis leptophylla</i> (L.) Reichenb. f.	Tordyle à feuilles menues	A	D	H						
APIACEAE	<i>Torilis nodosa</i> (L.) Gaertn.	Torilis noueuse	I	E	CR			oui			R
APIACEAE	<i>Trinia glauca</i> (L.) Dum.	Trinie glauque	I	E	CR			oui			R
APIACEAE	<i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffmann	Turgénie à larges feuilles	I	D	EX			(oui)			(R)
APOCYNACEAE	<i>Vinca major</i> L.	Pervenche à grandes fleurs [Grande pervenche]	C(NS)	PC?	H	j	C				
APOCYNACEAE	<i>Vinca minor</i> L.	Pervenche couchée [Petite pervenche]	I	AC	LC						
AQUIFOLIACEAE	<i>Ilex aquifolium</i> L.	Houx commun [Houx]	I(C)	CC	LC	pj	?			C0	
ARACEAE	<i>Acorus calamus</i> L.	Acore odorant	N?C	D	H	p	E?				
ARACEAE	<i>Arum italicum</i> Mill.	Gouet d'Italie (s.l.)	SC(I?N)	AR	NE	j	PC				
ARACEAE	<i>Arum italicum</i> Mill. subsp. <i>italicum</i>	Gouet d'Italie	C(NS)	?	H	j	?				
ARACEAE	<i>Arum italicum</i> Mill. subsp. <i>neglectum</i> (F. Townsend) Prime	Gouet négligé	I?N?S?	?	NE						
ARACEAE	<i>Arum maculatum</i> L.	Gouet tacheté	I	CC	LC						
ARACEAE	<i>Calla palustris</i> L.	Calla	C(N)	D	H	p	D			[N1]	[F1(R)]
ARALIACEAE	<i>Hedera helix</i> L.	Lierre grimpant (s.l.)	I(C)	CC	LC	j	AC?				
ARALIACEAE	<i>Hedera helix</i> L. subsp. <i>helix</i>	Lierre grimpant	I(C)	CC	LC	j	AC?				
ARALIACEAE	<i>Hedera helix</i> L. subsp. <i>hibernica</i> (Kirschn.) McClintock	Lierre d'Irlande	??	??	??						
ARISTOLOCHIACEAE	<i>Aristolochia clematitis</i> L.	Aristolochie clématite [Sarrasine]	I	R	NT			oui			
ARISTOLOCHIACEAE	<i>Asarum europaeum</i> L.	Asaret d'Europe	I(I?)	D?	EX?			(oui)			(R)
ASCLEPIADACEAE	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Med.	Dompte-venin officinal	I	PC	LC						
ASTERACEAE	<i>Achillea ligustica</i> All.	Achillée de Ligurie	A	D	H						
ASTERACEAE	<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	I(C)	CC	LC	p	?				
ASTERACEAE	<i>Achillea ptarmica</i> L.	Achillée sternutatoire [Herbe à éternuer]	I	R	VU			oui			R
ASTERACEAE	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	Ambrosie annuelle	A	E	H				P		
ASTERACEAE	<i>Ambrosia maritima</i> L.	Ambrosie maritime	E?(A)	(D)	(H)						
ASTERACEAE	<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth.	Anaphale perlée [Immortelle blanche]	C(??)	??	H	j	?				
ASTERACEAE	<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	Antennaire dioïque [Pied-de-chat]	I	D	EX			(oui)		C0	(R)
ASTERACEAE	<i>Anthemis arvensis</i> L.	Camomille des champs [Fausse camomille]	I	RR	EN			oui			R
ASTERACEAE	<i>Anthemis cotula</i> L.	Camomille fétide	I	R	VU			oui			R
ASTERACEAE	<i>Anthemis nobilis</i> L.	Camomille romaine	I(C)	E	CR	d	?	oui			R

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
ASTERACEAE	<i>Anthemis tinctoria</i> L.	Camomille des teinturiers	A	D	H						
ASTERACEAE	<i>Arctium lappa</i> L.	Bardane à grosses têtes [Grande bardane]	I	AC	LC						
ASTERACEAE	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	Bardane à petits capitules (s.l.) [Petite bardane]	I	C	LC						
ASTERACEAE	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh. subsp. <i>minus</i>	Bardane à petits capitules [Petite bardane]	I	C?	DD						
ASTERACEAE	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh. subsp. <i>pubens</i> (Bab.) P. Fourn.	Bardane duveteuse	I	AR?	DD						
ASTERACEAE	<i>Arctium nemorosum</i> Lej.	Bardane des bois	I	PC?	DD						
ASTERACEAE	<i>Arctium tomentosum</i> Mill.	Bardane tomenteuse	I	E?	DD			oui			
ASTERACEAE	<i>Arctium ×nothum</i> (Ruhm.) Weiss [<i>Arctium lappa</i> L. × <i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.]	Bardane métissée (s.l.)	I	E?	H						
ASTERACEAE	<i>Arctium ×nothum</i> (Ruhm.) Weiss nsubsp. <i>debrayi</i> (Senay) Lambinon [<i>Arctium lappa</i> L. × <i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh. subsp. <i>pubens</i> (Bab.) P. Fourn.)]	Bardane de Debray	??	??	??						
ASTERACEAE	<i>Arctium ×nothum</i> (Ruhm.) Weiss nsubsp. <i>nothum</i> [<i>Arctium lappa</i> L. × <i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh. subsp. <i>minus</i>]	Bardane métissée	I	E?	H						
ASTERACEAE	<i>Arctium ×scanicum</i> Rouy [<i>Arctium lappa</i> L. × <i>Arctium nemorosum</i> Lej.]	Bardane de Scanie	??	??	??						
ASTERACEAE	<i>Arnoseris minima</i> (L.) Schweigg. et Körte	Arnoséride naine	I	E	CR			oui		R1	R
ASTERACEAE	<i>Artemisia abrotanum</i> L.	Armoise aurone [Aurone mâle ; Citronnelle]	C		H	d	R?				
ASTERACEAE	<i>Artemisia absinthium</i> L.	Armoise absinthe [Absinthe]	C(N?S)	D?	H	d	AR?				
ASTERACEAE	<i>Artemisia annua</i> L.	Armoise annuelle	A	E	H						
ASTERACEAE	<i>Artemisia biennis</i> Willd.	Armoise bisannuelle	??	??	??						
ASTERACEAE	<i>Artemisia campestris</i> L.	Armoise champêtre (s.l.)	I	E	CR			oui			R
ASTERACEAE	<i>Artemisia campestris</i> L. subsp. <i>campestris</i>	Armoise champêtre	I	E	CR			oui			R
ASTERACEAE	<i>Artemisia dracunculus</i> L.	Armoise estragon [Estragon]	C		H	a	PC?				
ASTERACEAE	<i>Artemisia maritima</i> L.	Armoise maritime	I	D	EX			(oui)			(R)
ASTERACEAE	<i>Artemisia maritima</i> L. var. <i>maritima</i>	Armoise maritime (var.)	I	D	EX			(oui)			(R)
ASTERACEAE	<i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte	Armoise des frères Verlot	N	?	H						
ASTERACEAE	<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Armoise commune [Herbe à cent goûts]	I	CC	LC						
ASTERACEAE	<i>Aster lanceolatus</i> Willd.	Aster lancéolé	N?S(C)	?	H	j	?		P		
ASTERACEAE	<i>Aster linosyris</i> (L.) Bernh.	Aster linosyris	I	R	VU			oui		R1	R
ASTERACEAE	<i>Aster novi-belgii</i> L.	Aster de Virginie	N?S(C)	?	H	j	?		P		
ASTERACEAE	<i>Aster salignus</i> Willd.	Aster à feuilles de saule	N?S(C)	?	H	j	?		P		
ASTERACEAE	<i>Aster squamatus</i> (Spreng.) Hieron.	Aster écailleux	A	E	H						
ASTERACEAE	<i>Aster tripolium</i> L.	Aster maritime	I	RR	NT			oui			
ASTERACEAE	<i>Aster tripolium</i> L. var. <i>discoideus</i> Reichenb. f.	Aster maritime (var.)	I	RR	NT			oui			

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
ASTERACEAE	<i>Aster tripolium</i> L. var. <i>tripolium</i>	Aster maritime (var.)	I	RR	NT			oui			
ASTERACEAE	<i>Baccharis halimifolia</i> L.	Baccharide à feuilles d'arroche [Séneçon en arbre]	C(NS?)	E	H	j	?		P		
ASTERACEAE	<i>Bellis perennis</i> L.	Pâquerette vivace	I(SC)	CC	LC	pj	C				
ASTERACEAE	<i>Bidens cernua</i> L.	Bident penché	I	R	NT			oui			
ASTERACEAE	<i>Bidens connata</i> Muhlenb. ex Willd.	Bident soudé	??	??	??						
ASTERACEAE	<i>Bidens frondosa</i> L.	Bident à fruits noirs	Z	R	ZLC				P		
ASTERACEAE	<i>Bidens frondosa</i> L. var. <i>anomala</i> Porter ex Fernald	Bident à fruits noirs (var.)	??	??	??				[P]		
ASTERACEAE	<i>Bidens frondosa</i> L. var. <i>frondosa</i>	Bident à fruits noirs (var.)	Z	R	ZLC				P		
ASTERACEAE	<i>Bidens pilosa</i> L.	Bident poilu	A	E	H						
ASTERACEAE	<i>Bidens radiata</i> Thuill.	Bident radié	I	D	EX			(oui)			(R)
ASTERACEAE	<i>Bidens tripartita</i> L.	Bident triparti	I	PC	LC						
ASTERACEAE	<i>Bidens tripartita</i> L. f. <i>minor</i> Wimm. et Grab.	Bident triparti (f.)	I	?	DD						
ASTERACEAE	<i>Bidens tripartita</i> L. f. <i>tripartita</i>	Bident triparti (f.)	I	PC	LC						
ASTERACEAE	<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smolj.	Soyère dressée	E?(I)	(D)	(EX)						
ASTERACEAE	<i>Calendula arvensis</i> L.	Souci des champs	I(A?)	RR	EN			oui			R
ASTERACEAE	<i>Calendula officinalis</i> L.	Souci officinal	C(S)	?	H	j	C?				
ASTERACEAE	<i>Carduus acanthoides</i> L.	Chardon faux-acanthe	I	?	DD						
ASTERACEAE	<i>Carduus crispus</i> L.	Chardon crépu (s.l.)	I	AC	LC						
ASTERACEAE	<i>Carduus crispus</i> L. subsp. <i>crispus</i>	Chardon crépu	??	??	??						
ASTERACEAE	<i>Carduus crispus</i> L. subsp. <i>multiflorus</i> (Gaudin) Greml	Chardon multiflore	I	AC	LC						
ASTERACEAE	<i>Carduus nutans</i> L.	Chardon penché (s.l.)	I	PC	LC						
ASTERACEAE	<i>Carduus nutans</i> L. subsp. <i>leiophyllus</i> (Petrovic) Arènes	Chardon à grandes bractées	??	??	??						
ASTERACEAE	<i>Carduus nutans</i> L. subsp. <i>nutans</i>	Chardon penché	I	PC	LC						
ASTERACEAE	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Chardon à trochets	A	D	H						
ASTERACEAE	<i>Carduus tenuiflorus</i> Curt.	Chardon à petits capitules	I	R	NT			oui			
ASTERACEAE	<i>Carduus ×stangii</i> Buek [<i>Carduus crispus</i> L. × <i>Carduus nutans</i> L.]	Chardon à épines nombreuses	I	D?	H						
ASTERACEAE	<i>Carlina acanthifolia</i> All.	Carlina à feuilles d'acanthé	C	D	H	p					
ASTERACEAE	<i>Carlina vulgaris</i> L.	Carlina commune (s.l.)	I	AC	LC						
ASTERACEAE	<i>Carlina vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	Carlina commune	I	AC	LC						
ASTERACEAE	<i>Carthamus lanatus</i> L.	Carthame laineux	I	E	EN			oui			R

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
ASTERACEAE	<i>Centaurea calcitrapa</i> L.	Centaurée chausse-trape	Z(A)	D	ZEX			(oui)			
ASTERACEAE	<i>Centaurea cyanus</i> L.	Centaurée bleuet	I(C)	R	VU	pj	?	oui			R
ASTERACEAE	<i>Centaurea jacea</i> L.	Centaurée jacée (s.l.)	I	C	LC						
ASTERACEAE	<i>Centaurea jacea</i> L. subsp. <i>debeauxii</i> (Godr. et Gren.) Douin	Centaurée de Debeaux	I	?	DD						
ASTERACEAE	<i>Centaurea jacea</i> L. subsp. <i>decipiens</i> (Thuill.) Celak.	Centaurée trompeuse	I	PC?	DD						
ASTERACEAE	<i>Centaurea jacea</i> L. subsp. <i>decipiens</i> (Thuill.) Celak. var. <i>decipiens</i> (Thuill.) Briq.	Centaurée trompeuse (var.)	I	PC?	DD						
ASTERACEAE	<i>Centaurea jacea</i> L. subsp. <i>decipiens</i> (Thuill.) Celak. var. <i>microptilon</i> (Godr.) Briq.	Centaurée trompeuse (var.)	E?(I)	(?)	(DD)						
ASTERACEAE	<i>Centaurea jacea</i> L. subsp. <i>grandiflora</i> (Gaudin) Schübl. et Martens	Centaurée des prés	I	?	DD						
ASTERACEAE	<i>Centaurea jacea</i> L. subsp. <i>jacea</i>	Centaurée jacée (s.str.)	E	#	#						
ASTERACEAE	<i>Centaurea jacea</i> L. subsp. <i>nigra</i> (L.) Bonnier et Layens	Centaurée noire	I	AC?	DD						
ASTERACEAE	<i>Centaurea jacea</i> L. subsp. <i>nigra</i> (L.) Bonnier et Layens var. <i>nemoralis</i> (Jord.) Briq. et Cavillier	Centaurée noire (var.) [Centaurée des bois]	I	AC?	DD						
ASTERACEAE	<i>Centaurea jacea</i> L. subsp. <i>nigra</i> (L.) Bonnier et Layens var. <i>nigra</i> (L.) Briq.	Centaurée noire (var.)	I	AR?	DD						
ASTERACEAE	<i>Centaurea jacea</i> L. subsp. <i>timbalii</i> (Martrin-Donos) Br.-Bl.	Centaurée de Timbal	I	E?	DD			oui			
ASTERACEAE	<i>Centaurea melitensis</i> L.	Centaurée de Malte	A	D	H						
ASTERACEAE	<i>Centaurea montana</i> L.	Centaurée des montagnes	C(S)	?	H	j	PC?				
ASTERACEAE	<i>Centaurea pullata</i> L.	Centaurée brune	A	D	H						
ASTERACEAE	<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Centaurée scabieuse	I	AC	LC						
ASTERACEAE	<i>Centaurea solstitialis</i> L.	Centaurée du solstice	A	D	H						
ASTERACEAE	<i>Chondrilla juncea</i> L.	Chondrille effilée	I	E	EN			oui			R
ASTERACEAE	<i>Cichorium endivia</i> L.	Chicorée endive (s.l.)	C		H	a	CC				
ASTERACEAE	<i>Cichorium endivia</i> L. subsp. <i>endivia</i>	Chicorée endive	C		H	a	CC				
ASTERACEAE	<i>Cichorium endivia</i> L. subsp. <i>endivia</i> var. <i>crispum</i> Lam.	Chicorée endive (var.) [Chicorée frisée]	C		H	a	CC				
ASTERACEAE	<i>Cichorium endivia</i> L. subsp. <i>endivia</i> var. <i>latifolium</i> Lam.	Chicorée endive (var.) [Chicorée scarole]	C		H	a	CC				
ASTERACEAE	<i>Cichorium intybus</i> L.	Chicorée sauvage	I(C)	AR?	DD	a	?				
ASTERACEAE	<i>Cichorium intybus</i> L. var. <i>foliosum</i> Hegi	Chicorée sauvage (var. cultivée)	C		H	a	?				
ASTERACEAE	<i>Cichorium intybus</i> L. var. <i>intybus</i>	Chicorée sauvage (var. indigène)	I	AR?	DD						
ASTERACEAE	<i>Cichorium intybus</i> L. var. <i>sativum</i> Bischoff	Chicorée sauvage (var. cultivée)	C		H	a	?				
ASTERACEAE	<i>Cirsium acaule</i> Scop.	Cirse acaule	I	AC	LC						
ASTERACEAE	<i>Cirsium acaule</i> Scop. f. <i>acaule</i>	Cirse acaule (f.)	I	PC?	DD						
ASTERACEAE	<i>Cirsium acaule</i> Scop. f. <i>caulescens</i> Reichenb.	Cirse acaule (f.)	I	PC?	DD						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
ASTERACEAE	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cirse des champs	I	CC	LC						
ASTERACEAE	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop. var. <i>arvense</i>	Cirse des champs (var.)	I	?	DD						
ASTERACEAE	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop. var. <i>horridum</i> Wimm. et Grab.	Cirse des champs (var.)	I	?	DD						
ASTERACEAE	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop. var. <i>vestitum</i> Wimm. et Grab.	Cirse des champs (var.)	I	?	DD						
ASTERACEAE	<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill	Cirse anglais	I	RR	CR			oui			R
ASTERACEAE	<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.	Cirse laineux	I	AR	LC						
ASTERACEAE	<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop. var. <i>eriphorum</i>	Cirse laineux (var.)	??	??	??						
ASTERACEAE	<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop. var. <i>platyonychinum</i> Wallr.	Cirse laineux (var.)	I	AR?	DD						
ASTERACEAE	<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.	Cirse maraîcher	I	PC	LC						
ASTERACEAE	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	Cirse des marais	I	C	LC						
ASTERACEAE	<i>Cirsium rivulare</i> (Jacq.) All.	Cirse des ruisseaux	E?(A)	(D)	(H)						
ASTERACEAE	<i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All.	Cirse tubéreux	I	D?	EX?			(oui)			(R)
ASTERACEAE	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cirse commun	I	CC	LC						
ASTERACEAE	<i>Cirsium ×gerhardtii</i> Schultz-Bip. [<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop. × <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.]	Cirse de Gerhardt	I	D	H						
ASTERACEAE	<i>Cirsium ×hybridum</i> Koch [<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop. × <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.]	Cirse hybride	I	E?	H						
ASTERACEAE	<i>Cirsium ×rigens</i> (Ait.) Wallr. [<i>Cirsium acaule</i> Scop. × <i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.]	Cirse raide	I	E	H						
ASTERACEAE	<i>Conyza bilbaoana</i> J. Rémy	Conyze de Bilbao	A	?	H				P		
ASTERACEAE	<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronq.	Conyze d'Argentine	A	?	H						
ASTERACEAE	<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronq.	Conyze du Canada	Z	CC	ZLC				A		
ASTERACEAE	<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) E. Walker	Conyze de Sumatra	N	?	H				P		
ASTERACEAE	<i>Crepis biennis</i> L.	Crépide bisannuelle	I	PC	LC						
ASTERACEAE	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Crépide capillaire	I	CC	LC						
ASTERACEAE	<i>Crepis foetida</i> L.	Crépide fétide	I	E	CR			oui			R
ASTERACEAE	<i>Crepis polymorpha</i> Pourr.	Crépide à feuilles de pissenlit	I	AC?	DD						
ASTERACEAE	<i>Crepis pulchra</i> L.	Crépide élégante	I	D?	EX?			(oui)			(R)
ASTERACEAE	<i>Crepis sancta</i> (L.) Bornm.	Crépide sacrée (s.l.)	Z	AR?	ZDD						
ASTERACEAE	<i>Crepis sancta</i> (L.) Bornm. subsp. <i>nemausensis</i> (Vill.) Babç.	Crépide de Nîmes	Z	AR?	ZDD						
ASTERACEAE	<i>Crepis setosa</i> Haller f.	Crépide hérissée	Z	AR?	ZDD						
ASTERACEAE	<i>Crepis tectorum</i> L.	Crépide des toits	I	D	EX			(oui)			(R)
ASTERACEAE	<i>Cynara scolymus</i> L.	Artichaut commun	C		H	a	PC				

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
ASTERACEAE	<i>Dittrichia graveolens</i> (L.) Greuter	Dittriche fétide	A	E?	H				P		
ASTERACEAE	<i>Doronicum pardalianches</i> L.	Doronic mort-aux-panthères	N(C)	RR?	H	j	?				
ASTERACEAE	<i>Doronicum plantagineum</i> L.	Doronic à feuilles de plantain	I	R	NT			oui		C0	
ASTERACEAE	<i>Doronicum ×willdenowii</i> (Rouy) A.W. Hill [<i>Doronicum pardalianches</i> L. × <i>Doronicum plantagineum</i> L.]		C(N?)	D?	H	j	?				
ASTERACEAE	<i>Echinops sphaerocephalus</i> L.	Échinope à tête ronde	C(S)	D	H	j	?				
ASTERACEAE	<i>Erigeron acer</i> L.	Vergerette âcre	I	AR?	DD						
ASTERACEAE	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf.	Vergerette annuelle (s.l.)	Z	?	ZDD						
ASTERACEAE	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf. subsp. <i>annuus</i>	Vergerette annuelle	??	??	??						
ASTERACEAE	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf. subsp. <i>septentrionalis</i> (Fernald et Wiegand) Wagenitz	Vergerette septentrionale	Z	?	ZDD						
ASTERACEAE	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf. subsp. <i>strigosus</i> (Muhlenb. ex Willd.) Wagenitz	Vergerette maigre	??	??	??						
ASTERACEAE	<i>Erigeron karvinskianus</i> DC.	Vergerette de Karvinski [Érigéron des murs]	S(C)	E?	H	j	R?				
ASTERACEAE	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Eupatoire chanvrine	I	CC	LC						
ASTERACEAE	<i>Filago arvensis</i> L.	Cotonnière des champs	I	E	CR			oui			R
ASTERACEAE	<i>Filago gallica</i> L.	Cotonnière de France	I	E	CR			oui			R
ASTERACEAE	<i>Filago lutescens</i> Jord.	Cotonnière jaunâtre	I	E	CR			oui			R
ASTERACEAE	<i>Filago minima</i> (Smith) Pers.	Cotonnière naine	I	RR	VU			oui			R
ASTERACEAE	<i>Filago pyramidata</i> L.	Cotonnière pyramidale	I	R	VU			oui			R
ASTERACEAE	<i>Filago vulgaris</i> Lam.	Cotonnière d'Allemagne	I	RR	EN			oui			R
ASTERACEAE	<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	Galinsoge à petites fleurs	N	E	H						
ASTERACEAE	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz et Pav.	Galinsoge cilié	Z	?	ZDD						
ASTERACEAE	<i>Glebionis segetum</i> (L.) Fourr.	[Chrysanthème des moissons]	I	AR	NT			oui			
ASTERACEAE	<i>Gnaphalium luteoalbum</i> L.	Gnaphale jaunâtre	I	RR	EN			oui			R
ASTERACEAE	<i>Gnaphalium sylvaticum</i> L.	Gnaphale des forêts	I	RR	VU			oui			R
ASTERACEAE	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.	Gnaphale des fanges	I	C	LC						
ASTERACEAE	<i>Gnaphalium undulatum</i> L.	Gnaphale ondulé	A	E	H						
ASTERACEAE	<i>Helianthus annuus</i> L.	Hélianthe annuel [Tournesol]	C(SA)	?	H	aj	C?				
ASTERACEAE	<i>Helianthus annuus</i> L. var. <i>annuus</i>	Hélianthe annuel (var.) [Tournesol]	??	??	??						
ASTERACEAE	<i>Helianthus annuus</i> L. var. <i>macrocarpus</i> (DC.) Cockerell	Hélianthe annuel (var.) [Tournesol]	C(SA)	?	H	aj	C?				
ASTERACEAE	<i>Helianthus laetiflorus</i> Pers.	Hélianthe vivace	??	??	??						
ASTERACEAE	<i>Helianthus tuberosus</i> L.	Hélianthe tubéreux [Topinambour]	C		H	a(p)	AR?				

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
ASTERACEAE	<i>Hieracium aurantiacum</i> L.	Épervière orangée	C(N)	E	H	j(p)	?{E,?}		P		
ASTERACEAE	<i>Hieracium bauhinii</i> Schult. ex Besser	Épervière de Bauhin	N?	D	H						
ASTERACEAE	<i>Hieracium caespitosum</i> Dum.	Épervière des prés	N?	D?	H						
ASTERACEAE	<i>Hieracium glaucinum</i> Jord.	Épervière précoce	E?(I)	(E?)	(DD)						
ASTERACEAE	<i>Hieracium lachenalii</i> C.C. Gmel.	Épervière de Lachenal	I	AC?	DD						
ASTERACEAE	<i>Hieracium lactucella</i> Wallr.	Épervière petite-laitue	I	R?	DD						
ASTERACEAE	<i>Hieracium laevigatum</i> Willd.	Épervière lisse	I	PC	LC						
ASTERACEAE	<i>Hieracium maculatum</i> Schrank	Épervière tachée	I	R?	DD						
ASTERACEAE	<i>Hieracium murorum</i> L.	Épervière des murs	I	AC?	DD						
ASTERACEAE	<i>Hieracium peleterianum</i> Mérat	Épervière de Lepeletier	I	D	EX			(oui)			(R)
ASTERACEAE	<i>Hieracium pilosella</i> L.	Épervière piloselle	I	AC	LC						
ASTERACEAE	<i>Hieracium piloselloides</i> Vill.	Épervière fausse-piloselle	E?(N?)	(D)	(H)						
ASTERACEAE	<i>Hieracium sabaudum</i> L.	Épervière de Savoie	I	R?	DD						
ASTERACEAE	<i>Hieracium saussureoides</i> (Arv.-Touv.) St.-Lag.	Épervière blanc de neige	??	??	??						
ASTERACEAE	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	Épervière en ombelle	I	AC	LC						
ASTERACEAE	<i>Hypochaeris glabra</i> L.	Porcelle glabre	I	RR	CR			oui			R
ASTERACEAE	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Porcelle enracinée (s.l.)	I	CC	LC						
ASTERACEAE	<i>Hypochaeris radicata</i> L. subsp. <i>ericetorum</i> v. Soest	Porcelle des bruyères	??	??	??						
ASTERACEAE	<i>Hypochaeris radicata</i> L. subsp. <i>radicata</i>	Porcelle enracinée	I	CC	LC						
ASTERACEAE	<i>Inula britannica</i> L.	Inule des fleuves	I	E	CR			oui			R
ASTERACEAE	<i>Inula conyzae</i> (Griesselich) Meikle	Inule conyze	I	AC	LC						
ASTERACEAE	<i>Inula helenium</i> L.	Inule aunée [Aunée]	NS(C)	E	H	p	E?				
ASTERACEAE	<i>Inula salicina</i> L.	Inule à feuilles de saule	I	D	EX			(oui)			(R)
ASTERACEAE	<i>Lactuca perennis</i> L.	Laitue vivace	I	R	NT			oui			
ASTERACEAE	<i>Lactuca saligna</i> L.	Laitue à feuilles de saule	I	E?	DD			oui			
ASTERACEAE	<i>Lactuca sativa</i> L.	Laitue cultivée [Laitue]	C		H	a	CC				
ASTERACEAE	<i>Lactuca serriola</i> L.	Laitue scariole	I(C)	C	LC	a	?				
ASTERACEAE	<i>Lactuca serriola</i> L. f. <i>integrifolia</i> Bogenhard	Laitue scariole (f.)	I	C	LC						
ASTERACEAE	<i>Lactuca serriola</i> L. f. <i>serriola</i>	Laitue scariole (f.)	I	?	DD						
ASTERACEAE	<i>Lactuca virosa</i> L.	Laitue vireuse	I	AR?	DD						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
ASTERACEAE	<i>Lapsana communis</i> L.	Lampsane commune (s.l.)	I	CC	LC						
ASTERACEAE	<i>Lapsana communis</i> L. subsp. <i>communis</i>	Lampsane commune	I	CC	LC						
ASTERACEAE	<i>Leontodon autumnalis</i> L.	Liondent d'automne	I	AC	LC						
ASTERACEAE	<i>Leontodon hispidus</i> L.	Liondent hispide (s.l.)	I	AC	LC						
ASTERACEAE	<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hispidus</i>	Liondent hispide	I	AC	LC						
ASTERACEAE	<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hispidus</i> var. <i>decipiens</i> Lawalrée	Liondent hispide (var.)	??	??	??						
ASTERACEAE	<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hispidus</i> var. <i>glabratus</i> (Koch) Bischoff	Liondent hispide (var.)	I	?	DD						
ASTERACEAE	<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hispidus</i> var. <i>hispidus</i>	Liondent hispide (var.)	I	AC	LC						
ASTERACEAE	<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hyoseroides</i> (Welw. ex Reichenb.) J. Murr	Liondent des éboulis	I	R	VU			oui			R
ASTERACEAE	<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hyoseroides</i> (Welw. ex Reichenb.) J. Murr var. <i>hyoseroides</i> (Welw. ex Reichenb.) Bischoff	Liondent des éboulis (var.)	I	R	VU			oui			R
ASTERACEAE	<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hyoseroides</i> (Welw. ex Reichenb.) J. Murr var. <i>pseudocrispus</i> Schultz-Bip. ex Bischoff	Liondent des éboulis (var.)	I	R	VU			oui			R
ASTERACEAE	<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.	Liondent à tige nue [Thrinicie hérissée]	I	PC	LC						
ASTERACEAE	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Leucanthème commune (s.l.) [Grande marguerite]	I	CC	LC						
ASTERACEAE	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam. subsp. <i>ircutianum</i> (DC.) Tzvelev	Leucanthème commune [Grande marguerite (tétraploïde)]	I	CC	LC						
ASTERACEAE	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam. subsp. <i>vulgare</i>	Leucanthème commune [Grande marguerite (diploïde)]	??	??	??						
ASTERACEAE	<i>Matricaria discoidea</i> DC.	Matricaire discoïde	Z	CC	ZLC						
ASTERACEAE	<i>Matricaria maritima</i> L.	Matricaire maritime (s.l.)	I	CC	LC						
ASTERACEAE	<i>Matricaria maritima</i> L. subsp. <i>inodora</i> (K. Koch) Soó	Matricaire inodore	I	CC	LC						
ASTERACEAE	<i>Matricaria maritima</i> L. subsp. <i>maritima</i>	Matricaire maritime	I	E?	DD			oui			
ASTERACEAE	<i>Matricaria maritima</i> L. subsp. <i>inodora</i> (K. Koch) Soó × <i>M. maritima</i> L. subsp. <i>maritima</i>	Matricaire hybride	??	??	??						
ASTERACEAE	<i>Matricaria recutita</i> L.	Matricaire camomille	I	C	LC						
ASTERACEAE	<i>Mycelis muralis</i> (L.) Dum.	Mycèle des murs [Laitue des murailles]	I	AC	LC						
ASTERACEAE	<i>Onopordum acanthium</i> L.	Onoporde acanthe	I	RR?	DD			oui			
ASTERACEAE	<i>Petasites hybridus</i> (L.) P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.	Pétasite officinal	I(N)	RR	LC			oui			
ASTERACEAE	<i>Petasites pyrenaicus</i> (L.) G. López	Pétasite odorant	C(NS)	AR?	H	j	?				
ASTERACEAE	<i>Picris echioides</i> L.	Picride fausse-vipérine	I	PC	LC						
ASTERACEAE	<i>Picris hieracioides</i> L.	Picride fausse-épervière	I	C	LC						
ASTERACEAE	<i>Podospermum laciniatum</i> (L.) DC.	Podosperme lacinié	I	D	EX			(oui)			(R)
ASTERACEAE	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	Pulicaire dysentérique	I	AC	LC						
ASTERACEAE	<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.	Pulicaire annuelle	I	D?	EX?			(oui)		N1	(R)

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
ASTERACEAE	<i>Scolymus hispanicus</i> L.	Scolyme d'Espagne	A	E	H						
ASTERACEAE	<i>Scorzonera austriaca</i> Willd.	Scorsonère d'Autriche	I	E	CR			oui			R
ASTERACEAE	<i>Scorzonera hispanica</i> L.	Scorsonère d'Espagne [Salsifis noir]	C(S)	?	H	a	R?				
ASTERACEAE	<i>Scorzonera humilis</i> L.	Scorsonère humble	I	R	CR			oui			R
ASTERACEAE	<i>Senecio adonidifolius</i> Loisel.	Séneçon à feuilles d'adonide	E?(I?)	(D)	(NE)						
ASTERACEAE	<i>Senecio aquaticus</i> Hill	Séneçon aquatique (s.l.)	I	RR	VU			oui			R
ASTERACEAE	<i>Senecio aquaticus</i> Hill subsp. <i>aquaticus</i>	Séneçon aquatique	I	?	DD			oui			R
ASTERACEAE	<i>Senecio aquaticus</i> Hill subsp. <i>erraticus</i> (Bertol.) Tourlet	Séneçon erratique	I	?	DD			oui			R
ASTERACEAE	<i>Senecio cineraria</i> DC.	Séneçon cinéraire [Cinénaire]	C(NS)	RR?	H	j	AC?				
ASTERACEAE	<i>Senecio erucifolius</i> L.	Séneçon à feuilles de roquette	I	AC	LC						
ASTERACEAE	<i>Senecio inaequidens</i> DC.	Séneçon du Cap	Z	PC	ZLC				A		
ASTERACEAE	<i>Senecio jacobaea</i> L.	Séneçon jacobée [Jacobée]	I	CC	LC						
ASTERACEAE	<i>Senecio jacobaea</i> L. var. <i>jacobaea</i>	Séneçon jacobée (var.) [Jacobée]	I	CC	LC						
ASTERACEAE	<i>Senecio ovatus</i> (P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.) Willd.	Séneçon de Fuchs (s.l.)	I?	E	NE						
ASTERACEAE	<i>Senecio ovatus</i> (P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.) Willd. subsp. <i>alpestris</i> (Gaudin) Herborg	Séneçon alpestre	??	??	??						
ASTERACEAE	<i>Senecio ovatus</i> (P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.) Willd. subsp. <i>ovatus</i>	Séneçon de Fuchs	??	??	??						
ASTERACEAE	<i>Senecio paludosus</i> L.	Séneçon des marais	I	RR	CR			oui		R1	R
ASTERACEAE	<i>Senecio squalidus</i> L.	Séneçon luisant	E								
ASTERACEAE	<i>Senecio sylvaticus</i> L.	Séneçon des forêts	I	PC	LC						
ASTERACEAE	<i>Senecio viscosus</i> L.	Séneçon visqueux	I	AR	LC						
ASTERACEAE	<i>Senecio vulgaris</i> L.	Séneçon commun	I	CC	LC						
ASTERACEAE	<i>Senecio vulgaris</i> L. f. <i>litoralis</i> Morthier	Séneçon commun (f.)	??	??	??						
ASTERACEAE	<i>Senecio vulgaris</i> L. f. <i>radiatus</i> Hegi	Séneçon commun (f.)	??	??	??						
ASTERACEAE	<i>Senecio vulgaris</i> L. f. <i>vulgaris</i>	Séneçon commun (f.)	I	CC	LC						
ASTERACEAE	<i>Serratula tinctoria</i> L.	Serratule des teinturiers	I	RR	EN			oui			R
ASTERACEAE	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Silybe de Marie [Chardon-marie]	Z(A)	RR	ZVU			oui			R
ASTERACEAE	<i>Solidago canadensis</i> L.	Solidage du Canada [Gerbe d'or]	N(SC)	RR?	H	j	?		A		
ASTERACEAE	<i>Solidago gigantea</i> Ait.	Solidage glabre	Z(SC)	AR?	ZDD	j	?		A		
ASTERACEAE	<i>Solidago virgaurea</i> L.	Solidage verge-d'or [Verge d'or]	I	C	LC						
ASTERACEAE	<i>Sonchus arvensis</i> L.	Laiteron des champs	I	C	LC						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
ASTERACEAE	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Laiteron rude	I	CC	LC						
ASTERACEAE	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Laiteron maraîcher	I	CC	LC						
ASTERACEAE	<i>Sonchus palustris</i> L.	Laiteron des marais	I	D	EX			(oui)			(R)
ASTERACEAE	<i>Tagetes minuta</i> L.	Tagète des décombres	A	D	H						
ASTERACEAE	<i>Tanacetum balsamita</i> L.	Balsamite	C(N?)	D	H	j	?				
ASTERACEAE	<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Schultz-Bip.	Tanaisie matricaire	S(NC)	?	H	j	?				
ASTERACEAE	<i>Tanacetum vulgare</i> L.	Tanaisie commune [Herbe aux vers]	I(C)	C	LC	j	?				
ASTERACEAE	<i>Tanacetum vulgare</i> L. f. <i>vulgare</i>	Tanaisie commune (f.) [Herbe aux vers]	I(C)	C	LC	j	?				
ASTERACEAE	<i>Taraxacum adamii</i> auct. non Claire	Pissenlit d'Adam	??	??	??						
ASTERACEAE	<i>Taraxacum alienum</i> Dahlst.	Pissenlit étranger	??	??	??						
ASTERACEAE	<i>Taraxacum anglicum</i> Dahlst.	Pissenlit d'Angleterre	I	D	EX			(oui)			(R)
ASTERACEAE	<i>Taraxacum angustisquameum</i> Dahlst. ex Lindb. f.	Pissenlit à bractées étroites	??	??	??						
ASTERACEAE	<i>Taraxacum atactum</i> Sahlin et v. Soest	Pissenlit introuvable	??	??	??						
ASTERACEAE	<i>Taraxacum ciliare</i> v. Soest	Pissenlit cilié	??	??	??						
ASTERACEAE	<i>Taraxacum disseminatum</i> Hagl.	Pissenlit disséminé	??	??	??						
ASTERACEAE	<i>Taraxacum dunense</i> v. Soest	Pissenlit des dunes	??	??	??						
ASTERACEAE	<i>Taraxacum duvigneaudii</i> v. Soest	Pissenlit de Duvigneaud	??	??	??						
ASTERACEAE	<i>Taraxacum hamatifforme</i> Dahlst.	Pissenlit faux-crochu	??	??	??						
ASTERACEAE	<i>Taraxacum hamiferum</i> Dahlst.	Pissenlit à hameçons	??	??	??						
ASTERACEAE	<i>Taraxacum hollandicum</i> v. Soest	Pissenlit de Hollande	??	??	??						
ASTERACEAE	<i>Taraxacum hygrophilum</i> v. Soest	Pissenlit hygrophile	??	??	??						
ASTERACEAE	<i>Taraxacum lacistophylloides</i> Dahlst.		??	??	??						
ASTERACEAE	<i>Taraxacum lamprophyllum</i> M.P. Christ.	Pissenlit à feuilles luisantes	??	??	??						
ASTERACEAE	<i>Taraxacum nordstedtii</i> Dahlst.	Pissenlit de Nordstedt	??	??	??						
ASTERACEAE	<i>Taraxacum oxoniense</i> Dahlst.	Pissenlit d'Oxford	??	??	??						
ASTERACEAE	<i>Taraxacum palustre</i> (Lyons) Symons	Pissenlit des marais	??	??	??						
ASTERACEAE	<i>Taraxacum proximum</i> (Dahlst.) Raunk.	Pissenlit à akènes puce	??	??	??						
ASTERACEAE	<i>Taraxacum rubicundum</i> (Dahlst.) Dahlst.	Pissenlit à akènes violet sombre	??	??	??						
ASTERACEAE	<i>Taraxacum scanicum</i> Dahlst.	Pissenlit de Scanie	??	??	??						
ASTERACEAE	<i>Taraxacum taeniatum</i> Hagl. ex Holmgr.	Pissenlit à bandelettes	??	??	??						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
ASTERACEAE	<i>Tephrosieris helenitis</i> (L.) Nordenstam	[Séneçon à feuilles spatulées (s.l.)]	I	RR	VU			oui		R1p	F1(Vp);R
ASTERACEAE	<i>Tephrosieris helenitis</i> (L.) Nordenstam subsp. <i>candida</i> (Corb.) Nordenstam	[Séneçon blanc pur]	I	RR	VU			oui		R1	F1(V);R
ASTERACEAE	<i>Tephrosieris helenitis</i> (L.) Nordenstam subsp. <i>helenitis</i>	[Séneçon à feuilles spatulées]	I	E	CR			oui			R
ASTERACEAE	<i>Tephrosieris palustris</i> (L.) Fourr.	[Séneçon ramassé ; Cinéraire des marais]	E							[N1]	[E(V)]
ASTERACEAE	<i>Tragopogon dubius</i> Scop.	Salsifi douteux (s.l.)	I	RR?	DD			oui			
ASTERACEAE	<i>Tragopogon dubius</i> Scop. subsp. <i>dubius</i>	Salsifi douteux	??	??	??						
ASTERACEAE	<i>Tragopogon dubius</i> Scop. subsp. <i>major</i> (Jacq.) Vollm.	Salsifis à gros pédoncules	I	RR?	DD			oui			
ASTERACEAE	<i>Tragopogon porrifolius</i> L.	Salsifis à feuilles de poireau [Salsifis blanc]	C(N)	D	H	a	AR				
ASTERACEAE	<i>Tragopogon pratensis</i> L.	Salsifis des prés (s.l.)	I	C	LC						
ASTERACEAE	<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>minor</i> (Mill.) Wahlenb.	Salsifis mineur	I	?	DD						
ASTERACEAE	<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>orientalis</i> (L.) Celak.	Salsifis d'orient	I	?	DD						
ASTERACEAE	<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Salsifis des prés	I	?	DD						
ASTERACEAE	<i>Tussilago farfara</i> L.	Tussilage pas-d'âne [Tussilage]	I	C	LC						
ASTERACEAE	<i>Xanthium orientale</i> L.	Lampourde à gros fruits	E?(A)	(D)	(H)						
ASTERACEAE	<i>Xanthium spinosum</i> L.	Lampourde épineuse	A	D?	H						
ASTERACEAE	<i>Xanthium strumarium</i> L.	Lampourde glouteron	A	D?	H						
BALSAMINACEAE	<i>Impatiens balfourii</i> Hook. f.	Balsamine de Balfour	C(N)	E	H	j	?		P		
BALSAMINACEAE	<i>Impatiens capensis</i> Meerb.	Balsamine du Cap	Z	R	ZLC				A		
BALSAMINACEAE	<i>Impatiens glandulifera</i> Royle	Balsamine géante	C(NS)	E?	H	j	?		P		
BALSAMINACEAE	<i>Impatiens noli-tangere</i> L.	Balsamine n'y-touchez-pas [Balsamine sauvage]	I	E	CR			oui		R1	R
BALSAMINACEAE	<i>Impatiens parviflora</i> DC.	Balsamine à petites fleurs	N	E	H				P		
BERBERIDACEAE	<i>Berberis vulgaris</i> L.	Vinettier commun [Épine-vinette]	I	RR	CR			oui			R
BERBERIDACEAE	<i>Epimedium alpinum</i> L.	Épimède	C(N)	D	H	j	?				
BERBERIDACEAE	<i>Mahonia aquifolium</i> (Pursh) Nutt.	Mahonie à feuilles de houx	C(NS)	PC?	H	j(p)	C		P		
BETULACEAE	<i>Alnus cordata</i> (Loisel.) Duby	Aulne cordé	C		H	p	?				
BETULACEAE	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Aulne glutineux	I(NSC)	C	LC	sp	?				
BETULACEAE	<i>Alnus incana</i> (L.) Moench	Aulne blanc	C(SN)	?	H	sp	?				
BETULACEAE	<i>Alnus xpubescens</i> Tausch [<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. × <i>Alnus incana</i> (L.) Moench]	Aulne pubescent	I	E?	H						
BETULACEAE	<i>Betula pendula</i> Roth	Bouleau verruqueux	I(NC)	CC	LC	pj	C				
BETULACEAE	<i>Betula pubescens</i> Ehrh.	Bouleau pubescent (s.l.)	I	C	LC						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
BETULACEAE	<i>Betula pubescens</i> Ehrh. subsp. <i>pubescens</i>	Bouleau pubescent	I	C	LC						
BETULACEAE	<i>Betula xaurata</i> Borkh. [<i>Betula pubescens</i> Ehrh. × <i>Betula pendula</i> Roth]	Bouleau à feuilles en losange	I	?	H						
BETULACEAE	<i>Carpinus betulus</i> L.	Charme commun	I(NSC)	CC	LC	spj	PC				
BETULACEAE	<i>Corylus avellana</i> L.	Noisetier commun [Noisetier ; Coudrier]	I(S?C)	CC	LC	pj	C				
BETULACEAE	<i>Corylus avellana</i> L. var. <i>avellana</i>	Noisetier commun (var.) [Noisetier ; Coudrier]	I(S?C)	CC	LC	pj	C				
BETULACEAE	<i>Corylus maxima</i> Mill.	Noisetier géant	C		H	a	PC				
BORAGINACEAE	<i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater	Amsinckie velue	E?(A)	(D)	(H)						
BORAGINACEAE	<i>Anchusa arvensis</i> (L.) Bieb.	Buglosse des champs [Lycopside]	I	R?	DD						
BORAGINACEAE	<i>Anchusa azurea</i> Mill.	Buglosse d'Italie	C(SA)	?	H	j	?				
BORAGINACEAE	<i>Anchusa ochroleuca</i> Bieb.	Buglosse jaunâtre	E								
BORAGINACEAE	<i>Anchusa officinalis</i> L.	Buglosse officinale (s.l.)	A	D	H						
BORAGINACEAE	<i>Anchusa officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>	Buglosse officinale	A	D	H						
BORAGINACEAE	<i>Asperugo procumbens</i> L.	Râpette couchée	A	D	H						
BORAGINACEAE	<i>Borago officinalis</i> L.	Bourrache officinale [Bourrache]	C(N?S)	E?	H	d	R?				
BORAGINACEAE	<i>Cerinth minor</i> L.	Mélinet mineur	A	D	H						
BORAGINACEAE	<i>Cynoglossum germanicum</i> Jacq.	Cynoglosse d'Allemagne (s.l.)	I	E	EN			oui			R
BORAGINACEAE	<i>Cynoglossum germanicum</i> Jacq. subsp. <i>pellucidum</i> (Lapeyr.) Sutory	Cynoglosse diaphane	I	E	EN			oui			R
BORAGINACEAE	<i>Cynoglossum officinale</i> L.	Cynoglosse officinale	I	RR	CR			oui			R
BORAGINACEAE	<i>Echium italicum</i> L.	Vipérine d'Italie	A	D	H						
BORAGINACEAE	<i>Echium vulgare</i> L.	Vipérine commune [Vipérine]	I	AC	LC						
BORAGINACEAE	<i>Echium vulgare</i> L. var. <i>parviflorum</i> Gaudin	Vipérine commune (var.) [Vipérine]	??	??	??						
BORAGINACEAE	<i>Echium vulgare</i> L. var. <i>vulgare</i>	Vipérine commune (var.) [Vipérine]	I	AC	LC						
BORAGINACEAE	<i>Heliotropium europaeum</i> L.	Héliotrope d'Europe	Z	E	ZCR			oui			R
BORAGINACEAE	<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dum.	Bardanette raboteuse [Bardanette]	A?	D	H						
BORAGINACEAE	<i>Lithospermum arvense</i> L.	Grémil des champs	I	R	NT			oui			
BORAGINACEAE	<i>Lithospermum officinale</i> L.	Grémil officinal [Herbe aux perles]	I	AR	NT			oui			
BORAGINACEAE	<i>Lithospermum purpureoaeeruleum</i> L.	Grémil bleu pourpre	I	E	EN			oui			R
BORAGINACEAE	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill	Myosotis des champs (s.l.)	I	CC	LC						
BORAGINACEAE	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill subsp. <i>arvensis</i>	Myosotis des champs	I	CC?	DD						
BORAGINACEAE	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill subsp. <i>umbrata</i> (Rouy) O. Schwarz	Myosotis des ombrages	I	?	DD						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
BORAGINACEAE	<i>Myosotis discolor</i> Pers.	Myosotis versicolore (s.l.)	I	AR	NT			oui			
BORAGINACEAE	<i>Myosotis discolor</i> Pers. subsp. <i>discolor</i>	Myosotis versicolore	I	?	DD			oui			
BORAGINACEAE	<i>Myosotis discolor</i> Pers. subsp. <i>dubia</i> (Arrondeau) Blaise	Myosotis douteux	I	?	DD			oui			
BORAGINACEAE	<i>Myosotis laxa</i> Lehm.	Myosotis lâche (s.l.)	I	AR?	DD						
BORAGINACEAE	<i>Myosotis laxa</i> Lehm. subsp. <i>cespitosa</i> (C.F. Schultz) Hyl. ex Nordh.	Myosotis cespiteux	I	AR?	DD						
BORAGINACEAE	<i>Myosotis nemorosa</i> Besser	Myosotis à poils réfractés	I	E?	DD			oui			
BORAGINACEAE	<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel ex Schult.	Myosotis rameux	I	PC	LC						
BORAGINACEAE	<i>Myosotis scorpioides</i> L.	Myosotis des marais	I	AC	LC						
BORAGINACEAE	<i>Myosotis secunda</i> A. Murray	Myosotis rampant	??	??	??						
BORAGINACEAE	<i>Myosotis stricta</i> Link ex Roem. et Schult.	Myosotis raide	I	RR?	DD			oui			
BORAGINACEAE	<i>Myosotis sylvatica</i> Ehrh. ex Hoffmann	Myosotis des forêts	C(N?S)	AR	H	j	AC?				
BORAGINACEAE	<i>Neatostema apulum</i> (L.) I.M. Johnston	Néatostema d'Apulie	A	D	H						
BORAGINACEAE	<i>Nonea pulla</i> DC.	Nonnée sombre	A	D	H					[N1]	
BORAGINACEAE	<i>Pentaglottis sempervirens</i> (L.) Tausch ex L.H. Bailey	Pentaglotte toujours verte	N?S(C)	E?	H	j	?				
BORAGINACEAE	<i>Pulmonaria angustifolia</i> L.	Pulmonaire à feuilles étroites	E								
BORAGINACEAE	<i>Pulmonaria longifolia</i> (Bast.) Boreau	Pulmonaire à longues feuilles	I	AR	LC						
BORAGINACEAE	<i>Pulmonaria officinalis</i> L.	Pulmonaire officinale	C(NS)	?	H	j	?				
BORAGINACEAE	<i>Pulmonaria saccharata</i> Mill.	Pulmonaire d'Italie	S	D	H						
BORAGINACEAE	<i>Symphytum asperum</i> Lepechin	Consoude rude	C(NA)	RR	H	j	D?				
BORAGINACEAE	<i>Symphytum officinale</i> L.	Consoude officinale (s.l.)	I	CC	LC						
BORAGINACEAE	<i>Symphytum officinale</i> L. subsp. <i>officinale</i>	Consoude officinale [Grande consoude]	I	CC	LC						
BORAGINACEAE	<i>Symphytum tuberosum</i> L.	Consoude tubéreuse	N	E	H						
BORAGINACEAE	<i>Symphytum ×caeruleum</i> Petitmengin [<i>Symphytum ×uplandicum</i> Nyman × <i>Symphytum officinale</i> L.]	Consoude bleue	??	??	??						
BORAGINACEAE	<i>Symphytum ×uplandicum</i> Nyman [<i>Symphytum asperum</i> Lepechin × <i>Symphytum officinale</i> L.]	Consoude du Upland	N	?	H						
BRASSICACEAE	<i>Alliaria petiolata</i> (Bieb.) Cavara et Grande	Alliaire officinale [Alliaire]	I	CC	LC						
BRASSICACEAE	<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L.	Alysson calicinal	I	E	CR			oui			R
BRASSICACEAE	<i>Alyssum saxatile</i> L.	Alysson des rochers [Corbeille d'or]	C(N?S)	?	H	j	C				
BRASSICACEAE	<i>Alyssum simplex</i> Rudolphi	Allysson simple	E?(A?)	(D)	(H)						
BRASSICACEAE	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	Arabidopside de Thalius	I	C	LC						
BRASSICACEAE	<i>Arabis glabra</i> (L.) Bernh.	Arabette glabre	I	RR	EN			oui			R

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
BRASSICACEAE	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	Arabette hérissée (s.l.)	I	PC	LC						
BRASSICACEAE	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop. subsp. <i>gerardii</i> Hartm. f.	Arabette de Gérard	I	?	DD						
BRASSICACEAE	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop. subsp. <i>hirsuta</i>	Arabette hérissée	I	?	DD						
BRASSICACEAE	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop. subsp. <i>sagittata</i> (Bertol.) Nyman	Arabette sagittée	I	?	DD						
BRASSICACEAE	<i>Armoracia rusticana</i> P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.	Armoracie rustique [Raifort]	NS(C)	RR	H	a	RR				
BRASSICACEAE	<i>Aubrieta deltoidea</i> (L.) DC.	Aubrietie deltoïde	C(S)	?	H	j	C				
BRASSICACEAE	<i>Barbarea intermedia</i> Boreau	Barbarée intermédiaire	I	RR	VU			oui			R
BRASSICACEAE	<i>Barbarea stricta</i> Andr.	Barbarée raide	I?	E	NE						
BRASSICACEAE	<i>Barbarea verna</i> (Mill.) Aschers.	Barbarée printanière	C(S?)	E?	H	a	?				
BRASSICACEAE	<i>Barbarea vulgaris</i> R. Brown	Barbarée commune (s.l.)	I	AC	LC						
BRASSICACEAE	<i>Barbarea vulgaris</i> R. Brown subsp. <i>arcuata</i> (Opiz ex J. et C. Presl) Hayek	Barbarée arquée	??	??	??						
BRASSICACEAE	<i>Barbarea vulgaris</i> R. Brown subsp. <i>rivularis</i> (Martrin-Donos) Sudre	Barbarée des ruisseaux	??	??	??						
BRASSICACEAE	<i>Barbarea vulgaris</i> R. Brown subsp. <i>vulgaris</i>	Barbarée commune	I	AC	LC						
BRASSICACEAE	<i>Berteroa incana</i> (L.) DC.	Bertéroa blanche	Z	R?	ZDD				A		
BRASSICACEAE	<i>Biscutella laevigata</i> L.	Lunetière lisse (s.l.)	E								
BRASSICACEAE	<i>Biscutella neustriaca</i> Bonnet	Lunetière de Neustrie	I	RR	CR			oui		H2I;B;N1;R1	E(E);F1(V);R
BRASSICACEAE	<i>Brassica elongata</i> Ehrh.	Chou allongé (s.l.)	A	D	H						[F1(Ep)]
BRASSICACEAE	<i>Brassica elongata</i> Ehrh. subsp. <i>elongata</i>	Chou allongé	A	D	H						
BRASSICACEAE	<i>Brassica elongata</i> Ehrh. subsp. <i>integrifolia</i> (Boiss.) Breistr.	Chou à feuilles entières	A	D	H						[F1(E)]
BRASSICACEAE	<i>Brassica napus</i> L.	Chou navet (s.l.)	SAC(N?)	C	H	ia	CC				
BRASSICACEAE	<i>Brassica napus</i> L. subsp. <i>napobrassica</i> (L.) O. Schwarz	Chou rutabaga [Rutabaga]	C		H	a	AR?				
BRASSICACEAE	<i>Brassica napus</i> L. subsp. <i>napus</i>	Chou navet [Colza ; Navette]	SAC(N?)	C	H	ia	CC				
BRASSICACEAE	<i>Brassica nigra</i> (L.) Koch	Chou noir [Moutarde noire]	I	AR	LC						
BRASSICACEAE	<i>Brassica oleracea</i> L.	Chou sauvage (s.l., inclus var. cultivées)	IC	AR	LC	a	CC	oui			F1(V)
BRASSICACEAE	<i>Brassica oleracea</i> L. subsp. <i>botrytis</i> (L.) Duchesne	Chou sauvage [Chou-fleur (s.l. incl. brocoli)]	C		H	a	AC				
BRASSICACEAE	<i>Brassica oleracea</i> L. subsp. <i>botrytis</i> (L.) Duchesne var. <i>botrytis</i> L.	Chou cultivé (subsp.) [Chou-fleur]	C		H	a	AC				
BRASSICACEAE	<i>Brassica oleracea</i> L. subsp. <i>botrytis</i> (L.) Duchesne var. <i>italica</i> Plenck	Chou cultivé (subsp.) [Chou brocoli]	C		H	a	PC				
BRASSICACEAE	<i>Brassica oleracea</i> L. subsp. <i>capitata</i> (L.) Schübl. et Martens	Chou cultivé (subsp.)	C		H	a	CC				
BRASSICACEAE	<i>Brassica oleracea</i> L. subsp. <i>capitata</i> (L.) Schübl. et Martens var. <i>capitata</i> L.	Chou cultivé (var.) [Chou cabus]	C		H	a	CC				
BRASSICACEAE	<i>Brassica oleracea</i> L. subsp. <i>capitata</i> (L.) Schübl. et Martens var. <i>sabauda</i> L.	Chou cultivé (var.) [Chou de Milan ; Chou de Savoie]	C		H	a	C				

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
BRASSICACEAE	<i>Brassica oleracea</i> L. subsp. <i>caulorapa</i> (DC.) Metzger	Chou cultivé (subsp.)	C		H	a	R				
BRASSICACEAE	<i>Brassica oleracea</i> L. subsp. <i>caulorapa</i> (DC.) Metzger var. <i>gongylodes</i> L.	Chou cultivé (subsp.) [Chou rave ou Chou navet]	C		H	a	R				
BRASSICACEAE	<i>Brassica oleracea</i> L. subsp. <i>fruticosa</i> Metzger	Chou cultivé (subsp.)	C		H	a	PC				
BRASSICACEAE	<i>Brassica oleracea</i> L. subsp. <i>fruticosa</i> Metzger var. <i>gemmifera</i> DC.	Chou cultivé (var.) [Chou de Bruxelles]	C		H	a	PC				
BRASSICACEAE	<i>Brassica oleracea</i> L. subsp. <i>fruticosa</i> Metzger var. <i>viridis</i> L.	Chou cultivé (var.) [Chou cavalier, chou vert]	C		H	a	AR?				
BRASSICACEAE	<i>Brassica oleracea</i> L. subsp. <i>oleracea</i>	Chou sauvage	I	AR	LC			oui			F1(V*)
BRASSICACEAE	<i>Brassica rapa</i> L.	Chou à feuilles rudes (s.l.)	C		H	a	?				
BRASSICACEAE	<i>Brassica rapa</i> L. subsp. <i>campestris</i> (L.) A.R. Clapham	Chou champêtre [Navette d'été]	C(SA)	?	H	a	?				
BRASSICACEAE	<i>Brassica rapa</i> L. subsp. <i>rapa</i>	Chou à feuilles rudes [Navet potager]	C		H	a	?				
BRASSICACEAE	<i>Bunias erucago</i> L.	Buniade fausse-roquette [Masse au bedeau]	A	D	H						
BRASSICACEAE	<i>Bunias orientalis</i> L.	Buniade d'Orient	Z	E?	ZDD			oui			
BRASSICACEAE	<i>Cakile maritima</i> Scop.	Caquillier maritime	I	E	VU			oui			R
BRASSICACEAE	<i>Cakile maritima</i> Scop. subsp. <i>integrifolia</i> (Hornem.) Hyl. ex Greuter et Burdet	Caquillier occidental	I	E	VU			oui			R
BRASSICACEAE	<i>Calepina irregularis</i> (Asso) Thell.	Calépine faux-cranson	A	E	H						
BRASSICACEAE	<i>Camelina alyssum</i> (Mill.) Thell.	Caméline alysson	A	D	H						
BRASSICACEAE	<i>Camelina microcarpa</i> Andr. ex DC.	Caméline à petits fruits	??	??	??						
BRASSICACEAE	<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz	Caméline cultivée (s.l.)	SC	D	H	ia	D				
BRASSICACEAE	<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz subsp. <i>sativa</i>	Caméline cultivée	SC	D	H	ia	D				
BRASSICACEAE	<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz subsp. <i>zingeri</i> (Mirek) Smejkal	Caméline poilue	??	??	??						
BRASSICACEAE	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Med.	Capselle bourse-à-pasteur [Bourse-à-pasteur]	I	CC	LC						
BRASSICACEAE	<i>Capsella rubella</i> Reut.	Capselle rougeâtre	I	RR?	DD			oui			
BRASSICACEAE	<i>Capsella</i> × <i>gracilis</i> Gren. [<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Med. × <i>Capsella rubella</i> Reut.]	Capselle grêle	??	??	??						
BRASSICACEAE	<i>Cardamine amara</i> L.	Cardamine amère [Cresson amer]	I	AR	LC						
BRASSICACEAE	<i>Cardamine bulbifera</i> (L.) Crantz	Cardamine à bulbilles	I	RR	VU			oui		R1	R
BRASSICACEAE	<i>Cardamine flexuosa</i> With.	Cardamine flexueuse	I	PC?	DD						
BRASSICACEAE	<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Cardamine hérissée	I	CC	LC						
BRASSICACEAE	<i>Cardamine impatiens</i> L.	Cardamine impatiente	I	R	EN			oui			R
BRASSICACEAE	<i>Cardamine pratensis</i> L.	Cardamine des prés (s.l.)	I	CC	LC						
BRASSICACEAE	<i>Cardamine pratensis</i> L. subsp. <i>matthioli</i> (Moretti) Nyman	Cardamine de Matthiole	E?(I?)	(D)	(NE)						
BRASSICACEAE	<i>Cardamine pratensis</i> L. subsp. <i>paludosa</i> (Knaf.) Celak.	Cardamine dentée	??	??	??						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
BRASSICACEAE	<i>Cardamine pratensis</i> L. subsp. <i>picra</i> De Langhe et D'hose	Cardamine à saveur piquante	I	?	DD						
BRASSICACEAE	<i>Cardamine pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Cardamine des prés [Cresson des prés]	I	?	DD						
BRASSICACEAE	<i>Cardaminopsis arenosa</i> (L.) Hayek	Cardaminopside des sables (s.l.) [Arabette des sables]	I	R	NT			oui			
BRASSICACEAE	<i>Cardaminopsis arenosa</i> (L.) Hayek subsp. <i>arenosa</i>	Cardaminopside des sables [Arabette des sables]	E?(I?)	(R)	(NE)						
BRASSICACEAE	<i>Cardaminopsis arenosa</i> (L.) Hayek subsp. <i>borbasii</i> (Zapal.) Pawl. ex H. Scholz	Cardaminopside de Borbás	I	R	NT			oui			
BRASSICACEAE	<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv.	Cardaire drave	Z	PC	ZLC						
BRASSICACEAE	<i>Cochlearia anglica</i> L.	Cochléaire d'Angleterre	I	E	CR			oui			R
BRASSICACEAE	<i>Cochlearia danica</i> L.	Cochléaire du Danemark	I(A)	R{R,?}	LC			oui			
BRASSICACEAE	<i>Cochlearia officinalis</i> L.	Cochléaire officinale	E								
BRASSICACEAE	<i>Coincya monensis</i> (L.) Greuter et Burdet	Coincye de l'île de Man (s.l.)	I	E	EN			oui			R
BRASSICACEAE	<i>Coincya monensis</i> (L.) Greuter et Burdet subsp. <i>cheiranthos</i> (Vill.) Aedo, Leadlay et Muñoz Garmendia	Coincye giroflée [Moutarde giroflée]	I	E	EN			oui			R
BRASSICACEAE	<i>Conringia orientalis</i> (L.) Dum.	Conringie d'Orient	A	D	H						
BRASSICACEAE	<i>Coronopus didymus</i> (L.) Smith	Coronope didyme	N(A)	R?	H						
BRASSICACEAE	<i>Coronopus squamatus</i> (Forssk.) Aschers.	Coronope écailleux [Corne de cerf]	I	AC	LC						
BRASSICACEAE	<i>Crambe maritima</i> L.	Crambe maritime [Chou marin]	I(C)	RR	CR	pc	E	oui		N1	R
BRASSICACEAE	<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl	Descurainie sagesse [Sagesse des chirurgiens]	I	?	DD						
BRASSICACEAE	<i>Diplotaxis eruroides</i> (L.) DC.	Diplotaxe fausse-roquette	A	D	H						
BRASSICACEAE	<i>Diplotaxis muralis</i> (L.) DC.	Diplotaxe des murs	I	RR?	DD			oui			
BRASSICACEAE	<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC.	Diplotaxe à feuilles ténues	I	PC?	DD						
BRASSICACEAE	<i>Diplotaxis viminea</i> (L.) DC.	Diplotaxe des vignes	A	D	H						
BRASSICACEAE	<i>Diplotaxis xwirtgenii</i> Hausskn. [<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC. × <i>Diplotaxis muralis</i> (L.) DC.]	Diplotaxe de Wirtgen	??	??	??						
BRASSICACEAE	<i>Draba muralis</i> L.	Drave des murs	I	E	CR			oui			R
BRASSICACEAE	<i>Erophila verna</i> (L.) Chevall.	Érophile printanière (s.l.) [Drave printanière]	I	CC	LC						
BRASSICACEAE	<i>Erophila verna</i> (L.) Chevall. subsp. <i>praecox</i> (Steven) Walters	Érophile précoce [Drave printanière]	??	??	??						
BRASSICACEAE	<i>Erophila verna</i> (L.) Chevall. subsp. <i>spatulata</i> (A.F. Láng) Vollm.	Érophile spatulée [Drave printanière]	I	?	DD						
BRASSICACEAE	<i>Erophila verna</i> (L.) Chevall. subsp. <i>verna</i>	Érophile printanière [Drave printanière]	I	?	DD						
BRASSICACEAE	<i>Eruca vesicaria</i> (L.) Cav.	Roquette vésiculeuse (s.l.)	C(A)	D	H	a	?				
BRASSICACEAE	<i>Eruca vesicaria</i> (L.) Cav. subsp. <i>sativa</i> (Mill.) Thell.	Roquette cultivée	C(A)	D	H	a	?				
BRASSICACEAE	<i>Erucastrum gallicum</i> (Willd.) O.E. Schulz	Érucastre de Pollich	A?	E	H						
BRASSICACEAE	<i>Erucastrum nasturtiifolium</i> (Poiret) O.E. Schulz	Érucastre à feuilles de cresson [Roquette des champs]	A	D	H						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
BRASSICACEAE	<i>Erysimum cheiranthoides</i> L.	Vêlar fausse-giroflée	I	R?	DD						
BRASSICACEAE	<i>Erysimum cheiri</i> (L.) Crantz	Vêlar violier [Giroflée des murailles]	ZS(C)	PC	ZLC	j	?				
BRASSICACEAE	<i>Hesperis matronalis</i> L.	Julienne des dames	NS(C)	R?	H	j	AC				
BRASSICACEAE	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagrèze-Fossat	Hirschfeldie apprîmée [Roquette bâtarde]	Z	R?	ZDD						
BRASSICACEAE	<i>Hornungia petraea</i> (L.) Reichenb.	Hornungie des pierres	I	D	EX			(oui)			(R)
BRASSICACEAE	<i>Iberis amara</i> L.	Ibérîde amer	I	E	EN			oui			R
BRASSICACEAE	<i>Iberis intermedia</i> Guersent	Ibérîde intermédiaire (s.l.)	I	E	CR			oui			R
BRASSICACEAE	<i>Iberis intermedia</i> Guersent subsp. <i>intermedia</i>	Ibérîde intermédiaire	I	E	CR			oui		R1	R
BRASSICACEAE	<i>Iberis pinnata</i> L.	Ibérîde penné	A	D	H						
BRASSICACEAE	<i>Iberis umbellata</i> L.	Ibérîde en ombelle	C(S)	?	H	j	AC				
BRASSICACEAE	<i>Isatis tinctoria</i> L.	Pastel des teinturiers	Z	RR	ZVU			oui			R
BRASSICACEAE	<i>Lepidium campestre</i> (L.) R. Brown	Passerage champêtre	I	PC	LC						
BRASSICACEAE	<i>Lepidium densiflorum</i> Schrad.	Passerage à fleurs denses	N?A	D?	H						
BRASSICACEAE	<i>Lepidium graminifolium</i> L.	Passerage à feuilles de graminées	I	RR	NT			oui			
BRASSICACEAE	<i>Lepidium heterophyllum</i> Benth.	Passerage hétérophylle	I	E	CR			oui			R
BRASSICACEAE	<i>Lepidium latifolium</i> L.	Passerage à larges feuilles	I?(N)	RR	NE						
BRASSICACEAE	<i>Lepidium perfoliatum</i> L.	Passerage perfoliée	A	D	H						
BRASSICACEAE	<i>Lepidium ruderales</i> L.	Passerage rudérale	I	?	DD						
BRASSICACEAE	<i>Lepidium sativum</i> L.	Passerage cultivée [Cresson alénois]	C(S)	?	H	a	?				
BRASSICACEAE	<i>Lepidium sativum</i> L. var. <i>latifolium</i> DC.	Passerage cultivée (var.) [Cresson alénois]	??	??	??						
BRASSICACEAE	<i>Lepidium sativum</i> L. var. <i>sativum</i>	Passerage cultivée (var.) [Cresson alénois]	C(S)	?	H	a	?				
BRASSICACEAE	<i>Lepidium virginicum</i> L.	Passerage de Virginie	N?	E	H						
BRASSICACEAE	<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv.	Lobulaire maritime	C(S)	E	H	j	PC?				
BRASSICACEAE	<i>Lunaria annua</i> L.	Lunaire annuelle [Monnaie du pape]	C(N?S)	?	H	j	C				
BRASSICACEAE	<i>Lunaria rediviva</i> L.	Lunaire vivace	C(S)	E	H	j	R?				
BRASSICACEAE	<i>Malcolmia maritima</i> (L.) R. Brown	Malcolmie maritime [Giroflée de Mahon]	C(NS)	?	H	j	?				
BRASSICACEAE	<i>Matthiola incana</i> (L.) R. Brown	Matthiole blanchâtre	C(S)	E	H	j	?				
BRASSICACEAE	<i>Nasturtium microphyllum</i> (Boenningh.) Reichenb.	Cresson à petites feuilles	I	E?	DD			oui			
BRASSICACEAE	<i>Nasturtium officinale</i> R. Brown	Cresson officinal [Cresson de fontaine]	I(C)	AC	LC	a	?				
BRASSICACEAE	<i>Nasturtium</i> ×sterile (Airy-Shaw) Oefelein [<i>Nasturtium officinale</i> R. Brown × <i>Nasturtium microphyllum</i> (Boenningh.) Reichenb.]	Cresson stérile	??	??	??						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
BRASSICACEAE	<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	Neslie paniculée (s.l.)	I	E	CR			oui			R
BRASSICACEAE	<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv. subsp. <i>paniculata</i>	Neslie paniculée	??	??	??			[oui]			[R]
BRASSICACEAE	<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv. subsp. <i>thracica</i> (Velen.) Bomm.	Neslie de Thrace	??	??	??			[oui]			[R]
BRASSICACEAE	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Radis ravenelle (s.l.)	I	AC	LC						
BRASSICACEAE	<i>Raphanus raphanistrum</i> L. subsp. <i>raphanistrum</i>	Radis ravenelle [Ravenelle]	I	AC	LC						
BRASSICACEAE	<i>Raphanus raphanistrum</i> L. subsp. <i>raphanistrum</i> var. <i>luteus</i> L.	Radis ravenelle (var.) [Ravenelle]	I	?	DD						
BRASSICACEAE	<i>Raphanus raphanistrum</i> L. subsp. <i>raphanistrum</i> var. <i>ochroleucus</i> (Stokes) Peterm.	Radis ravenelle (var.) [Ravenelle]	I	?	DD						
BRASSICACEAE	<i>Raphanus raphanistrum</i> L. subsp. <i>raphanistrum</i> var. <i>purpurascens</i> Dum.	Radis ravenelle (var.) [Ravenelle]	??	??	??						
BRASSICACEAE	<i>Raphanus raphanistrum</i> L. subsp. <i>raphanistrum</i> var. <i>raphanistrum</i>	Radis ravenelle (var.) [Ravenelle]	I	?	DD						
BRASSICACEAE	<i>Raphanus sativus</i> L.	Radis cultivé	C(S)	?	H	a	CC				
BRASSICACEAE	<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>niger</i> (Mill.) J. Kern.	Radis cultivé (var.) [Radis d'hiver]	C		H	a	R?				
BRASSICACEAE	<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.	Radis cultivé (var.) [Radis oléifère, radis fourrager]	C		H	a	AC?				
BRASSICACEAE	<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>sativus</i>	Radis cultivé (var.) [Radis d'été, petit radis]	C		H	a	CC				
BRASSICACEAE	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	Rapistre rugueuse (s.l.) [Rapistre]	A	E	H						
BRASSICACEAE	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All. subsp. <i>linnaeanum</i> (Coss.) Rouy et Fouc.	Rapistre de Linné [Rapistre]	A	D	H						
BRASSICACEAE	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All. subsp. <i>orientale</i> (L.) Arcang.	Rapistre du Levant [Rapistre]	A	E	H						
BRASSICACEAE	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All. subsp. <i>rugosum</i>	Rapistre rugueuse [Rapistre]	??	??	??						
BRASSICACEAE	<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser	Rorippe amphibie	I	AR	LC						
BRASSICACEAE	<i>Rorippa islandica</i> (Oeder ex Gunnerus) Borbás	Rorippe d'Islande	E								
BRASSICACEAE	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser	Rorippe des marais	I	R?	DD						
BRASSICACEAE	<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser	Rorippe sauvage	I	R?	DD						
BRASSICACEAE	<i>Rorippa ×anceps</i> (Wahlenb.) Reichenb. [<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser × <i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser]	Rorippe douteuse	I	?	H						
BRASSICACEAE	<i>Sinapis alba</i> L.	Moutarde blanche	Z(C)	AR?	ZDD	f	?				
BRASSICACEAE	<i>Sinapis alba</i> L. var. <i>alba</i>	Moutarde blanche (var.)	??	??	??						
BRASSICACEAE	<i>Sinapis alba</i> L. var. <i>melanosperma</i> Alef.	Moutarde blanche (var.)	??	??	??						
BRASSICACEAE	<i>Sinapis arvensis</i> L.	Moutarde des champs	I	CC	LC						
BRASSICACEAE	<i>Sinapis arvensis</i> L. var. <i>arvensis</i>	Moutarde des champs (var.)	I	?	DD						
BRASSICACEAE	<i>Sinapis arvensis</i> L. var. <i>orientalis</i> (L.) Koch et Ziz	Moutarde des champs (var.)	I	?	DD						
BRASSICACEAE	<i>Sisymbrium altissimum</i> L.	Sisymbre élevé	A	?	H						
BRASSICACEAE	<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq.	Sisymbre d'Autriche (s.l.)	??	??	??						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
BRASSICACEAE	<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq. subsp. <i>chrysanthum</i> (Jord.) Rouy et Fouc.	Sisymbre des Pyrénées	??	??	??						
BRASSICACEAE	<i>Sisymbrium irio</i> L.	Sisymbre irio [Vélaret]	I?(A?)	D?	NE						
BRASSICACEAE	<i>Sisymbrium loeselii</i> L.	Sisymbre de Loesel	A	D	H						
BRASSICACEAE	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Sisymbre officinal [Herbe aux chantes]	I	CC	LC						
BRASSICACEAE	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop. var. <i>leiocarpum</i> DC.	Sisymbre officinal (var.) [Herbe aux chantes]	??	??	??						
BRASSICACEAE	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop. var. <i>officinale</i>	Sisymbre officinal (var.) [Herbe aux chantes]	I	CC	LC						
BRASSICACEAE	<i>Sisymbrium orientale</i> L.	Sisymbre d'Orient	A	?	H						
BRASSICACEAE	<i>Sisymbrium supinum</i> L.	Sisymbre couché	I	D	EX			(oui)		H2;B;N1	E(E);F1(V);(R)
BRASSICACEAE	<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R. Brown	Téedalie à tige nue	I	RR	CR			oui			R
BRASSICACEAE	<i>Thlaspi arvense</i> L.	Tabouret des champs	I	AR	LC						
BRASSICACEAE	<i>Thlaspi montanum</i> L.	Tabouret des montagnes	I	E	CR			oui		R1	R
BRASSICACEAE	<i>Thlaspi perfoliatum</i> L.	Tabouret perfolié	I	R	EN			oui			R
BUDDLEJACEAE	<i>Buddleja davidii</i> Franch.	Buddléie de David [Arbre aux papillons]	Z(SC)	PC	ZLC	pj	AC?		A		
BUTOMACEAE	<i>Butomus umbellatus</i> L.	Butome en ombelle	I(N?C)	R	VU	p	?	oui			R
BUXACEAE	<i>Buxus sempervirens</i> L.	Buis toujours vert [Buis]	I?C(N)	PC	NE	j(p)	CC			C0	
CALLITRICHACEAE	<i>Callitriche brutia</i> Petagna	Callitriche pédonculé	E?(I)	(D?)	(EX?)						
CALLITRICHACEAE	<i>Callitriche hamulata</i> Kütz. ex Koch	Callitriche à crochets	I	RR?	DD			oui			
CALLITRICHACEAE	<i>Callitriche hermaphrodita</i> L.	Callitriche hermaphrodite	E								
CALLITRICHACEAE	<i>Callitriche obtusangula</i> Le Gall	Callitriche à angles obtus	I	PC?	DD						
CALLITRICHACEAE	<i>Callitriche palustris</i> L.	Callitriche des marais	E?(I)	(D)	(EX)						
CALLITRICHACEAE	<i>Callitriche platycarpa</i> Kütz.	Callitriche à fruits plats	I	AC?	DD						
CALLITRICHACEAE	<i>Callitriche stagnalis</i> Scop.	Callitriche des étangs	I	AC?	DD						
CALLITRICHACEAE	<i>Callitriche truncata</i> Guss.	Callitriche tronqué (s.l.)	I	D?	EX?			(oui)			(R)
CALLITRICHACEAE	<i>Callitriche truncata</i> Guss. subsp. <i>occidentalis</i> (Rouy) Br.-Bl.	Callitriche occidentale	I	D?	EX?			(oui)			(R)
CAMPANULACEAE	<i>Campanula carpatica</i> Jacq.	Campanule des Carpathes	C(S)	?	H	j	?				
CAMPANULACEAE	<i>Campanula glomerata</i> L.	Campanule agglomérée	I(C)	AR	NT	p	E	oui			
CAMPANULACEAE	<i>Campanula medium</i> L.	Campanule carillon [Violette de Marie]	C(N?S)	E	H	j	?				
CAMPANULACEAE	<i>Campanula patula</i> L.	Campanule étalée (s.l.)	I?	D?	NE						
CAMPANULACEAE	<i>Campanula patula</i> L. subsp. <i>costae</i> (Willk.) Fedorov	Campanule de Costa	??	??	??						
CAMPANULACEAE	<i>Campanula patula</i> L. subsp. <i>patula</i>	Campanule étalée	??	??	??						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
CAMPANULACEAE	<i>Campanula persicifolia</i> L.	Campanule à feuilles de pêcher (s.l.)	I(NC)	RR	EN	j	?	oui			R
CAMPANULACEAE	<i>Campanula persicifolia</i> L. subsp. <i>persicifolia</i>	Campanule à feuilles de pêcher	I(NC)	RR	EN	j	?	oui			R
CAMPANULACEAE	<i>Campanula persicifolia</i> L. subsp. <i>persicifolia</i> var. <i>hispida</i> (Lej.) Lej.	Campanule à feuilles de pêcher (var.)	??	??	??			[oui]			[R]
CAMPANULACEAE	<i>Campanula persicifolia</i> L. subsp. <i>persicifolia</i> var. <i>lasiochalix</i> Gren. et Godr.	Campanule à feuilles de pêcher (var.)	I	?	DD			oui			R
CAMPANULACEAE	<i>Campanula persicifolia</i> L. subsp. <i>persicifolia</i> var. <i>persicifolia</i>	Campanule à feuilles de pêcher (var.)	I	?	DD			oui			R
CAMPANULACEAE	<i>Campanula persicifolia</i> L. subsp. <i>subpyrenaica</i> (Timb.-Lagr.) Fedorov	Campanule des Pyrénées	E								
CAMPANULACEAE	<i>Campanula portenschlagiana</i> Schult.	Campanule de Portenschlag [Campanule des murs]	C(S?)	?	H	j	AC?				
CAMPANULACEAE	<i>Campanula poscharskyana</i> Degen	Campanule de Poscharsky	??	??	??						
CAMPANULACEAE	<i>Campanula pyramidalis</i> L.	Campanule pyramidale	C(S)	D	H	j	?				
CAMPANULACEAE	<i>Campanula rapunculoides</i> L.	Campanule fausse-raiponce [Raiponce]	I	D?	EX?			(oui)			(R)
CAMPANULACEAE	<i>Campanula rapunculus</i> L.	Campanule raiponce	I	C	LC						
CAMPANULACEAE	<i>Campanula rotundifolia</i> L.	Campanule à feuilles rondes (s.l.)	I	C	LC						Rp
CAMPANULACEAE	<i>Campanula rotundifolia</i> L. subsp. <i>rotundifolia</i>	Campanule à feuilles rondes	I	C	LC						Rp
CAMPANULACEAE	<i>Campanula rotundifolia</i> L. subsp. <i>rotundifolia</i> var. <i>hirta</i> Koch	Campanule à feuilles rondes (var.)	I	E	CR			oui			R
CAMPANULACEAE	<i>Campanula rotundifolia</i> L. subsp. <i>rotundifolia</i> var. <i>rotundifolia</i>	Campanule à feuilles rondes (var.)	I	C	LC						
CAMPANULACEAE	<i>Campanula trachelium</i> L.	Campanule gantelée	I	PC	LC						
CAMPANULACEAE	<i>Jasione montana</i> L.	Jasione des montagnes	I	R	VU			oui			R
CAMPANULACEAE	<i>Legousia hybrida</i> (L.) Delarbre	Spéculaire hybride [Petite spéculaire]	I	E	CR			oui			R
CAMPANULACEAE	<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix	Spéculaire miroir-de-Vénus [Miroir de Vénus]	I	RR	CR			oui			R
CAMPANULACEAE	<i>Phyteuma nigrum</i> F.W. Schmidt	Raiponce noire	E?(I)	(E)	(CR)						
CAMPANULACEAE	<i>Phyteuma orbiculare</i> L.	Raiponce orbiculaire (s.l.)	I	AR	LC						
CAMPANULACEAE	<i>Phyteuma orbiculare</i> L. subsp. <i>orbiculare</i>	Raiponce orbiculaire	E?(I)	(E?)	(DD)						
CAMPANULACEAE	<i>Phyteuma orbiculare</i> L. subsp. <i>tenerum</i> (R. Schulz) P. Fourn.	Raiponce grêle	I	AR	NT			oui			
CAMPANULACEAE	<i>Phyteuma spicatum</i> L.	Raiponce en épi	I	R	NT			oui			
CAMPANULACEAE	<i>Phyteuma spicatum</i> L. var. <i>caeruleum</i> Godr.	Raiponce en épi (var.)	I	E	CR			oui			R
CAMPANULACEAE	<i>Phyteuma spicatum</i> L. var. <i>spicatum</i>	Raiponce en épi (var.)	I	R	NT			oui			
CAMPANULACEAE	<i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Reichenb.	Wahlenbergie à feuilles de lierre	I	D?	EX?			(oui)			(R)
CANNABACEAE	<i>Cannabis sativa</i> L.	Chanvre cultivé	C		H	d	RR?				
CANNABACEAE	<i>Humulus lupulus</i> L.	Houblon grim pant [Houblon]	I	AC	LC						
CAPRIFOLIACEAE	<i>Lonicera caprifolium</i> L.	Chèvrefeuille des jardins	C(N?)	?	H	j	?				

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
CAPRIFOLIACEAE	<i>Lonicera etrusca</i> Santi	Chèvrefeuille étrusque	S?	D	H						
CAPRIFOLIACEAE	<i>Lonicera nitida</i> Wils.	Chèvrefeuille luisant	C(S?)	?	H	pj	C				
CAPRIFOLIACEAE	<i>Lonicera periclymenum</i> L.	Chèvrefeuille des bois	I	CC	LC						
CAPRIFOLIACEAE	<i>Lonicera periclymenum</i> L. var. <i>periclymenum</i>	Chèvrefeuille des bois (var.)	I	CC	LC						
CAPRIFOLIACEAE	<i>Lonicera pileata</i> Oliv.	Chèvrefeuille à bonnet	C		H	pj	?				
CAPRIFOLIACEAE	<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Chèvrefeuille camérisier [Camérisier]	I(NC)	PC	LC	p	R?				
CAPRIFOLIACEAE	<i>Sambucus canadensis</i> L.	Sureau du Canada	??	??	??						
CAPRIFOLIACEAE	<i>Sambucus ebulus</i> L.	Sureau yèble [Yèble]	I	PC	LC						
CAPRIFOLIACEAE	<i>Sambucus nigra</i> L.	Sureau noir	I(NSC)	CC	LC	pj	?				
CAPRIFOLIACEAE	<i>Sambucus nigra</i> L. var. <i>laciniata</i> L.	Sureau noir (var.)	NS(C)	?	H	j	?				
CAPRIFOLIACEAE	<i>Sambucus nigra</i> L. var. <i>nigra</i>	Sureau noir (var.)	I(C)	CC	LC	pj					
CAPRIFOLIACEAE	<i>Sambucus nigra</i> L. var. <i>nigra</i> f. <i>alba</i> (Weston) Rehd.	Sureau noir (f.)	??	??	??						
CAPRIFOLIACEAE	<i>Sambucus racemosa</i> L.	Sureau à grappes	I?N(C)	R?	NE	pj	?				
CAPRIFOLIACEAE	<i>Sambucus racemosa</i> L. var. <i>plumosa</i> Spaeth ex Carr.	Sureau à grappes (var.)	??	??	??						
CAPRIFOLIACEAE	<i>Sambucus racemosa</i> L. var. <i>racemosa</i>	Sureau à grappes (var.)	I?N(C)	R?	NE	pj	?				
CAPRIFOLIACEAE	<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S.F. Blake	Symphorine blanche	C(NS)	?	H	pj	C				
CAPRIFOLIACEAE	<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S.F. Blake var. <i>laevigatus</i> (Fernald) S.F. Blake	Symphorine blanche (var.)	C(NS)	?	H	pj	C				
CAPRIFOLIACEAE	<i>Viburnum lantana</i> L.	Viorne lantane [Mancienne]	I(C)	C	LC	pj	?				
CAPRIFOLIACEAE	<i>Viburnum opulus</i> L.	Viorne obier	I(C)	C	LC	pj	C				
CAPRIFOLIACEAE	<i>Viburnum rhytidophyllum</i> Hemsl.	Viorne à feuilles ridées	C		H	pj	AC?				
CAPRIFOLIACEAE	<i>Viburnum tinus</i> L.	Viorne tin	C	?	H	j(p)	?				
CARYOPHYLLACEAE	<i>Agrostemma githago</i> L.	Nielle des blés	I(C)	D?	EX?	p	?	(oui)			(R)
CARYOPHYLLACEAE	<i>Arenaria montana</i> L.	Sabline des montagnes	I	D	EX			(oui)			(R)
CARYOPHYLLACEAE	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Sabline à feuilles de serpolet (s.l.)	I	C	LC						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L. subsp. <i>leptoclados</i> (Reichenb.) Nyman	Sabline à rameaux grêles	I	?	DD						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L. subsp. <i>serpyllifolia</i>	Sabline à feuilles de serpolet	I	C	LC						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L. subsp. <i>serpyllifolia</i> var. <i>lloydii</i> (Jord.) Lloyd	Sabline à feuilles de serpolet (var.) [Sabline de Lloyd]	I	?	DD						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L. subsp. <i>serpyllifolia</i> var. <i>serpyllifolia</i>	Sabline à feuilles de serpolet (var.)	I	C	LC						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L. subsp. <i>serpyllifolia</i> var. <i>viscida</i> (Haller f.) DC.	Sabline à feuilles de serpolet (var.)	??	??	??						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Cerastium arvense</i> L.	Céraiste des champs	I	AR	LC						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
CARYOPHYLLACEAE	<i>Cerastium brachypetalum</i> Pers.	Céraiste à pétales courts (s.l.)	I	RR?	DD			oui			
CARYOPHYLLACEAE	<i>Cerastium brachypetalum</i> Pers. subsp. <i>brachypetalum</i>	Céraiste à pétales courts	I	RR?	DD			oui			
CARYOPHYLLACEAE	<i>Cerastium brachypetalum</i> Pers. subsp. <i>luridum</i> (Boiss.) Nyman	Céraiste livide	??	??	??			[oui]			
CARYOPHYLLACEAE	<i>Cerastium diffusum</i> Pers.	Céraiste à quatre étamines	E?(I)	(?)	(DD)						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	Céraiste des fontaines (s.l.)	I	CC	LC						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter et Burdet	Céraiste commun	I	CC	LC						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter et Burdet var. <i>vulgare</i> (Hartm.) Wyse Jacks.	Céraiste commun (var.)	I	CC	LC						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Céraiste aggloméré	I	CC	LC						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Cerastium pumilum</i> Curt.	Céraiste nain (s.l.)	I	RR	EN			oui			R
CARYOPHYLLACEAE	<i>Cerastium pumilum</i> Curt. subsp. <i>glutinosa</i> (Fries) Corb.	Céraiste glutineux	I	RR?	DD			oui			
CARYOPHYLLACEAE	<i>Cerastium pumilum</i> Curt. subsp. <i>pumilum</i>	Céraiste nain	I	E?	DD			oui			
CARYOPHYLLACEAE	<i>Cerastium semidecandrum</i> L.	Céraiste scarieux	I	PC	LC						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Cerastium tomentosum</i> L.	Céraiste tomenteux [Oreille de souris]	C(NS)	?	H	j	C				
CARYOPHYLLACEAE	<i>Cerastium ×maureri</i> M. Schulze [<i>Cerastium arvense</i> L. × <i>Cerastium tomentosum</i> L.]	Céraiste de Maurer	??	??	??						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Corrigiola litoralis</i> L.	Corrigiole des rivages	I	E	CR			oui			R
CARYOPHYLLACEAE	<i>Delia segetalis</i> (L.) Dum.	Délie des moissons [Spergulaire des moissons]	I	D	EX			(oui)			(R)
CARYOPHYLLACEAE	<i>Dianthus armeria</i> L.	Œillet velu	I	R	VU			oui		C0	R
CARYOPHYLLACEAE	<i>Dianthus barbatus</i> L.	Œillet barbu	C(S?)	D	H	j	?				
CARYOPHYLLACEAE	<i>Dianthus carthusianorum</i> L.	Œillet des chartreux (s.l.) [Œillet de poète]	I	E	CR			oui		C0	R
CARYOPHYLLACEAE	<i>Dianthus carthusianorum</i> L. subsp. <i>carthusianorum</i>	Œillet des chartreux [Œillet de poète]	I	E	CR			oui		C0*	R
CARYOPHYLLACEAE	<i>Dianthus caryophyllus</i> L.	Œillet girofle [Œillet des fleuristes]	C(N)	RR	H	j	?				
CARYOPHYLLACEAE	<i>Dianthus deltoides</i> L.	Œillet deltoïdes	I(C)	D	EX	j	?	(oui)		C0	(R)
CARYOPHYLLACEAE	<i>Gypsophila muralis</i> L.	Gypsophile des moissons	I	D	EX			(oui)			(R)
CARYOPHYLLACEAE	<i>Herniaria glabra</i> L.	Herniaire glabre	I	RR?	DD			oui			
CARYOPHYLLACEAE	<i>Herniaria hirsuta</i> L.	Herniaire velue	I	E	CR			oui			R
CARYOPHYLLACEAE	<i>Holosteum umbellatum</i> L.	Holostée en ombelle	I	E?	DD			oui			
CARYOPHYLLACEAE	<i>Honckenya peploides</i> (L.) Ehrh.	Honckénia fausse-péplide [Pourpier de mer]	I	E	CR			oui			R
CARYOPHYLLACEAE	<i>Illecebrum verticillatum</i> L.	Illécèbre verticillé	I	E	CR			oui			R
CARYOPHYLLACEAE	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	Lychnide fleur-de-coucou [Fleur de coucou]	I	AC	NT			oui			
CARYOPHYLLACEAE	<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischkin	Alsine à feuilles ténues	I	RR?	DD			oui			

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
CARYOPHYLLACEAE	<i>Minuartia viscosa</i> (Schreb.) Schinz et Thell.	Alsine visqueuse	E?(I)	(?)	(DD)						F1(E)
CARYOPHYLLACEAE	<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.	Méringie trinervée	I	C	LC						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Moenchia erecta</i> (L.) P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.	Moenchie dressée (s.l.)	I	D	EX			(oui)			(R)
CARYOPHYLLACEAE	<i>Moenchia erecta</i> (L.) P. Gaertn., B. Mey. et Scherb. subsp. <i>erecta</i>	Moenchie dressée	I	D	EX			(oui)			(R)
CARYOPHYLLACEAE	<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench	Malaquie aquatique	I	PC	LC						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W. Ball et Heywood	Pérorrhagie prolifère [Œillet prolifère]	I	RR	CR			oui			R
CARYOPHYLLACEAE	<i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.) L.	Polycarpe à quatre feuilles	A(I?)	D?	NE						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Sagina apetala</i> Ard.	Sagine apétale (s.l.)	I	PC	LC						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Sagina apetala</i> Ard. subsp. <i>apetala</i>	Sagine apétale	I	?	DD						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Sagina apetala</i> Ard. subsp. <i>erecta</i> F. Hermann	Sagine dressée	I	?	DD						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Sagina maritima</i> G. Don	Sagine maritime	I	E	CR			oui			R
CARYOPHYLLACEAE	<i>Sagina nodosa</i> (L.) Fenzl	Sagine noueuse	I	D	EX			(oui)			(R)
CARYOPHYLLACEAE	<i>Sagina procumbens</i> L.	Sagine couchée	I	CC	LC						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Saponaria officinalis</i> L.	Saponaire officinale	I(NSC)	PC	LC	j	R				
CARYOPHYLLACEAE	<i>Saponaria officinalis</i> L. cv. à fleurs doubles	Saponaire officinale (cultivar à fleurs doubles)	NS(C)	?	H	j	R				
CARYOPHYLLACEAE	<i>Scleranthus annuus</i> L.	Gnavelle annuelle (s.l.)	I	RR	EN			oui			R
CARYOPHYLLACEAE	<i>Scleranthus annuus</i> L. subsp. <i>annuus</i>	Gnavelle annuelle	I	RR	EN			oui			R
CARYOPHYLLACEAE	<i>Scleranthus perennis</i> L.	Gnavelle vivace	I	D	EX			(oui)			(R)
CARYOPHYLLACEAE	<i>Silene armeria</i> L.	Silène armérie	C(S)	D	H	j	?				
CARYOPHYLLACEAE	<i>Silene conica</i> L.	Silène conique	I(A)	E	CR			oui			R
CARYOPHYLLACEAE	<i>Silene conoidea</i> L.	Silène conoïde	A	D	H						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Silene dichotoma</i> Ehrh.	Silène fourchu	A	E	H						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.	Silène dioïque [Compagnon rouge]	I	C	LC						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv. f. <i>dioica</i>	Silène dioïque (f.) [Compagnon rouge]	I	C	LC						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv. f. <i>lactea</i> (Hartm.) Meusel et K. Werner	Silène dioïque (f.)	I	?	DD						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Silene gallica</i> L.	Silène de France	I	E	CR			oui			R
CARYOPHYLLACEAE	<i>Silene latifolia</i> Poiret	Silène à larges feuilles (s.l.) [Compagnon blanc]	I	CC	LC						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Silene latifolia</i> Poiret subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter et Burdet	Silène blanc [Compagnon blanc]	I	CC	LC						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Silene latifolia</i> Poiret subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter et Burdet f. <i>alba</i>	Silène blanc (f.) [Compagnon blanc]	I	CC	LC						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Silene latifolia</i> Poiret subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter et Burdet f. <i>incarnata</i> (Peterm.) Lambinon	Silène blanc (f.)	I	?	DD						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
CARYOPHYLLACEAE	<i>Silene noctiflora</i> L.	Silène de nuit	A	D	H						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Silene nutans</i> L.	Silène penché	I	AR	NT			oui			
CARYOPHYLLACEAE	<i>Silene nutans</i> L. var. <i>nutans</i>	Silène penché (var.)	I	AR	NT			oui			
CARYOPHYLLACEAE	<i>Silene nutans</i> L. var. <i>nutans</i> f. <i>nutans</i>	Silène penché (f.)	I	AR	NT			oui			
CARYOPHYLLACEAE	<i>Silene nutans</i> L. var. <i>smithiana</i> Moss	Silène penché (var.)	E?(I)	(E)	(EN)						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Silene otites</i> (L.) Wibel	Silène à oreillettes	I	E	CR			oui			R
CARYOPHYLLACEAE	<i>Silene pendula</i> L.	Silène pendant	C(A)	D	H	j	?				
CARYOPHYLLACEAE	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	Silène enflé (s.l.)	I	AC	LC						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>maritima</i> (With.) Á. et D. Löve	Silène maritime	I	RR?	DD			oui			
CARYOPHYLLACEAE	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>maritima</i> (With.) Á. et D. Löve var. <i>maritima</i>	Silène maritime (var.)	??	??	??			[oui]			
CARYOPHYLLACEAE	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>maritima</i> (With.) Á. et D. Löve var. <i>montana</i> (Arrond.) Kerguelen	Silène maritime (var.)	??	??	??			[oui]			
CARYOPHYLLACEAE	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i>	Silène enflé	I	AC	LC						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i>	Silène enflé (var.)	I	AC	LC						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Silene ×hampeana</i> Meusel et K. Werner [<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv. × <i>Silene latifolia</i> Poirét subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter et Burdet]	Silène de Hampe	I	?	H						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Spergula arvensis</i> L.	Spargoute des champs [Spargoute]	I	PC	LC						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Spergula arvensis</i> L. var. <i>arvensis</i>	Spargoute des champs (var.) [Spargoute]	??	??	??						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Spergula arvensis</i> L. var. <i>maxima</i> (Weihe) Mert. et Koch	Spargoute des champs (var.) [Spargoute]	??	??	??						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Spergula arvensis</i> L. var. <i>praevisa</i> (N.W. Zinger) Aschers. et Graebn.	Spargoute des champs (var.) [Spargoute]	??	??	??						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Spergula pentandra</i> L.	Spargoute à cinq étamines	I	E	CR			oui			R
CARYOPHYLLACEAE	<i>Spergularia marina</i> (L.) Besser	Spergulaire marine	I	RR	VU			oui			R
CARYOPHYLLACEAE	<i>Spergularia media</i> (L.) C. Presl	Spergulaire marginée (s.l.)	I	E	VU			oui			R
CARYOPHYLLACEAE	<i>Spergularia media</i> (L.) C. Presl subsp. <i>angustata</i> (Clavaud) Kerguelen et Lambinon	Spergulaire atlantique	I	E	VU			oui			R
CARYOPHYLLACEAE	<i>Spergularia rubra</i> (L.) J. et C. Presl	Spergulaire rouge	I	RR?	DD			oui			
CARYOPHYLLACEAE	<i>Stellaria alsine</i> Grimm	Stellaire des fanges	I	PC	LC						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Stellaria graminea</i> L.	Stellaire graminée	I	AC	LC						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Stellaria holostea</i> L.	Stellaire holostée	I	CC	LC						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Stellaria holostea</i> L. var. <i>holostea</i>	Stellaire holostée (var.)	I	CC	LC						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Stellaire intermédiaire (s.l.)	I	CC	LC						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill. subsp. <i>media</i>	Stellaire intermédiaire [Mouron des oiseaux ; Mouron blanc]	I	CC	LC						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill. subsp. <i>neglecta</i> (Weihe) Gremli	Stellaire négligée	I	R?	DD						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
CARYOPHYLLACEAE	<i>Stellaria pallida</i> (Dum.) Piré	Stellaire pâle	E?(I)	(?)	(DD)						
CARYOPHYLLACEAE	<i>Stellaria palustris</i> Retz.	Stellaire des marais	I	E	CR			oui			R
CARYOPHYLLACEAE	<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert	Vaccaria d'Espagne	I	D	EX			(oui)			(R)
CARYOPHYLLACEAE	<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert var. <i>hispanica</i>	Vaccaria d'Espagne (var.)	??	??	??			[(oui)]			[(R)]
CARYOPHYLLACEAE	<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert var. <i>vaccaria</i> (L.) Greuter	Vaccaria d'Espagne (var.)	??	??	??			[(oui)]			[(R)]
CELASTRACEAE	<i>Euonymus europaeus</i> L.	Fusain d'Europe	I(C)	CC	LC	pj					
CELASTRACEAE	<i>Euonymus latifolius</i> (L.) Mill.	Fusain à larges feuilles	C(NS)	RR?	H	j(p)	C?				
CERATOPHYLLACEAE	<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	Cornifle nageant	I	PC	LC						
CERATOPHYLLACEAE	<i>Ceratophyllum demersum</i> L. var. <i>apiculatum</i> (Cham.) Aschers.	Cornifle nageant (var.)	??	??	??						
CERATOPHYLLACEAE	<i>Ceratophyllum demersum</i> L. var. <i>demersum</i>	Cornifle nageant (var.)	??	??	??						
CERATOPHYLLACEAE	<i>Ceratophyllum demersum</i> L. var. <i>inerme</i> J. Gay ex Radcliffe-Smith	Cornifle nageant (var.)	??	??	??						
CERATOPHYLLACEAE	<i>Ceratophyllum demersum</i> L. var. <i>platyacanthum</i> (Cham.) Wimmer	Cornifle nageant (var.)	??	??	??						
CERATOPHYLLACEAE	<i>Ceratophyllum submersum</i> L.	Cornifle submergé	I	RR	EN			oui		R1	R
CHENOPODIACEAE	<i>Atriplex glabriuscula</i> Edmondst.	Arroche de Babington	I	E	CR			oui			R
CHENOPODIACEAE	<i>Atriplex halimus</i> L.	Arroche halime	C(S)	D?	H	j	?				
CHENOPODIACEAE	<i>Atriplex hortensis</i> L.	Arroche des jardins [Arroche-épinard ; Bonne-dame]	C		H	a	?				
CHENOPODIACEAE	<i>Atriplex laciniata</i> L.	Arroche laciniée	I	E	CR			oui			R
CHENOPODIACEAE	<i>Atriplex littoralis</i> L.	Arroche littorale	I	D	EX			(oui)			(R)
CHENOPODIACEAE	<i>Atriplex patula</i> L.	Arroche étalée	I	C	LC						
CHENOPODIACEAE	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC.	Arroche hastée (s.l.)	I	C	LC						
CHENOPODIACEAE	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC. subsp. <i>deltoidea</i> (Bab.) Rauschert	Arroche deltoïde	I	?	DD						
CHENOPODIACEAE	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC. subsp. <i>latifolia</i> (Wahlenb.) Rauschert	Arroche à larges feuilles	I	?	DD						
CHENOPODIACEAE	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC. subsp. <i>prostrata</i>	Arroche hastée	I	?	DD						
CHENOPODIACEAE	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC. subsp. <i>triangularis</i> (Willd.) Rauschert	Arroche triangulaire	??	??	??						
CHENOPODIACEAE	<i>Atriplex rosea</i> L.	Arroche rosée	A	D	H						
CHENOPODIACEAE	<i>Atriplex glabriuscula</i> Edmondst. × <i>A. prostrata</i> Boucher ex DC.		??	??	??						
CHENOPODIACEAE	<i>Beta vulgaris</i> L.	Bette commune (s.l.)	IC	AR	LC	ia	CC				
CHENOPODIACEAE	<i>Beta vulgaris</i> L. subsp. <i>maritima</i> (L.) Arcang.	Bette maritime	I	AR	LC						
CHENOPODIACEAE	<i>Beta vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	Bette commune [Betterave]	C		H	ia	CC				
CHENOPODIACEAE	<i>Beta vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Döll	Bette commune (var.) [Betterave sucrière]	C		H	i	CC				

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
CHENOPODIACEAE	<i>Beta vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i> var. <i>cicla</i> L.	Bette commune (var.) [Bette]	C		H	a	PC				
CHENOPODIACEAE	<i>Beta vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i> var. <i>rapacea</i> (Koch) Aell.	Bette commune (var.) [Betterave fourragère]	C		H	a	AC				
CHENOPODIACEAE	<i>Beta vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i>	Bette commune (var.) [Betterave rouge]	C		H	a	C				
CHENOPODIACEAE	<i>Chenopodium album</i> L.	Chénopode blanc (s.l.)	I	CC	LC						
CHENOPODIACEAE	<i>Chenopodium album</i> L. subsp. <i>album</i>	Chénopode blanc	I	CC	LC						
CHENOPODIACEAE	<i>Chenopodium album</i> L. subsp. <i>striatum</i> (Krašan) J. Murr	Chénopode strié	??	??	??						
CHENOPODIACEAE	<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.	Chénopode fausse-ambrosie [Thé du Mexique]	A	E	H						
CHENOPODIACEAE	<i>Chenopodium bonus-henricus</i> L.	Chénopode bon-Henri [Bon-Henri]	Z(SC)	E	ZCR	a	?	oui			R
CHENOPODIACEAE	<i>Chenopodium botrys</i> L.	Chénopode botryde	N	D	H						
CHENOPODIACEAE	<i>Chenopodium chenopodioides</i> (L.) Aell.	Chénopode à feuilles grasses	I	E	EN			oui			R
CHENOPODIACEAE	<i>Chenopodium ficifolium</i> Smith	Chénopode à feuilles de figuier	I	?	DD						
CHENOPODIACEAE	<i>Chenopodium foliosum</i> Aschers.	Chénopode feuillu	C(A)	D	H	a	?				
CHENOPODIACEAE	<i>Chenopodium glaucum</i> L.	Chénopode glauque	I	?	DD						
CHENOPODIACEAE	<i>Chenopodium hybridum</i> L.	Chénopode hybride	I	R	NT			oui			
CHENOPODIACEAE	<i>Chenopodium murale</i> L.	Chénopode des murs	I	E	CR			oui			R
CHENOPODIACEAE	<i>Chenopodium opulifolium</i> Schrad. ex Koch et Ziz	Chénopode à feuilles d'obier	A	D?	H						
CHENOPODIACEAE	<i>Chenopodium polyspermum</i> L.	Chénopode polysperme	I	C	LC						
CHENOPODIACEAE	<i>Chenopodium polyspermum</i> L. var. <i>acutifolium</i> (Smith) Gaudin	Chénopode polysperme (var.)	I	?	DD						
CHENOPODIACEAE	<i>Chenopodium polyspermum</i> L. var. <i>polyspermum</i>	Chénopode polysperme (var.)	I	?	DD						
CHENOPODIACEAE	<i>Chenopodium rubrum</i> L.	Chénopode rouge	I	PC?	DD						
CHENOPODIACEAE	<i>Chenopodium rubrum</i> L. var. <i>blitoides</i> (Lej.) Wallr.	Chénopode rouge (var.)	??	??	??						
CHENOPODIACEAE	<i>Chenopodium rubrum</i> L. var. <i>humile</i> (Hook.) Gürke	Chénopode rouge (var.)	??	??	??						
CHENOPODIACEAE	<i>Chenopodium rubrum</i> L. var. <i>rubrum</i>	Chénopode rouge (var.)	I	PC?	DD						
CHENOPODIACEAE	<i>Chenopodium urbicum</i> L.	Chénopode des villages	I	D	EX			(oui)			(R)
CHENOPODIACEAE	<i>Chenopodium vulvaria</i> L.	Chénopode fétide [Arroche puante]	I	D?	EX?			(oui)			(R)
CHENOPODIACEAE	<i>Corispermum pallasii</i> Steven	Corisperme à fruits ailés	A	E	H				P		
CHENOPODIACEAE	<i>Halimione pedunculata</i> (L.) Aell.	Obione pédonculée	I	D	EX			(oui)		N1	E(E);F1(E);(R)
CHENOPODIACEAE	<i>Halimione portulacoides</i> (L.) Aell.	Obione faux-pourpier	I	E	EN			oui			R
CHENOPODIACEAE	<i>Polycnemon arvense</i> L.	Polycnème des champs	A	D	H						
CHENOPODIACEAE	<i>Polycnemon majus</i> A. Braun	Polycnème élevé [Grand polycnème]	I	D	EX			(oui)			(R)

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
CHENOPODIACEAE	<i>Salicornia europaea</i> L.	Salicorne d'Europe	I	E	CR			oui		C0	R
CHENOPODIACEAE	<i>Salicornia obscura</i> P.W. Ball et Tutin	Salicorne obscure	I	E	CR			oui		C0	R
CHENOPODIACEAE	<i>Salicornia procumbens</i> Smith	Salicorne couchée	I	E	CR			oui		C0	R
CHENOPODIACEAE	<i>Salicornia procumbens</i> Smith var. <i>procumbens</i>	Salicorne couchée (var.)	I	E	CR			oui		C0*	R
CHENOPODIACEAE	<i>Salicornia procumbens</i> Smith var. <i>stricta</i> (G.F.W. Mey.) J. Duvigneaud et Lambinon	Salicorne couchée (var.)	E?(I)	(E)	(CR)					C0*	
CHENOPODIACEAE	<i>Salicornia europaea</i> L. × <i>S. pusilla</i> J. Woods		I	E	H					C0	
CHENOPODIACEAE	<i>Salsola kali</i> L.	Soude kali (s.l.)	I	E	CR			oui			R
CHENOPODIACEAE	<i>Salsola kali</i> L. subsp. <i>kali</i>	Soude kali	??	??	??			[oui]			[R]
CHENOPODIACEAE	<i>Salsola kali</i> L. subsp. <i>tragus</i> (L.) Celak.	Soude d'Ukraine	??	??	??			[oui]			[R]
CHENOPODIACEAE	<i>Spinacia oleracea</i> L.	Épinard potager	C		H	a	C				
CHENOPODIACEAE	<i>Suaeda maritima</i> (L.) Dum.	Suéda maritime	I	E	VU			oui			R
CHENOPODIACEAE	<i>Suaeda maritima</i> (L.) Dum. var. <i>macrocarpa</i> (Desv.) Moq.	Suéda maritime (var.)	I	E	VU			oui			R
CHENOPODIACEAE	<i>Suaeda maritima</i> (L.) Dum. var. <i>maritima</i>	Suéda maritime (var.)	??	??	??			[oui]			[R]
CISTACEAE	<i>Fumana procumbens</i> (Dun.) Gren. et Godr.	Fumana couché	I	RR	EN			oui			R
CISTACEAE	<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill.	Hélianthème des Apennins	I	AR	NT			oui			
CISTACEAE	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	Hélianthème nummulaire (s.l.)	I	PC	LC						Rp
CISTACEAE	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. nsubsp. <i>kernerii</i> (Gottlieb et Janchen ex Janchen) Lambinon	Hélianthème de Kerner	??	??	??						
CISTACEAE	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. subsp. <i>nummularium</i>	Hélianthème nummulaire [Hélianthème jaune]	I	PC	LC						Rp
CISTACEAE	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. subsp. <i>nummularium</i> f. <i>nummularium</i>	Hélianthème nummulaire (f.) [Hélianthème jaune]	I	PC	LC						
CISTACEAE	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. subsp. <i>nummularium</i> f. <i>ochroleucum</i> Issler	Hélianthème nummulaire (f.) [Hélianthème jaune]	I	E	CR			oui			R
CISTACEAE	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. subsp. <i>obscurum</i> (Celak.) Holub	Hélianthème obscur	I	E	EN			oui			R
CISTACEAE	<i>Helianthemum oelandicum</i> (L.) Dum.-Courset	Hélianthème des montagnes (s.l.)	I	RR	VU			oui			R
CISTACEAE	<i>Helianthemum oelandicum</i> (L.) Dum.-Courset subsp. <i>incanum</i> (Willk.) G. López	Hélianthème blanchâtre	I	RR	VU			oui		R1	R
CISTACEAE	<i>Helianthemum</i> × <i>sulphureum</i> Willd. ex Schlecht. [<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill. × <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. subsp. <i>nummularium</i>]	Hélianthème soufré	I	RR	H						
CISTACEAE	<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr.	Tubéraire tachée [Hélianthème taché]	I	E	CR			oui			R
CONVOLVULACEAE	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Brown	Calystégie des haies [Liseron des haies]	I	CC	LC						
CONVOLVULACEAE	<i>Calystegia silvatica</i> (Kit.) Griseb.	Calystégie des forêts	N	E?	H						
CONVOLVULACEAE	<i>Calystegia soldanella</i> (L.) R. Brown	Calystégie soldanelle [Liseron des dunes]	I	D?	EX?			(oui)			(R)
CONVOLVULACEAE	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Liseron des champs	I	CC	LC						
CONVOLVULACEAE	<i>Convolvulus tricolor</i> L.	Liseron tricolore (s.l.)	C(S)	D	H	j	PC?				

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
CONVOLVULACEAE	<i>Convolvulus tricolor</i> L. subsp. <i>tricolor</i>	Liseron tricolore	C(S)	D	H	j	PC?				
CONVOLVULACEAE	<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.	Ipomée patate	A	E	H						
CORNACEAE	<i>Cornus alba</i> L.	Cornouiller blanc	C		H	pj	?				
CORNACEAE	<i>Cornus mas</i> L.	Cornouiller mâle	I(C)	PC	LC	p	?				
CORNACEAE	<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin	I(C)	CC	LC	pj	?				
CORNACEAE	<i>Cornus sericea</i> L.	Cornouiller soyeux	C		H	pj	?				
CRASSULACEAE	<i>Crassula tillaea</i> Lester-Garland	Crassule tillée [Mousse fleurie]	I	RR	CR			oui			R
CRASSULACEAE	<i>Sedum acre</i> L.	Orpin âcre	I(C)	C	LC	p	E?				
CRASSULACEAE	<i>Sedum album</i> L.	Orpin blanc (s.l.)	INSC	R?	DD	j	?				
CRASSULACEAE	<i>Sedum album</i> L. subsp. <i>album</i>	Orpin blanc	INSC	R?	DD	j	?				
CRASSULACEAE	<i>Sedum album</i> L. subsp. <i>micranthum</i> (Bast.) Syme	Orpin à petites fleurs	I?	D?	NE						
CRASSULACEAE	<i>Sedum anglicum</i> Huds.	Orpin d'Angleterre	A	E	H						
CRASSULACEAE	<i>Sedum cepaea</i> L.	Orpin paniculé	I?N?	E	NE						
CRASSULACEAE	<i>Sedum dasyphyllum</i> L.	Orpin à feuilles épaisses	N	E	H						
CRASSULACEAE	<i>Sedum forsterianum</i> Smith	Orpin élégant	I	RR	VU			oui			R
CRASSULACEAE	<i>Sedum rubens</i> L.	Orpin rougeâtre	I	RR	EN			oui			R
CRASSULACEAE	<i>Sedum rupestre</i> L.	Orpin réfléchi [Trique-madame]	I(N?)	R	NT			oui			
CRASSULACEAE	<i>Sedum sexangulare</i> L.	Orpin à six angles	I(N?)	D?	EX?			(oui)			(R)
CRASSULACEAE	<i>Sedum spurium</i> Bieb.	Orpin bâtard	C(S)	E	H	j	?				
CRASSULACEAE	<i>Sedum telephium</i> L.	Orpin reprise (s.l.)	I	PC	LC						
CRASSULACEAE	<i>Sedum telephium</i> L. subsp. <i>fabaria</i> (Koch) Syme	Orpin février	E?(I)	(?)	(DD)						
CRASSULACEAE	<i>Sedum telephium</i> L. subsp. <i>telephium</i>	Orpin reprise [Herbe à la coupure]	I	PC	LC						
CRASSULACEAE	<i>Sempervivum tectorum</i> L.	Joubarbe des toits	C(N?S)	?	H	j(p)	?				
CRASSULACEAE	<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy	Ombilic rupestre [Nombriil de Vénus]	I	E	CR			oui			R
CUCURBITACEAE	<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	Bryone dioïque [Bryone]	I	C	LC						
CUCURBITACEAE	<i>Citrullus colocynthis</i> (L.) Schrad.	Citrouille coloquinte	C		H	a	PC				
CUCURBITACEAE	<i>Cucumis melo</i> L.	Concombre melon [Melon]	C		H	a	R				
CUCURBITACEAE	<i>Cucumis sativus</i> L.	Concombre cultivé [Concombre ; Cornichon]	C		H	a	PC				
CUCURBITACEAE	<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne ex Lam.	Courge potiron [Potiron ; Citrouille]	C		H	a	C				
CUCURBITACEAE	<i>Cucurbita pepo</i> L.	Courge pépon [Giraumon ; Citrouille iroquoise ; Courgette]	C		H	a	AC				

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
CUCURBITACEAE	<i>Ecballium elaterium</i> (L.) A. Rich.	Ecballie élastique	C(S)	D	H	j	?				
CUSCUTACEAE	<i>Cuscuta campestris</i> Yunck.	Cuscute champêtre	A	E	H						
CUSCUTACEAE	<i>Cuscuta epilinum</i> Weihe	Cuscute du lin	Z	D	ZEX			(oui)			
CUSCUTACEAE	<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L.	Cuscute à petites fleurs [Petite cuscute]	I	RR	EN			oui			R
CUSCUTACEAE	<i>Cuscuta europaea</i> L.	Cuscute d'Europe [Grande cuscute]	I	RR	EN			oui			R
CUSCUTACEAE	<i>Cuscuta suaveolens</i> Seringe	Cuscute odorante	A	D	H						
CYPERACEAE	<i>Blysmus compressus</i> (L.) Panzer ex Link	Blysme comprimé	I	D?	EX?			(oui)			(R)
CYPERACEAE	<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla	[Scirpe maritime]	I	R	NT			oui			
CYPERACEAE	<i>Bolboschoenus yagara</i> (Ohwi) A.E. Kozhev.	[Scirpe yagara]	??	??	??						
CYPERACEAE	<i>Carex acuta</i> L.	Laîche aiguë	I	AR	NT			oui			
CYPERACEAE	<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	Laîche des marais	I	AC	LC						
CYPERACEAE	<i>Carex acutiformis</i> Ehrh. f. <i>acutiformis</i>	Laîche des marais (f.)	I	AC	LC						
CYPERACEAE	<i>Carex acutiformis</i> Ehrh. f. <i>spadicea</i> (Roth) P. Junge	Laîche des marais (f.)	I	?	DD						
CYPERACEAE	<i>Carex appropinquata</i> C.F. Schumach.	Laîche paradoxale	I	D	EX			(oui)			(R)
CYPERACEAE	<i>Carex arenaria</i> L.	Laîche des sables	I	E	CR			oui			R
CYPERACEAE	<i>Carex arenaria</i> L. var. <i>arenaria</i>	Laîche des sables (var.)	I	E	CR			oui			R
CYPERACEAE	<i>Carex binervis</i> Smith	Laîche à deux nervures	I	E	CR			oui			R
CYPERACEAE	<i>Carex brizoides</i> L.	Laîche fausse-brize	I?	D?	NE						
CYPERACEAE	<i>Carex canescens</i> L.	Laîche blanchâtre	I	RR	CR			oui			R
CYPERACEAE	<i>Carex caryophyllea</i> Latourr.	Laîche printanière	I	PC	LC						
CYPERACEAE	<i>Carex cuprina</i> (Sándor ex Heuffel) Nendtvich ex A. Kerner	Laîche cuivrée	I	PC	LC						
CYPERACEAE	<i>Carex cuprina</i> (Sándor ex Heuffel) Nendtvich ex A. Kerner var. <i>cuprina</i>	Laîche cuivrée (var.)	I	PC	LC						
CYPERACEAE	<i>Carex cuprina</i> (Sándor ex Heuffel) Nendtvich ex A. Kerner var. <i>subcontigua</i> (Kük.) De Langhe et Labinon	Laîche cuivrée (var.)	??	??	??						
CYPERACEAE	<i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm.	Laîche déprimée	I	R	VU			oui			R
CYPERACEAE	<i>Carex depauperata</i> Curt. ex With.	Laîche appauvrie	I	D?	EX?			(oui)			(R)
CYPERACEAE	<i>Carex diandra</i> Schrank	Laîche arrondie	I	D	EX			(oui)			(R)
CYPERACEAE	<i>Carex digitata</i> L.	Laîche digitée	I	E	VU			oui		R1	R
CYPERACEAE	<i>Carex distans</i> L.	Laîche distante	I	RR	CR			oui			R
CYPERACEAE	<i>Carex distans</i> L. var. <i>distans</i>	Laîche distante (var.)	I	?	DD						
CYPERACEAE	<i>Carex distans</i> L. var. <i>vikingsensis</i> (C.B. Clarke) Gadec.	Laîche distante (var.)	I	E?	DD			oui			

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
CYPERACEAE	<i>Carex disticha</i> Huds.	Laîche distique	I	AR	LC						
CYPERACEAE	<i>Carex divisa</i> Huds.	Laîche divisée	I	E	CR			oui			R
CYPERACEAE	<i>Carex divulsa</i> Stokes	Laîche écartée (s.l.)	I	PC	LC						
CYPERACEAE	<i>Carex divulsa</i> Stokes subsp. <i>divulsa</i>	Laîche écartée	I	?	DD						
CYPERACEAE	<i>Carex divulsa</i> Stokes subsp. <i>leersii</i> (Kneucker) W. Koch	Laîche de Leers	I	?	DD						
CYPERACEAE	<i>Carex divulsa</i> Stokes var. <i>polycarpa</i> Vollm.	Laîche écartée (s.l.) (var.)	??	??	??						
CYPERACEAE	<i>Carex echinata</i> Murray	Laîche étoilée	I	RR	VU			oui			R
CYPERACEAE	<i>Carex elata</i> All.	Laîche raide	I	R	VU			oui			R
CYPERACEAE	<i>Carex elongata</i> L.	Laîche allongée	I	E	CR			oui			R
CYPERACEAE	<i>Carex extensa</i> Good.	Laîche étirée	I	D	EX			(oui)			(R)
CYPERACEAE	<i>Carex flacca</i> Schreb.	Laîche glauque	I	C	LC						
CYPERACEAE	<i>Carex flava</i> L.	Laîche jaune	E?(I)	(?)	(DD)						
CYPERACEAE	<i>Carex halleriana</i> Asso	Laîche de Haller	I	E	CR			oui			R
CYPERACEAE	<i>Carex hirta</i> L.	Laîche hérissée	I	AC	LC						
CYPERACEAE	<i>Carex hirta</i> L. f. <i>hirta</i>	Laîche hérissée (f.)	I	AC	LC						
CYPERACEAE	<i>Carex hirta</i> L. f. <i>hirtiformis</i> (Pers.) P. Junge	Laîche hérissée (f.)	??	??	??						
CYPERACEAE	<i>Carex hostiana</i> DC.	Laîche blonde	I	D?	EX?			(oui)			(R)
CYPERACEAE	<i>Carex humilis</i> Leyss.	Laîche humble	I	RR	EN			oui		R1	R
CYPERACEAE	<i>Carex laevigata</i> Smith	Laîche lisse	I	E	CR			oui			R
CYPERACEAE	<i>Carex lepidocarpa</i> Tausch	Laîche à fruits écailleux	I	E	EN			oui			R
CYPERACEAE	<i>Carex limosa</i> L.	Laîche des boursiers	I	D	EX			(oui)		N1	(R)
CYPERACEAE	<i>Carex montana</i> L.	Laîche des montagnes	I	E	CR			oui			R
CYPERACEAE	<i>Carex muricata</i> L.	Laîche muriquée (s.l.)	I	RR?	DD			oui			
CYPERACEAE	<i>Carex muricata</i> L. subsp. <i>lamprocarpa</i> Celak.	Laîche de Paira	I	RR?	DD			oui			
CYPERACEAE	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard	Laîche noire	I	R	VU			oui			R
CYPERACEAE	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard f. <i>nigra</i>	Laîche noire (f.)	I	R	VU			oui			R
CYPERACEAE	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard f. <i>recta</i> (Fleischer) Kern et Reichg.	Laîche noire (f.)	??	??	??			[oui]			[R]
CYPERACEAE	<i>Carex ovalis</i> Good.	Laîche des lièvres	I	AR	LC						
CYPERACEAE	<i>Carex ovalis</i> Good. var. <i>ovalis</i>	Laîche des lièvres (var.)	I	AR	LC						
CYPERACEAE	<i>Carex pallescens</i> L.	Laîche pâle	I	AR	LC						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
CYPERACEAE	<i>Carex panicea</i> L.	Laïche bleuâtre	I	R	VU			oui			R
CYPERACEAE	<i>Carex paniculata</i> L.	Laïche paniculée	I	AR	LC						
CYPERACEAE	<i>Carex pendula</i> Huds.	Laïche pendante	I(C)	AR	LC	p	?				
CYPERACEAE	<i>Carex pilulifera</i> L.	Laïche à pilules	I	AC	LC						
CYPERACEAE	<i>Carex praecox</i> Schreb.	Laïche précoce (s.l.)	E?(I)	(D)	(EX)						
CYPERACEAE	<i>Carex praecox</i> Schreb. subsp. <i>praecox</i>	Laïche précoce	E?(I)	(D)	(EX)						
CYPERACEAE	<i>Carex pseudocyperus</i> L.	Laïche faux-souchet	I	AR	LC						
CYPERACEAE	<i>Carex pulicaris</i> L.	Laïche puce	I	E	CR			oui			R
CYPERACEAE	<i>Carex remota</i> Jusl. ex L.	Laïche espacée	I	AC	LC						
CYPERACEAE	<i>Carex riparia</i> Curt.	Laïche des rives	I	PC	LC						
CYPERACEAE	<i>Carex rostrata</i> Stokes	Laïche ampoulée	I	RR	EN			oui			R
CYPERACEAE	<i>Carex spicata</i> Huds.	Laïche en épi	I	AC?	DD						
CYPERACEAE	<i>Carex strigosa</i> Huds.	Laïche maigre	I	AR	LC						
CYPERACEAE	<i>Carex sylvatica</i> Huds.	Laïche des forêts	I	C	LC						
CYPERACEAE	<i>Carex tomentosa</i> L.	Laïche tomenteuse	I	RR	EN			oui			R
CYPERACEAE	<i>Carex trinervis</i> Degl.	Laïche trinervée	I	D	EX			(oui)			E(V);(R)
CYPERACEAE	<i>Carex vesicaria</i> L.	Laïche vésiculeuse	I	R	NT			oui			
CYPERACEAE	<i>Carex viridula</i> Michaux	Laïche verdoyante	I	E	CR			oui			R
CYPERACEAE	<i>Carex viridula</i> Michaux var. <i>viridula</i>	Laïche verdoyante (var.)	I	E	CR			oui			R
CYPERACEAE	<i>Carex vulpina</i> L.	Laïche des renards	E?(I)	(?)	(DD)						
CYPERACEAE	<i>Carex ×boenninghausiana</i> Weihe [<i>Carex paniculata</i> L. × <i>Carex remota</i> Jusl. ex L.]	Laïche de Boenninghausen	I	E	H						
CYPERACEAE	<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl	Cladion marisque [Marisque]	I	E	EN			oui			R
CYPERACEAE	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	Souchet vigoureux	A	E	H						
CYPERACEAE	<i>Cyperus flavescent</i> L.	Souchet jaunâtre	I	D	EX			(oui)			(R)
CYPERACEAE	<i>Cyperus fuscus</i> L.	Souchet brun	I	RR	VU			oui			R
CYPERACEAE	<i>Cyperus longus</i> L.	Souchet long (s.l.)	I	RR	EN			oui			R
CYPERACEAE	<i>Cyperus longus</i> L. subsp. <i>badius</i> (Desf.) Bonnier et Layens	Souchet bai	??	??	??						
CYPERACEAE	<i>Cyperus longus</i> L. subsp. <i>longus</i>	Souchet long	I	RR	EN			oui			R
CYPERACEAE	<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. et Schult.	Éléocharide épingle [Scirpe épingle]	I	E	CR			oui			R
CYPERACEAE	<i>Eleocharis mamillata</i> H. Lindb.	Éléocharide à tétons	I	E	CR			oui			R

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
CYPERACEAE	<i>Eleocharis multicaulis</i> (Smith) Desv.	Éléocharide à tiges nombreuses [Scirpe à tiges nombreuses]	I	E	CR			oui			R
CYPERACEAE	<i>Eleocharis ovata</i> (Roth.) Roem. et Schult.	Éléocharide ovoïde [Scirpe à inflorescence ovoïde]	I	E	CR			oui			R
CYPERACEAE	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. et Schult.	Éléocharide des marais (s.l.) [Scirpe des marais]	I	PC	LC						
CYPERACEAE	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. et Schult. subsp. <i>palustris</i>	Éléocharide des marais [Scirpe des marais]	??	??	??						
CYPERACEAE	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. et Schult. subsp. <i>vulgaris</i> Walters	Éléocharide vulgaire [Scirpe des marais]	I	?	DD						
CYPERACEAE	<i>Eleocharis quinqueflora</i> (F.X. Hartm.) O. Schwartz	Éléocharide pauciflore [Scirpe pauciflore]	I	D	EX			(oui)			(R)
CYPERACEAE	<i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult.	Éléocharide à une écaille [Scirpe à une écaille]	I	RR	CR			oui			R
CYPERACEAE	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck.	Linaigrette à feuilles étroites	I	RR	CR			oui			R
CYPERACEAE	<i>Eriophorum gracile</i> Koch ex Roth	Linaigrette grêle	I	D	EX			(oui)		N1	E(V);(R)
CYPERACEAE	<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	Linaigrette à larges feuilles	I	D?	EX?			(oui)			(R)
CYPERACEAE	<i>Eriophorum vaginatum</i> L.	Linaigrette engainée	I	E	CR			oui		R1	R
CYPERACEAE	<i>Isolepis fluitans</i> (L.) R. Brown	[Scirpe flottant]	I	D?	EX?			(oui)			(R)
CYPERACEAE	<i>Isolepis setacea</i> (L.) R. Brown	[Scirpe sétacé]	I	AR	LC						
CYPERACEAE	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	Rhynchosporé blanc	I	E	CR			oui		R1	R
CYPERACEAE	<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla	[Scirpe des lacs ; Jonc des chaisiers]	I(C)	RR	EN	p	?	oui			R
CYPERACEAE	<i>Schoenoplectus pungens</i> (Vahl) Palla	[Scirpe piquant]	I	E	CR			oui		R1	R
CYPERACEAE	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C. Gmel.) Palla	[Scirpe de Tabernaemontanus ; Jonc des chaisiers glauque]	I	RR	VU			oui			R
CYPERACEAE	<i>Schoenoplectus triqueter</i> (L.) Palla	[Scirpe triquètre]	I	E	CR			oui		R1	R
CYPERACEAE	<i>Schoenus nigricans</i> L.	Choin noirâtre	I	E	CR			oui			R
CYPERACEAE	<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	Scirpe des forêts	I	AR	LC						
CYPERACEAE	<i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) Hartm.	[Scirpe cespiteux (s.l.)]	I	D?	EX?			(oui)			(R)
CYPERACEAE	<i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) Hartm. subsp. <i>germanicum</i> (Palla) Hegi	[Scirpe d'Allemagne]	I	D?	EX?			(oui)			(R)
DIOSCOREACEAE	<i>Tamus communis</i> L.	Tamier commun	I	C	LC					C0	
DIPSACACEAE	<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Cardère sauvage [Cabaret des oiseaux]	I	C	LC						
DIPSACACEAE	<i>Dipsacus pilosus</i> L.	Cardère poilue	I	AR	LC						
DIPSACACEAE	<i>Dipsacus sativus</i> (L.) Honck.	Cardère à foulon	C		H	d	D				
DIPSACACEAE	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coulter	Knautie des champs	I	C	LC						
DIPSACACEAE	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coulter var. <i>arvensis</i>	Knautie des champs (var.)	I	C	LC						
DIPSACACEAE	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coulter var. <i>integrifolia</i> Coulter	Knautie des champs (var.)	I	?	DD						
DIPSACACEAE	<i>Scabiosa columbaria</i> L.	Scabieuse colombarie (s.l.)	I	AC	LC						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
DIPSACACEAE	<i>Scabiosa columbaria</i> L. subsp. <i>columbaria</i>	Scabieuse colombarie [Colombarie]	I	AC	LC						
DIPSACACEAE	<i>Succisa pratensis</i> Moench	Succise des prés [Mors du diable]	I	AC	LC						
DROSERACEAE	<i>Drosera anglica</i> Huds.	Rosolis à feuilles longues	I	D	EX			(oui)		N2	(R)
DROSERACEAE	<i>Drosera intermedia</i> Hayne	Rosolis intermédiaire	I	E	CR			oui		N2	R
DROSERACEAE	<i>Drosera rotundifolia</i> L.	Rosolis à feuilles rondes	I	RR	EN			oui		N2	R
DROSERACEAE	<i>Drosera xobovata</i> Mert. et Koch [<i>Drosera anglica</i> L. × <i>Drosera rotundifolia</i> L.]	Rosolis obovale	I	D	H						
ELAEAGNACEAE	<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	Chalef à feuilles étroites	??	??	??						
ELAEAGNACEAE	<i>Elaeagnus umbellata</i> Thunb.	Chalef en ombelle	C(S)	E	H	pj	AC?				
ELAEAGNACEAE	<i>Elaeagnus xebbingei</i> J. Doorenbos [<i>Elaeagnus macrophylla</i> Thunb. × <i>Elaeagnus pungens</i> Thunb.]	Chalef d'Ebbing	??	??	??						
ELAEAGNACEAE	<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	Argousier faux-nerprun (s.l.)	I(C)	E	VU	p	?	oui			R
ELAEAGNACEAE	<i>Hippophae rhamnoides</i> L. subsp. <i>fluviatilis</i> v. Soest	Argousier fluviatile	C		H	p	?				
ELAEAGNACEAE	<i>Hippophae rhamnoides</i> L. subsp. <i>rhamnoides</i>	Argousier faux-nerprun [Argousier]	I	RR	VU			oui			R
ELATINACEAE	<i>Elatine alsinastrum</i> L.	Élatine verticillée	I	D	EX			(oui)			E(I);(R)
ERICACEAE	<i>Andromeda polifolia</i> L.	Andromède à feuilles de polium [Andromède]	I	D	EX			(oui)		N1	(R)
ERICACEAE	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Callune commune [Callune]	I	C	LC						Rp
ERICACEAE	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull var. <i>hirsuta</i> (Waitz) S.F. Gray	Callune commune (var.) [Callune]	I	E	VU			oui			R
ERICACEAE	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull var. <i>vulgaris</i>	Callune commune (var.) [Callune]	I	C	LC						
ERICACEAE	<i>Erica cinerea</i> L.	Bruyère cendrée	I	PC	NT			oui			
ERICACEAE	<i>Erica scoparia</i> L.	Bruyère à balais	E?(I)	(D)	(EX)					B*	
ERICACEAE	<i>Erica tetralix</i> L.	Bruyère quaternée	I	RR	CR			oui			R
ERICACEAE	<i>Erica vagans</i> L.	Bruyère vagabonde	I	D	EX			(oui)			(R)
ERICACEAE	<i>Gaultheria shallon</i> Pursh	Gaulthérie shallon	C(NS)	E?	H	j	?				
ERICACEAE	<i>Rhododendron ponticum</i> L.	Rhododendron pontique	C(NS)	RR	H	j	AC		P		
ERICACEAE	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Airelle myrtille [Myrtille]	I	PC	LC					C0	
ERICACEAE	<i>Vaccinium oxycoccos</i> L.	Airelle canneberge [Canneberge]	I	E	CR			oui		R1;C0	R
ERICACEAE	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	Airelle ponctuée	I	E	CR			oui		R1;C0	R
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.	Euphorbe des bois (s.l.)	I	CC	LC						
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L. subsp. <i>amygdaloides</i>	Euphorbe des bois	I	CC	LC						
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia chamaesyce</i> L.	Euphorbe petit-figuier	N	E	H						
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	Euphorbe petit-cyprès [Tithymale]	I	PC	LC						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia dulcis</i> L.	Euphorbe douce (s.l.)	I	AR	LC						
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia dulcis</i> L. subsp. <i>incompta</i> (Cesati) Nyman	Euphorbe pourprée	I	AR	LC						
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia esula</i> L.	Euphorbe ésule (s.l.)	I	R	NT			oui			
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia esula</i> L. subsp. <i>esula</i>	Euphorbe ésule [Ésule]	E?(I?)	(?)	(NE)						
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia esula</i> L. subsp. <i>pinifolia</i> (DC.) P. Fourn.	Euphorbe à feuilles de pin	E?(I)	(RR?)	(DD)						
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia esula</i> L. subsp. <i>tristis</i> (Besser ex Bieb.) Rouy	Euphorbe sombre	I	R	NT			oui			
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia exigua</i> L.	Euphorbe fluette [Petite ésule]	I	AC?	DD						
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia falcata</i> L.	Euphorbe en faux	A	D	H						
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbe réveil-matin [Réveil-matin]	I	C	LC						
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia humifusa</i> Willd.	Euphorbe couchée	A	E	H						
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia lathyris</i> L.	Euphorbe épurge [Épurge]	N(AC)	AR?	H	j	PC				
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia maculata</i> L.	Euphorbe tachée	N	E	H						
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia palustris</i> L.	Euphorbe des marais	I(C)	R	EN	j	E	oui			R
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia paralias</i> L.	Euphorbe maritime	I	E	EN			oui			R
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia peplus</i> L.	Euphorbe des jardins [Ésule ronde]	I	C	LC						
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia platyphyllos</i> L.	Euphorbe à larges feuilles	I	E	CR			oui			R
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia seguieriana</i> Neck.	Euphorbe de Séguier	I	R	NT			oui			
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia stricta</i> L.	Euphorbe raide	I	RR	EN			oui			R
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia waldsteinii</i> (Soják) Radcliffe-Smith	Euphorbe de Waldstein	??	??	??						
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia x pseudovirgata</i> (Schur) Soó	Euphorbe fausse-baguette	E?(N)	(?)	(H)						
EUPHORBIACEAE	<i>Mercurialis annua</i> L.	Mercuriale annuelle	I	C	LC						
EUPHORBIACEAE	<i>Mercurialis perennis</i> L.	Mercuriale vivace	I	C	LC						
FABACEAE	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	Anthyllide vulnéraire (s.l.) [Vulnéraire]	I	PC	LC						
FABACEAE	<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>carpatica</i> (Pant.) Nyman	Anthyllide des Carpathes	??	??	??						
FABACEAE	<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>iberica</i> (W. Beck.) Jalas ex Cullen	Anthyllide ibérique	E?(I)	(E?)	(DD)						
FABACEAE	<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>praepropera</i> (A. Kerner) Bornm.	Anthyllide de Dillenius	E								
FABACEAE	<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>pseudovulneraria</i> (Sagorski) J. Duvigneaud	Anthyllide fausse-vulnéraire	I	?	DD						
FABACEAE	<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>vulneraria</i>	Anthyllide vulnéraire	I	?	DD						
FABACEAE	<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>vulneraria</i> var. <i>langei</i> Jalás	Anthyllide vulnéraire (var.)	I	?	DD						
FABACEAE	<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>vulneraria</i> var. <i>vulneraria</i>	Anthyllide vulnéraire (var.)	I	?	DD						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
FABACEAE	<i>Astragalus cicer</i> L.	Astragale pois-chiche	A	D	H						
FABACEAE	<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	Astragale à feuilles de réglisse [Réglisse sauvage]	I	R	LC			oui			
FABACEAE	<i>Astragalus monspessulanus</i> L.	Astragale de Montpellier	I	RR	VU			oui			R
FABACEAE	<i>Colutea arborescens</i> L.	Baguenaudier arbuste (s.l.) [Baguenaudier ; Arbre à vessies]	C(N?S)	?	H	pj	CC?				
FABACEAE	<i>Colutea arborescens</i> L. subsp. <i>gallica</i> Browicz	Baguenaudier de France [Baguenaudier ; Arbre à vessies]	C(N?S)	?	H	pj	CC?				
FABACEAE	<i>Colutea ×media</i> Willd. [<i>Colutea arborescens</i> L. × <i>Colutea orientalis</i> Mill.]	Baguenaudier intermédiaire	??	??	??						
FABACEAE	<i>Coronilla minima</i> L.	Coronille naine	I	R	NT			oui			
FABACEAE	<i>Cytisus decumbens</i> (Durande) Spach	Cytise rampant	I	D?	EX?			(oui)			(R)
FABACEAE	<i>Cytisus multiflorus</i> (L'Hérit.) Sweet	Cytise blanc	C		H	p(j)	?				
FABACEAE	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Cytise à balais commun [Genêt à balais]	I(C)	C	LC	pj	?				
FABACEAE	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link f. <i>scoparius</i>	Cytise à balais commun (f.) [Genêt à balais]	I(C)	C	LC	pj					
FABACEAE	<i>Cytisus striatus</i> (Hill) Rothm.	Cytise strié	C		H	p	?				
FABACEAE	<i>Dorycnium pentaphyllum</i> Scop.	Badasse à cinq folioles (s.l.)	A	D	H						
FABACEAE	<i>Galega officinalis</i> L.	Galéga officinal [Sainfoin d'Espagne]	N?S?(A?C)	RR?	H	j	?				
FABACEAE	<i>Genista anglica</i> L.	Genêt d'Angleterre	I	E	CR			oui		R1	R
FABACEAE	<i>Genista pilosa</i> L.	Genêt poilu	I	D?	EX?			(oui)			(R)
FABACEAE	<i>Genista tinctoria</i> L.	Genêt des teinturiers (s.l.)	I	PC	LC						Rp
FABACEAE	<i>Genista tinctoria</i> L. subsp. <i>littoralis</i> (Corb.) Rothm.	Genêt littoral	I	E	CR			oui			R
FABACEAE	<i>Genista tinctoria</i> L. subsp. <i>tinctoria</i>	Genêt des teinturiers [Herbe à jaunir]	I	PC	LC						
FABACEAE	<i>Genista tinctoria</i> L. subsp. <i>tinctoria</i> var. <i>tinctoria</i>	Genêt des teinturiers (var.) [Herbe à jaunir]	I	PC	LC						
FABACEAE	<i>Genistella sagittalis</i> (L.) Gams	Génistelle ailée [Lacet]	I	RR	EN			oui			R
FABACEAE	<i>Glycine max</i> (L.) Merrill	Soja cultivé	??	??	??						
FABACEAE	<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Hippocrépide en ombelle	I	AC	LC						
FABACEAE	<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen	Hippocrépide des jardins [Séné-batard ; Faux-séné]	C(NS?)	E	H	j	?				
FABACEAE	<i>Laburnum anagyroides</i> Med.	Aubours faux-ébénier [Faux-ébénier]	NC	PC	H	j(p)	?				
FABACEAE	<i>Lathyrus angulatus</i> L.	Gesse anguleuse	A	D	H						
FABACEAE	<i>Lathyrus aphaca</i> L.	Gesse sans feuilles [Pois de serpent]	I	R	NT			oui			
FABACEAE	<i>Lathyrus cicera</i> L.	Gesse chiche [Jarosse]	C(A?)	D?	H	a	D				
FABACEAE	<i>Lathyrus clymenum</i> L.	Gesse chèvrefeuille (s.l.)	A	D	H						
FABACEAE	<i>Lathyrus clymenum</i> L. subsp. <i>articulatus</i> (L.) Ball	Gesse articulée	A	D	H						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
FABACEAE	<i>Lathyrus hirsutus</i> L.	Gesse hérissée	I	RR	VU			oui			R
FABACEAE	<i>Lathyrus japonicus</i> Willd.		C	D	H	p				[N1p]	[F1(Ep)]
FABACEAE	<i>Lathyrus japonicus</i> Willd. subsp. <i>maritimus</i> (L.) P.W. Ball	Gesse maritime	C	D	H	p				[N1]	[F1(E)]
FABACEAE	<i>Lathyrus latifolius</i> L.	Gesse à larges feuilles [Pois vivace]	N(SC)	AR	H	j	?				
FABACEAE	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler	Gesse des montagnes	I	AR	LC						
FABACEAE	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler var. <i>linifolius</i>	Gesse des montagnes (var.)	I	E?	DD			oui			
FABACEAE	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler var. <i>montanus</i> (Bernh.) Bässler	Gesse des montagnes (var.)	I	AR	LC						
FABACEAE	<i>Lathyrus nissolia</i> L.	Gesse de Nissole	I	RR	EN			oui			R
FABACEAE	<i>Lathyrus palustris</i> L.	Gesse des marais	I	RR	CR			oui		R1	R
FABACEAE	<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Gesse des prés	I	CC	LC						
FABACEAE	<i>Lathyrus sativus</i> L.	Gesse cultivée [Pois carré]	C(SA)	D?	H	a	D?				
FABACEAE	<i>Lathyrus sphaericus</i> Retz.	Gesse sphérique	A	E	H						
FABACEAE	<i>Lathyrus sylvestris</i> L.	Gesse des bois [Gesse sauvage]	I	AR	LC						
FABACEAE	<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	Gesse tubéreuse [Gland de terre]	I	R	VU			oui			R
FABACEAE	<i>Lens culinaris</i> Med.	Lentille culinaire [Lentille]	C(SA)	D?	H	a	RR?				
FABACEAE	<i>Lotus angustissimus</i> L.	Lotier étroit	I	D	EX			(oui)			(R)
FABACEAE	<i>Lotus corniculatus</i> L.	Lotier corniculé (s.l.)	I(NC)	CC	LC	p	AC?				
FABACEAE	<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé [Pied-de-poule]	I(NC)	CC	LC	p	AC?				
FABACEAE	<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>tenuis</i> (Waldst. et Kit. ex Willd.) Berher	Lotier à feuilles ténues	I	RR?	DD			oui			
FABACEAE	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	Lotier des fanges	I	AC	LC						
FABACEAE	<i>Lupinus luteus</i> L.	Lupin jaune	??	??	??						
FABACEAE	<i>Lupinus polyphyllus</i> Lindl.	Lupin vivace	??	??	??						
FABACEAE	<i>Lupinus ×regalis</i> Bergm. [<i>Lupinus arboreus</i> Sims × <i>Lupinus polyphyllus</i> Lindl.]	Lupin royal	C(S)	?	H	j	?				
FABACEAE	<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds.	Luzerne tachée	I	AC	LC						
FABACEAE	<i>Medicago falcata</i> L.	Luzerne en faux [Luzerne jaune]	I(A?)	RR	VU			oui			R
FABACEAE	<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline [Minette ; Mignonnette]	I(C)	CC	LC	a	D?				
FABACEAE	<i>Medicago lupulina</i> L. var. <i>lupulina</i>	Luzerne lupuline (var.) [Minette ; Mignonnette]	I(C?)	CC	LC	a	??				
FABACEAE	<i>Medicago lupulina</i> L. var. <i>willdenowiana</i> Koch	Luzerne lupuline (var.) [Minette ; Mignonnette]	I(C?)	?	DD	a	??				
FABACEAE	<i>Medicago minima</i> (L.) L.	Luzerne naine	I	RR	EN			oui			R
FABACEAE	<i>Medicago orbicularis</i> (L.) Bartal.	Luzerne orbiculaire	A	D	H						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
FABACEAE	<i>Medicago polymorpha</i> L.	Luzerne polymorphe	I	?	DD						
FABACEAE	<i>Medicago rigidula</i> (L.) All.	Luzerne raide	A?	D	H						
FABACEAE	<i>Medicago sativa</i> L.	Luzerne cultivée	N(SC)	AC?	H	af	AC?				
FABACEAE	<i>Medicago turbinata</i> (L.) All.	Luzerne toupie	E								
FABACEAE	<i>Medicago ×varia</i> Martyn [<i>Medicago falcata</i> L. <i>Medicago sativa</i> L.]	Luzerne bâtarde	N	RR?	H						
FABACEAE	<i>Melilotus albus</i> Med.	Méililot blanc	I	PC?	DD						
FABACEAE	<i>Melilotus altissimus</i> Thuill.	Méililot élevé [Grand méililot]	I	?	DD						
FABACEAE	<i>Melilotus indicus</i> (L.) All.	Méililot à petites fleurs	A	E?	H						
FABACEAE	<i>Melilotus officinalis</i> Lam.	Méililot officinal	I	AC?	DD						
FABACEAE	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	Esparcette à feuilles de vesce [Sainfoin]	Z(NSC)	?	ZDD	ap	?				
FABACEAE	<i>Ononis alopecuroides</i> L.	Bugrane queue de renard	A	D	H						
FABACEAE	<i>Ononis natrix</i> L.	Bugrane gluante [Coqsigrue]	I	R	VU			oui			R
FABACEAE	<i>Ononis pusilla</i> L.	Bugrane naine	I	R	VU			oui		R1	R
FABACEAE	<i>Ononis repens</i> L.	Bugrane rampante [Arrête-bœuf]	I	AC	LC						
FABACEAE	<i>Ononis repens</i> L. var. <i>procurrens</i> (Wallr.) Grintescu	Bugrane rampante (var.) [Arrête-bœuf]	I	AC	LC						
FABACEAE	<i>Ononis repens</i> L. var. <i>repens</i>	Bugrane rampante (var.) [Arrête-bœuf]	??	??	??						
FABACEAE	<i>Ononis spinosa</i> L.	Bugrane épineuse	I	RR?	DD			oui			
FABACEAE	<i>Ornithopus compressus</i> L.	Ornithope comprimé	A	D	H						
FABACEAE	<i>Ornithopus perpusillus</i> L.	Ornithope délicat [Pied-d'oiseau]	I	R	VU			oui			R
FABACEAE	<i>Phaseolus coccineus</i> L.	Haricot d'Espagne	C		H	a	?				
FABACEAE	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Haricot commun [Haricot]	C		H	a	CC				
FABACEAE	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. var. <i>nanus</i> (L.) Aschers.	Haricot commun (var.)	C		H	a	CC				
FABACEAE	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. var. <i>vulgaris</i>	Haricot commun (var.)	C		H	a	AC				
FABACEAE	<i>Pisum sativum</i> L.	Pois cultivé	C(S)	?	H	a	CC				
FABACEAE	<i>Pisum sativum</i> L. var. <i>arvense</i> (L.) Poiret	Pois cultivé (var.) [Pois des champs ; Pois gris ; Pois de pigeon]	S(C)	?	H	a	?				
FABACEAE	<i>Pisum sativum</i> L. var. <i>sativum</i>	Pois cultivé (var.)	C(S)	?	H	a	CC				
FABACEAE	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier faux-acacia	NC	C	H	sp(j)	AC?		A		
FABACEAE	<i>Scorpiurus muricatus</i> L.	Scorpiure muriqué (s.l.)	??	??	??						
FABACEAE	<i>Scorpiurus muricatus</i> L. subsp. <i>muricatus</i>	Scorpiure muriqué	??	??	??						
FABACEAE	<i>Scorpiurus muricatus</i> L. subsp. <i>subvillosus</i> (L.) Thell.	Scorpiure velu	??	??	??						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
FABACEAE	<i>Scorpiurus muricatus</i> L. subsp. <i>sulcatus</i> (L.) Thell.	Scorpiure sillonné	??	??	??						
FABACEAE	<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	Sécurigère bigarrée [Coronille bigarrée]	I(N)	RR	NT			oui			
FABACEAE	<i>Spartium junceum</i> L.	Spartier jonciforme [Genêt d'Espagne]	C(NS)	?	H	p	?				
FABACEAE	<i>Tetragonolobus maritimus</i> (L.) Roth	Téragonolobe siliquieux	I	RR	VU			oui			R
FABACEAE	<i>Tetragonolobus maritimus</i> (L.) Roth var. <i>hirsutus</i> (Willk.) Muñoz Gamendia et Pedrol	Téragonolobe siliquieux (var.)	I	RR	VU			oui			R
FABACEAE	<i>Tetragonolobus purpureus</i> Moench	Téragonolobe pourpre	A	D	H						[F1(V)]
FABACEAE	<i>Trifolium arvense</i> L.	Trèfle des champs [Pied-de-lièvre]	I	R?	DD						
FABACEAE	<i>Trifolium aureum</i> Pollich	Trèfle doré	E?(A?)	(D)	(H)						
FABACEAE	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Trèfle champêtre	I	AC	LC						
FABACEAE	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Trèfle douteux	I	C	LC						
FABACEAE	<i>Trifolium fragiferum</i> L.	Trèfle fraise	I	PC	LC						
FABACEAE	<i>Trifolium glomeratum</i> L.	Trèfle aggloméré	I?(A)	E	NE						
FABACEAE	<i>Trifolium hybridum</i> L.	Trèfle hybride (s.l.)	NA(SC)	?	H	af	?				
FABACEAE	<i>Trifolium hybridum</i> L. subsp. <i>elegans</i> (Savi) Aschers. et Graebn.	Trèfle élégant	N(A?)	?	H						
FABACEAE	<i>Trifolium hybridum</i> L. subsp. <i>hybridum</i>	Trèfle hybride	NA(SC)	?	H	af	?				
FABACEAE	<i>Trifolium incarnatum</i> L.	Trèfle incarnat	C(SA?)	?	H	f	R?				
FABACEAE	<i>Trifolium medium</i> L.	Trèfle intermédiaire	I	R	NT			oui			
FABACEAE	<i>Trifolium micranthum</i> Viv.	Trèfle à petites fleurs	I	E?	DD			oui			
FABACEAE	<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds.	Trèfle jaunâtre	I(A)	E(D?,E)	EX?			(oui)			(R)
FABACEAE	<i>Trifolium patens</i> Schreb.	Trèfle étalé	I	D	EX			(oui)			(R)
FABACEAE	<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés	I(NSC)	CC	LC	afp	C?				
FABACEAE	<i>Trifolium pratense</i> L. var. <i>pratense</i>	Trèfle des prés (var.)	I(NSC)	CC	LC	afp	C?				
FABACEAE	<i>Trifolium pratense</i> L. var. <i>villosum</i> Wahlenb.		I	R	LC			oui			
FABACEAE	<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle rampant [Trèfle blanc]	I(NSC)	CC	LC	afp	C?				
FABACEAE	<i>Trifolium resupinatum</i> L.	Trèfle renversé	C(SA)	?	H	f	?				
FABACEAE	<i>Trifolium resupinatum</i> L. var. <i>majus</i> Boiss.	Trèfle renversé (var.)	??	??	??						
FABACEAE	<i>Trifolium resupinatum</i> L. var. <i>resupinatum</i>	Trèfle renversé (var.)	??	??	??						
FABACEAE	<i>Trifolium scabrum</i> L.	Trèfle scabre	I	RR?	DD			oui			
FABACEAE	<i>Trifolium squamosum</i> L.	Trèfle maritime	I	E	CR			oui			R
FABACEAE	<i>Trifolium squarrosum</i> L.	Trèfle rude	A	D	H						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
FABACEAE	<i>Trifolium striatum</i> L.	Trèfle strié	I	RR	EN			oui			R
FABACEAE	<i>Trifolium subterraneum</i> L.	Trèfle souterrain	I	E	CR			oui			R
FABACEAE	<i>Trigonella caerulea</i> (L.) Seringe	Trigonelle bleue	A	D	H						
FABACEAE	<i>Ulex europaeus</i> L.	Ajonc d'Europe	I(NC)	C	LC	p	?				
FABACEAE	<i>Ulex gallii</i> Planch.	Ajonc de Le Gall	I	E	CR			oui		R1	R
FABACEAE	<i>Ulex minor</i> Roth	Ajonc nain	I	R	EN			oui			R
FABACEAE	<i>Ulex europaeus</i> L. × <i>U. gallii</i> Planch.		??	??	??						
FABACEAE	<i>Vicia articulata</i> Hornem.	Vesce articulée	A	D	H						
FABACEAE	<i>Vicia cracca</i> L.	Vesce à épis	I	CC	LC						
FABACEAE	<i>Vicia ervilia</i> (L.) Willd.	Vesce ervilier	A	D	H						
FABACEAE	<i>Vicia faba</i> L.	Vesce fève [Féverolle ; Fève des marais]	C(A)	?	H	a	PC				
FABACEAE	<i>Vicia grandiflora</i> Scop.	Vesce à grandes fleurs	A	D	H						
FABACEAE	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) S.F. Gray	Vesce hérissée	I	C	LC						
FABACEAE	<i>Vicia hybrida</i> L.	Vesce hybride	A	D	H						
FABACEAE	<i>Vicia lathyroides</i> L.	Vesce fausse-gesse	I	E	CR			oui			R
FABACEAE	<i>Vicia lutea</i> L.	Vesce jaune	I	RR?	DD			oui			
FABACEAE	<i>Vicia melanops</i> Smith	Vesce noirâtre	A	D	H						[F1(V)]
FABACEAE	<i>Vicia narbonensis</i> L.	Vesce de Narbonne	A	D	H						
FABACEAE	<i>Vicia pannonica</i> Crantz	Vesce de Pannonie (s.l.)	A	E	H						
FABACEAE	<i>Vicia pannonica</i> Crantz subsp. <i>pannonica</i>	Vesce de Pannonie	A	E	H						
FABACEAE	<i>Vicia pannonica</i> Crantz subsp. <i>striata</i> (Bieb.) Nyman	Vesce purpurine	A	D	H						
FABACEAE	<i>Vicia peregrina</i> L.	Vesce voyageuse	A	D	H						
FABACEAE	<i>Vicia sativa</i> L.	Vesce cultivée (s.l.)	I(SAC)	CC	LC	a	R				
FABACEAE	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.	Vesce à folioles étroites	I	AR?	DD						
FABACEAE	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Vesce cultivée	SA(C)	?	H	a	?				
FABACEAE	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>segetalis</i> (Thuill.) Gaudin	Vesce des moissons	I	CC	LC						
FABACEAE	<i>Vicia sepium</i> L.	Vesce des haies [Vesce sauvage]	I	CC	LC						
FABACEAE	<i>Vicia sepium</i> L. var. <i>maritimum</i> Liger	Vesce des haies (var.)	I	E?	DD			oui			
FABACEAE	<i>Vicia sepium</i> L. var. <i>sepium</i>	Vesce des haies (var.) [Vesce sauvage]	I	CC	LC						
FABACEAE	<i>Vicia serratifolia</i> Jacq.	Vesce à feuilles dentées	A	D	H						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
FABACEAE	<i>Vicia tenuifolia</i> Roth	Vesce à feuilles ténues	I	D?	EX?			(oui)			(R)
FABACEAE	<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.	Vesce à quatre graines (s.l.)	I	AC	LC						
FABACEAE	<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb. subsp. <i>gracilis</i> (DC.) Hook. f.	Vesce grêle	I	E?	DD			oui			
FABACEAE	<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb. subsp. <i>tetrasperma</i>	Vesce à quatre graines	I	AC	LC						
FABACEAE	<i>Vicia villosa</i> Roth	Vesce velue (s.l.)	I	RR?	DD			oui			(Rp)
FABACEAE	<i>Vicia villosa</i> Roth subsp. <i>varia</i> (Host) Corb.	Vesce bigarrée	I	D?	EX?			(oui)			(R)
FABACEAE	<i>Vicia villosa</i> Roth subsp. <i>villosa</i>	Vesce velue	I	RR?	DD			oui			
FAGACEAE	<i>Castanea sativa</i> Mill.	Châtaignier commun [Châtaignier]	ZC(S)	AC	ZLC	s(ap)	PC?				
FAGACEAE	<i>Fagus sylvatica</i> L.	Hêtre commun [Hêtre]	I(NC)	CC	LC	spj	PC				
FAGACEAE	<i>Fagus sylvatica</i> L. f. <i>purpurea</i> (Ait.) C.K. Schneider	Hêtre commun (f.) [Hêtre pourpre]	C	?	H	pj	AR				
FAGACEAE	<i>Fagus sylvatica</i> L. f. <i>sylvatica</i>	Hêtre commun (f.) [Hêtre]	I(NC)	CC	LC	spj	PC				
FAGACEAE	<i>Quercus cerris</i> L.	Chêne chevelu	C		H	j(j)	?				
FAGACEAE	<i>Quercus palustris</i> Muenchh.	Chêne des marais	C		H	p	?				
FAGACEAE	<i>Quercus petraea</i> Lieblein	Chêne sessile [Rouvre]	I(NC)	C	LC	sp	PC				
FAGACEAE	<i>Quercus pubescens</i> Willd.	Chêne pubescent	I	AR	LC						
FAGACEAE	<i>Quercus pyrenaica</i> Willd.	Chêne tauzin [Chêne noir]	C		H	pj	?				
FAGACEAE	<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	I(NC)	CC	LC	sp	PC				
FAGACEAE	<i>Quercus rubra</i> L.	Chêne rouge	C	?	H	s(pj)	?				
FAGACEAE	<i>Quercus ×calvescens</i> Vukot. [<i>Quercus petraea</i> Lieblein × <i>Quercus pubescens</i> Willd.]	Chêne calvescent	I	?	H						
FAGACEAE	<i>Quercus ×kernerii</i> Simonk. [<i>Quercus pubescens</i> Willd. × <i>Quercus robur</i> L.]	Chêne de Kerner	I	?	H						
FAGACEAE	<i>Quercus ×rosacea</i> Bechst. [<i>Quercus petraea</i> Lieblein × <i>Quercus robur</i> L.]	Chêne rosacé	I	?	H						
FRANKENIACEAE	<i>Frankenia laevis</i> L.	Frankénie lisse	I	D	EX			(oui)			(R)
FUMARIACEAE	<i>Ceratocarpus claviculata</i> (L.) Lidén	Cératocarpus à vrilles [Corydale à vrilles]	I	E	EN			oui			R
FUMARIACEAE	<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv.	Corydale solide	I	E	CR			oui		R1	R
FUMARIACEAE	<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv. var. <i>solida</i>	Corydale solide (var.)	I	E	CR			oui		R1	R
FUMARIACEAE	<i>Fumaria bastardii</i> Boreau	Fumeterre de Bastard	E?(I?)	(D)	(NE)						
FUMARIACEAE	<i>Fumaria capreolata</i> L.	Fumeterre grimpante	I(A)	RR	EN			oui			R
FUMARIACEAE	<i>Fumaria densiflora</i> DC.	Fumeterre à fleurs denses	I	E?	DD			oui			
FUMARIACEAE	<i>Fumaria muralis</i> Sond. ex Koch	Fumeterre des murailles (s.l.)	I	E?	DD			oui			
FUMARIACEAE	<i>Fumaria muralis</i> Sond. ex Koch subsp. <i>boraiei</i> (Jord.) Pugsley	Fumeterre de Boreau	I	E?	DD			oui			

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
FUMARIACEAE	<i>Fumaria muralis</i> Sond. ex Koch subsp. <i>muralis</i>	Fumeterre des murailles	??	??	??						
FUMARIACEAE	<i>Fumaria officinalis</i> L.	Fumeterre officinale (s.l.)	I	C?	DD						
FUMARIACEAE	<i>Fumaria officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>	Fumeterre officinale	I	C?	DD						
FUMARIACEAE	<i>Fumaria officinalis</i> L. subsp. <i>wirtgenii</i> (Koch) Arcang.	Fumeterre de Wirtgen	I	?	DD						
FUMARIACEAE	<i>Fumaria parviflora</i> Lam.	Fumeterre à petites fleurs	I	E	CR			oui			R
FUMARIACEAE	<i>Fumaria vaillantii</i> Loisel.	Fumeterre de Vaillant	I	E	CR			oui			R
FUMARIACEAE	<i>Pseudofumaria lutea</i> (L.) Borkh.	Fausse-fumeterre jaune	Z(C)	RR?	ZDD	j	?	oui			
GENTIANACEAE	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds.	Chlore perfoliée	I	PC	LC						
GENTIANACEAE	<i>Centaurium erythraea</i> Rafn	Érythrée petite-centaurée	I	AC	LC						
GENTIANACEAE	<i>Centaurium pulchellum</i> (Swartz) Druce	Érythrée élégante	I	R	VU			oui			R
GENTIANACEAE	<i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre	Cicendie filiforme	I	D?	EX?			(oui)			(R)
GENTIANACEAE	<i>Gentiana cruciata</i> L.	Gentiane croisetie	I(C)	E	CR	p	E	oui			R
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> L.	Gentiane jaune	N?(C)	D?	H	a	D?			H5;C0	
GENTIANACEAE	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	Gentiane pneumonanthe	I	D	EX			(oui)			(R)
GENTIANACEAE	<i>Gentianella amarella</i> (L.) Börner	Gentianelle amère	I	D	EX			(oui)		N1	(R)
GENTIANACEAE	<i>Gentianella campestris</i> (L.) Börner	Gentianelle champêtre	I	D	EX			(oui)			(R)
GENTIANACEAE	<i>Gentianella ciliata</i> (L.) Borkh.	Gentianelle ciliée	E?(I?)	(D?)	(NE)						
GENTIANACEAE	<i>Gentianella germanica</i> (Willd.) Börner	Gentianelle d'Allemagne	I	PC	LC						
GERANIACEAE	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hérit.	Érodion à feuilles de ciguë (s.l.)	I	PC	LC						
GERANIACEAE	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hérit. subsp. <i>cutarium</i>	Érodion à feuilles de ciguë	I	PC	LC						
GERANIACEAE	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hérit. subsp. <i>dunense</i> Andreas	Érodion des dunes	??	??	??						
GERANIACEAE	<i>Erodium lebelii</i> Jord.	Érodion glutineux	E?(I)	(?)	(DD)						
GERANIACEAE	<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hérit.	Érodion musqué	I?A	E	NE						
GERANIACEAE	<i>Geranium columbinum</i> L.	Géranium colombin	I	AC	LC						
GERANIACEAE	<i>Geranium dissectum</i> L.	Géranium découpé	I	CC	LC						
GERANIACEAE	<i>Geranium endressii</i> J. Gay	Géranium d'Endress	C(S)	E	H	j	AC?			[N1]	
GERANIACEAE	<i>Geranium lucidum</i> L.	Géranium luisant	I	E	CR			oui			R
GERANIACEAE	<i>Geranium molle</i> L.	Géranium mou	I	CC	LC						
GERANIACEAE	<i>Geranium molle</i> L. var. <i>aequale</i> Bab.	Géranium mou (var.)	??	??	??						
GERANIACEAE	<i>Geranium molle</i> L. var. <i>molle</i>	Géranium mou (var.)	I	CC	LC						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
GERANIACEAE	<i>Geranium phaeum</i> L.	Géranium livide	NS(C)	?	H	pj	?				
GERANIACEAE	<i>Geranium pratense</i> L.	Géranium des prés	C(NS)	E?	H	j(p)	{E,?}				
GERANIACEAE	<i>Geranium purpureum</i> Vill.	Géranium pourpre	I	E?	DD			oui			
GERANIACEAE	<i>Geranium pusillum</i> L.	Géranium fluet	I	AC	LC						
GERANIACEAE	<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm. f.	Géranium des Pyrénées	Z	AC	ZLC						
GERANIACEAE	<i>Geranium robertianum</i> L.	Géranium herbe-à-Robert (s.l.)	I	CC	LC						
GERANIACEAE	<i>Geranium robertianum</i> L. subsp. <i>robertianum</i>	Géranium herbe-à-Robert [Herbe à Robert]	I	CC	LC						
GERANIACEAE	<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Géranium à feuilles rondes	I	PC	LC						
GERANIACEAE	<i>Geranium sanguineum</i> L.	Géranium sanguin	I(C)	RR	VU	pj	{E,?}	oui			R
GERANIACEAE	<i>Geranium sylvaticum</i> L.	Géranium des forêts	I(NC)	E{D,E}	EX	j	?	(oui)			(R)
GERANIACEAE	<i>Geranium oxonianum</i> Yeo [<i>Geranium endressii</i> J. Gay × <i>Geranium versicolor</i> L.]	Géranium de Druce	C(N)	E	H	j	?				
GLOBULARIACEAE	<i>Globularia bisnagarica</i> L.	Globulaire ponctuée	I	AR	NT			oui			
GROSSULARIACEAE	<i>Ribes alpinum</i> L.	Groseillier des Alpes	C(NS)	E	H	j	?				
GROSSULARIACEAE	<i>Ribes nigrum</i> L.	Groseillier noir [Cassisier]	C(!?NS)	RR?	NE	a	AC				
GROSSULARIACEAE	<i>Ribes rubrum</i> L.	Groseillier rouge [Groseillier à grappes]	IC(N?S)	AC	LC	a	C				
GROSSULARIACEAE	<i>Ribes uva-crispa</i> L.	Groseillier épineux [Groseillier à maquereaux]	I(SC)	PC	LC	a	PC				
HALORAGACEAE	<i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC.	Myriophylle à fleurs alternes	I	E	CR			oui			R
HALORAGACEAE	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Velloso) Verdc.	Myriophylle du Brésil	??	??	??				[P]		
HALORAGACEAE	<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	Myriophylle en épi	I	PC	LC						
HALORAGACEAE	<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.	Myriophylle verticillé	I	RR	EN			oui			R
HIPPOCASTANACEAE	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Marronnier commun [Marronnier d'Inde]	C(S)	?	H	pj	C				
HIPPURIDACEAE	<i>Hippuris vulgaris</i> L.	Pesse commune [Pesse d'eau]	I	E	CR			oui			R
HYDROCHARITACEAE	<i>Elodea callitrichoides</i> (L.C.M. Rich.) Caspary	Élodée fausse-callitriche	E						P		
HYDROCHARITACEAE	<i>Elodea canadensis</i> Michaux	Élodée du Canada	Z	AR	ZLC				A		
HYDROCHARITACEAE	<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) St John	Élodée de Nuttall	Z	E?	ZDD				A		
HYDROCHARITACEAE	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.	Morène aquatique [Petit nénuphar ; Morène]	I	RR	EN			oui			R
HYDROCHARITACEAE	<i>Lagarosiphon major</i> (Ridley) Moss	Lagarosiphon élevé [Lagarosiphon ; Élodée à feuilles alternes]	??	??	??				[P]		
HYDROCHARITACEAE	<i>Stratiotes aloides</i> L.	Stratiote faux-aloès [Faux-aloès]	N	E	H					R1	
HYDROCHARITACEAE	<i>Vallisneria spiralis</i> L.	Vallisnérie en spirale	N	E	H						
HYDROPHYLLACEAE	<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.	Phacélie à feuilles de tanaïs	C(SA)	?	H	f	PC?				

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
HYPERICACEAE	<i>Hypericum androsaemum</i> L.	Millepertuis androsème [Androsème ; Toute-saine]	I	AR	NT			oui			
HYPERICACEAE	<i>Hypericum calycinum</i> L.	Millepertuis à grandes fleurs	C		H	pj	AC?				
HYPERICACEAE	<i>Hypericum desetangii</i> Lamotte	Millepertuis de Des Etangs	I	AC	LC						
HYPERICACEAE	<i>Hypericum dubium</i> Leers	Millepertuis anguleux	I	AC	LC						
HYPERICACEAE	<i>Hypericum elodes</i> L.	Millepertuis des marais	I	D	EX			(oui)			(R)
HYPERICACEAE	<i>Hypericum hircinum</i> L.	Millepertuis à odeur de bouc	Z	R?	ZDD						
HYPERICACEAE	<i>Hypericum hirsutum</i> L.	Millepertuis hérissé	I	AC	LC						
HYPERICACEAE	<i>Hypericum humifusum</i> L.	Millepertuis couché	I	AC	LC						
HYPERICACEAE	<i>Hypericum maculatum</i> Crantz	Millepertuis taché	E?(I)	(?)	(DD)						
HYPERICACEAE	<i>Hypericum montanum</i> L.	Millepertuis des montagnes	I	RR	EN			oui			R
HYPERICACEAE	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis perforé (s.l.) [Herbe à mille trous]	I	CC	LC						
HYPERICACEAE	<i>Hypericum perforatum</i> L. subsp. <i>perforatum</i>	Millepertuis perforé [Herbe à mille trous]	I	CC	LC						
HYPERICACEAE	<i>Hypericum perforatum</i> L. subsp. <i>veronense</i> (Schränk) Lindb.	Millepertuis de Vérone [Herbe à mille trous]	??	??	??						
HYPERICACEAE	<i>Hypericum pulchrum</i> L.	Millepertuis élégant	I	AC	LC						
HYPERICACEAE	<i>Hypericum tetrapterum</i> Fries	Millepertuis à quatre ailes	I	PC	LC						
HYPERICACEAE	<i>Hypericum ×hidcoteense</i> Hilling ex Geerinck [<i>Hypericum calycinum</i> L. × <i>Hypericum ×cyathiflorum</i> N. Robson]	Millepertuis Hidcote	C		H	pj	C				
HYPERICACEAE	<i>Hypericum ×inodorum</i> Mill. [<i>Hypericum androsaemum</i> L. × <i>Hypericum hircinum</i> L.]	Millepertuis inodore	??	??	??						
IRIDACEAE	<i>Gladiolus communis</i> L.	Glaïeul commun	C(S)	?	H	j	CC				
IRIDACEAE	<i>Iris foetidissima</i> L.	Iris fétide [Glaïeul puant]	I	PC	LC						
IRIDACEAE	<i>Iris germanica</i> L.	Iris d'Allemagne [Flambe]	C(NS)	?	H	j	CC				
IRIDACEAE	<i>Iris pseudacorus</i> L.	Iris faux-acore [Iris jaune ; Iris des marais]	I(C)	AC	LC	pj	?				
IRIDACEAE	<i>Iris pumila</i> L.	Iris nain	C(S?)	?	H	j	?				
IRIDACEAE	<i>Iris sibirica</i> L.	Iris de Sibérie	C		H	p	E				
IRIDACEAE	<i>Sisyrinchium montanum</i> Greene	Sisyrinque des montagnes [Bermudienne]	N	E	H						
JUGLANDACEAE	<i>Juglans regia</i> L.	Noyer royal [Noyer]	C(S)	?	H	a	AC				
JUNCACEAE	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffmann	Jonc à fleurs aiguës	I	PC	LC						
JUNCACEAE	<i>Juncus acutus</i> L.	Jonc aigu	I	D	EX			(oui)			(R)
JUNCACEAE	<i>Juncus ambiguus</i> Guss.	Jonc des grenouilles	I	?	DD						
JUNCACEAE	<i>Juncus articulatus</i> L.	Jonc articulé	I	PC	LC						
JUNCACEAE	<i>Juncus bufonius</i> L.	Jonc des crapauds (s.l.)	I	CC	LC						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
JUNCACEAE	<i>Juncus bufonius</i> L. subsp. <i>bufonius</i>	Jonc des crapauds	I	CC	LC						
JUNCACEAE	<i>Juncus bufonius</i> L. subsp. <i>bufonius</i> var. <i>bufonius</i>	Jonc des crapauds (var.)	I	CC	LC						
JUNCACEAE	<i>Juncus bufonius</i> L. subsp. <i>bufonius</i> var. <i>fasciculatus</i> Koch	Jonc des crapauds (var.)	??	??	??						
JUNCACEAE	<i>Juncus bufonius</i> L. subsp. <i>minutulus</i> Soó	Jonc minuscule	I	?	DD						
JUNCACEAE	<i>Juncus bulbosus</i> L.	Jonc bulbeux (s.l.)	I	R	VU			oui			R
JUNCACEAE	<i>Juncus bulbosus</i> L. subsp. <i>bulbosus</i>	Jonc bulbeux	I	R	VU			oui			R
JUNCACEAE	<i>Juncus bulbosus</i> L. subsp. <i>kochii</i> (F.W. Schultz) Reichg.	Jonc de Koch	E?(I)	(E)	(CR)						
JUNCACEAE	<i>Juncus capitatus</i> Weigel	Jonc capité	I	D	EX			(oui)			(R)
JUNCACEAE	<i>Juncus compressus</i> Jacq.	Jonc comprimé	I	R?	DD						
JUNCACEAE	<i>Juncus conglomeratus</i> L.	Jonc aggloméré	I	PC	LC						
JUNCACEAE	<i>Juncus conglomeratus</i> L. var. <i>conglomeratus</i>	Jonc aggloméré (var.)	I	PC	LC						
JUNCACEAE	<i>Juncus conglomeratus</i> L. var. <i>laxus</i> (G. Beck) Aschers. et Graebn.	Jonc aggloméré (var.)	I	?	DD						
JUNCACEAE	<i>Juncus effusus</i> L.	Jonc épars	I	CC	LC						
JUNCACEAE	<i>Juncus effusus</i> L. var. <i>effusus</i>	Jonc épars (var.)	I	CC	LC						
JUNCACEAE	<i>Juncus effusus</i> L. var. <i>subglomeratus</i> DC.	Jonc épars (var.)	I	?	DD						
JUNCACEAE	<i>Juncus filiformis</i> L.	Jonc filiforme	E?(I)	(D)	(EX)						
JUNCACEAE	<i>Juncus gerardii</i> Loisel.	Jonc de Gérard	I	RR	VU			oui			R
JUNCACEAE	<i>Juncus inflexus</i> L.	Jonc glauque [Jonc des jardiniers]	I(C)	AC	LC	p	?				
JUNCACEAE	<i>Juncus maritimus</i> Lam.	Jonc maritime	I	E	CR			oui			R
JUNCACEAE	<i>Juncus pygmaeus</i> L.C.M. Rich.	Jonc nain	I	D	EX			(oui)			(R)
JUNCACEAE	<i>Juncus squarrosus</i> L.	Jonc rude	I	RR	CR			oui			R
JUNCACEAE	<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank	Jonc à fleurs obtuses	I	R	VU			oui			R
JUNCACEAE	<i>Juncus tenageia</i> L. f.	Jonc des marécages	I	D?	EX?			(oui)			(R)
JUNCACEAE	<i>Juncus tenuis</i> Willd.	Jonc grêle (s.l.)	Z	AC	ZLC						
JUNCACEAE	<i>Juncus tenuis</i> Willd. subsp. <i>dudleyi</i> (Wiegand) P. Fourn.	Jonc de Dudley	??	??	??						
JUNCACEAE	<i>Juncus tenuis</i> Willd. subsp. <i>tenuis</i>	Jonc grêle	Z	AC	ZLC						
JUNCACEAE	<i>Juncus</i> × <i>diffusus</i> Hoppe [<i>Juncus effusus</i> L. × <i>Juncus inflexus</i> L.]	Jonc diffus	??	??	??						
JUNCACEAE	<i>Juncus</i> × <i>surrejanus</i> Druce ex Stace et Lambinon [<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffmann × <i>Juncus articulatus</i> L.]	Jonc du Surrey	??	??	??						
JUNCACEAE	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	Luzule champêtre	I	AC	LC						
JUNCACEAE	<i>Luzula forsteri</i> (Smith) DC.	Luzule de Forster	I	C	LC						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
JUNCACEAE	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej.	Luzule multiflore (s.l.)	I	PC	LC						Rp
JUNCACEAE	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej. subsp. <i>congesta</i> (Thuill.) Arcang.	Luzule ramassée	I	R	VU			oui			R
JUNCACEAE	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej. subsp. <i>multiflora</i>	Luzule multiflore	I	PC	LC						
JUNCACEAE	<i>Luzula pallidula</i> Kirschner	Luzule pâle	E								
JUNCACEAE	<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd.	Luzule poilue	I	AC	LC						
JUNCACEAE	<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin	Luzule des forêts	I	AR	LC						
JUNCACEAE	<i>Luzula ×borreri</i> Bromf. ex Bab. [<i>Luzula forsteri</i> (Smith) DC. × <i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd.]	Luzule de Borrer	I	E?	H						
JUNCACEAE	<i>Luzula ×buchenaui</i> P. Fourn. nom. nud. [<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd. × <i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin]	Luzule de Buchenau	I	E	H						
JUNCAGINACEAE	<i>Triglochin maritima</i> L.	Troscart maritime	I	E	EN			oui			R
JUNCAGINACEAE	<i>Triglochin palustris</i> L.	Troscart des marais	I	E	CR			oui		R1	R
LAMIACEAE	<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy	Acinos des champs (s.l.) [Calament acinos]	I	R	LC			oui			
LAMIACEAE	<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy subsp. <i>arvensis</i>	Acinos des champs	I	R	LC			oui			
LAMIACEAE	<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb.	Bugle petit-pin	I	R	VU			oui			R
LAMIACEAE	<i>Ajuga genevensis</i> L.	Bugle de Genève	I(C)	R	VU	p	E	oui			R
LAMIACEAE	<i>Ajuga pyramidalis</i> L.	Bugle pyramidale	E?(I)	(D)	(EX)						
LAMIACEAE	<i>Ajuga reptans</i> L.	Bugle rampante	I	C	LC						
LAMIACEAE	<i>Ajuga ×hybrida</i> A. Kerner [<i>Ajuga genevensis</i> L. × <i>Ajuga reptans</i> L.]	Bugle hybride	??	??	??						
LAMIACEAE	<i>Ballota nigra</i> L.	Ballote noire (s.l.)	I	PC?	DD						
LAMIACEAE	<i>Ballota nigra</i> L. subsp. <i>meridionalis</i> (Béguinot) Béguinot	Ballote fétide	I	PC?	DD						
LAMIACEAE	<i>Calamintha ascendens</i> Jord.	Calament ascendant	I	R	VU			oui			R
LAMIACEAE	<i>Calamintha menthifolia</i> Host	Calament des bois	I	R?	DD						
LAMIACEAE	<i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi	Calament népète (s.l.)	I	R	VU			oui			R
LAMIACEAE	<i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi subsp. <i>spruneri</i> (Boiss.) Nyman	Calament à petites fleurs	I	R	VU			oui			R
LAMIACEAE	<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Clinopode commun [Grand basilic sauvage]	I	AC	LC						
LAMIACEAE	<i>Galeopsis angustifolia</i> Ehrh. ex Hoffmann	Galéopse à feuilles étroites	I	R	NT			oui			
LAMIACEAE	<i>Galeopsis bifida</i> Boenningh.	Galéopse bifide	I	?	DD						
LAMIACEAE	<i>Galeopsis ladanum</i> L.	Galéopse ladanum	I	E?	DD			oui			
LAMIACEAE	<i>Galeopsis segetum</i> Neck.	Galéopse des moissons	I	E	CR			oui			R
LAMIACEAE	<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	Galéopse tétrahit	I	C	LC						
LAMIACEAE	<i>Galeopsis ×ludwigii</i> Hausskn. [<i>Galeopsis tetrahit</i> L. × <i>Galeopsis bifida</i> Boenningh.]	Galéopse de Ludwig	??	??	??						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
LAMIACEAE	<i>Glechoma hederacea</i> L.	Gléchome lierre-terrestre [Lierre terrestre]	I	CC	LC						
LAMIACEAE	<i>Hyssopus officinalis</i> L.	Hysope officinal	C(N)	D?	H	d	AR?				
LAMIACEAE	<i>Lamium album</i> L.	Lamier blanc [Ortie blanche]	I	CC	LC						
LAMIACEAE	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	Lamier embrassant	I	PC	LC						
LAMIACEAE	<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L.	Lamier jaune (s.l.) [Lamier jaune]	I(NC)	C	LC	j	?				
LAMIACEAE	<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L. subsp. <i>argentatum</i> (Smejkal) J. Duvigneaud	Lamier argenté [Lamier jaune ; Ortie jaune]	C(S)	?	H	j	?				
LAMIACEAE	<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L. subsp. <i>galeobdolon</i>	Lamier jaune [Lamier jaune ; Ortie jaune]	E								
LAMIACEAE	<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L. subsp. <i>montanum</i> (Pers.) Hayek	Lamier des montagnes [Lamier jaune ; Ortie jaune]	I	C	LC						
LAMIACEAE	<i>Lamium hybridum</i> Vill.	Lamier découpé	I	RR	VU			oui			R
LAMIACEAE	<i>Lamium maculatum</i> L.	Lamier taché	N	E	H						
LAMIACEAE	<i>Lamium purpureum</i> L.	Lamier pourpre [Ortie rouge]	I	CC	LC						
LAMIACEAE	<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.	Lavande spic	C(S?)	E	H	j	?				
LAMIACEAE	<i>Lavandula latifolia</i> Med.	Lavande à larges feuilles	N?	E	H						
LAMIACEAE	<i>Leonurus cardiaca</i> L.	Agripaume cardiaque [Agripaume]	N(SC)	E	H	d	RR				
LAMIACEAE	<i>Lycopus europaeus</i> L.	Lycophe d'Europe [Pied-de-loup]	I	AC	LC						
LAMIACEAE	<i>Marrubium vulgare</i> L.	Marrube commun [Marrube blanc]	I	E	EN			oui			R
LAMIACEAE	<i>Melissa officinalis</i> L.	Mélisse officinale [Mélisse]	C(NS)	E?	H	j	?				
LAMIACEAE	<i>Melittis melissophyllum</i> L.	Mélitte à feuilles de mélisse [Mélisse des bois]	I	PC	LC						
LAMIACEAE	<i>Mentha aquatica</i> L.	Menthe aquatique (s.l.)	I	C	LC						
LAMIACEAE	<i>Mentha aquatica</i> L. subsp. <i>aquatica</i>	Menthe aquatique	I	C	LC						
LAMIACEAE	<i>Mentha aquatica</i> L. subsp. <i>ortmanniana</i> (Opiz) Lemke	Menthe d'Ortmann	??	??	??						
LAMIACEAE	<i>Mentha arvensis</i> L.	Menthe des champs (s.l.) [Menthe des champs]	I	PC	LC						
LAMIACEAE	<i>Mentha arvensis</i> L. subsp. <i>austriaca</i> (Jacq.) Briq.	Menthe d'Autriche	I	PC	LC						
LAMIACEAE	<i>Mentha arvensis</i> L. subsp. <i>parietariifolia</i> (J. Beck.) Briq.	Menthe à feuilles de pariétaire	??	??	??						
LAMIACEAE	<i>Mentha longifolia</i> L.	Menthe à longues feuilles	E?(S?)	(D)	(H)						
LAMIACEAE	<i>Mentha pulegium</i> L.	Menthe pouliot [Pouliot]	I	RR	CR			oui			R
LAMIACEAE	<i>Mentha spicata</i> L.	Menthe en épi (s.l.)	C(NS)	?	H	a	?				
LAMIACEAE	<i>Mentha spicata</i> L. subsp. <i>glabrata</i> (Lej. et Court.) Lebeau	Menthe verte	C(NS)	?	H	a	?				
LAMIACEAE	<i>Mentha spicata</i> L. subsp. <i>spicata</i>	Menthe en épi	??	??	??						
LAMIACEAE	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Menthe crépue [Menthe à feuilles rondes]	I	AC	LC						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
LAMIACEAE	<i>Mentha ×carinthiaca</i> Host [<i>Mentha arvensis</i> L. × <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.]	Menthe de Carinthie	??	??	??						
LAMIACEAE	<i>Mentha ×gracilis</i> Sole [<i>Mentha arvensis</i> L. × <i>Mentha spicata</i> L. subsp. <i>glabrata</i> (Lej. et Court.) Lebeau]	Menthe gracile	E?(SC)	(?)	(H)	a	?				
LAMIACEAE	<i>Mentha ×piperita</i> L. [<i>Mentha aquatica</i> L. × <i>Mentha spicata</i> L.]	Menthe poivrée (s.l.)	C(S)	?	H	a	?				
LAMIACEAE	<i>Mentha ×piperita</i> L. nsubsp. <i>piperita</i> [<i>Mentha aquatica</i> L. × <i>Mentha spicata</i> L. subsp. <i>glabrata</i> (Lej. et Court.) Lebeau]	Menthe poivrée	C(S)	?	H	a	?				
LAMIACEAE	<i>Mentha ×smithiana</i> R.A. Graham [<i>Mentha spicata</i> L. subsp. <i>glabrata</i> (Lej. et Court.) Lebeau × <i>Mentha ×verticillata</i> L.]	Menthe de Smith	C(S)	?	H	a	?				
LAMIACEAE	<i>Mentha ×smithiana</i> R.A. Graham var. <i>smithiana</i> [<i>Mentha spicata</i> L. subsp. <i>glabrata</i> (Lej. et Court.) Lebeau × <i>Mentha ×verticillata</i> L.]	Menthe de Smith (var.)	C(S)	?	H	a	?				
LAMIACEAE	<i>Mentha ×verticillata</i> L. [<i>Mentha aquatica</i> L. × <i>Mentha arvensis</i> L.]	Menthe verticillée	I	?	H						
LAMIACEAE	<i>Mentha ×villosa</i> Huds. [<i>Mentha spicata</i> L. × <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.]	Menthe velue (s.l.)	C(NS)	?	H	a	?				
LAMIACEAE	<i>Mentha ×villosa</i> Huds. nsubsp. <i>lamyi</i> (Malinv.) Lebeau [<i>Mentha spicata</i> L. subsp. <i>glabrata</i> (Lej. et Court.) Lebeau × <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.]	Menthe de Lamy	??	??	??						
LAMIACEAE	<i>Mentha ×villosa</i> Huds. nsubsp. <i>villosa</i> [<i>Mentha spicata</i> L. subsp. <i>spicata</i> × <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.]	Menthe velue	C(NS)	?	H	a	?				
LAMIACEAE	<i>Mentha ×villosa</i> Huds. nsubsp. <i>villosa</i> var. <i>alopecuroides</i> (Hull) Briq. [<i>Mentha spicata</i> L. subsp. <i>spicata</i> × <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.]	Menthe velue (var.)	C(NS)	?	H	a	?				
LAMIACEAE	<i>Nepeta cataria</i> L.	Népète chataire [Herbe aux chats]	N(C)	RR	H	j	RR?				
LAMIACEAE	<i>Ocimum basilicum</i> L.	Basilic commun	C		H	a	?				
LAMIACEAE	<i>Origanum vulgare</i> L.	Origan commun (s.l.) [Origan ; Marjolaine sauvage]	I	C	LC						
LAMIACEAE	<i>Origanum vulgare</i> L. subsp. <i>vulgare</i>	Origan commun [Origan ; Marjolaine sauvage]	I	C	LC						
LAMIACEAE	<i>Origanum vulgare</i> L. subsp. <i>vulgare</i> var. <i>prismaticum</i> (Gaudin) Benth.	Origan commun (var.) [Origan ; Marjolaine sauvage]	I	?	DD						
LAMIACEAE	<i>Origanum vulgare</i> L. subsp. <i>vulgare</i> var. <i>vulgare</i>	Origan commun (var.) [Origan ; Marjolaine sauvage]	I	C	LC						
LAMIACEAE	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler	Brunelle à grandes fleurs	I	R	NT			oui			
LAMIACEAE	<i>Prunella laciniata</i> (L.) L.	Brunelle laciniée	I	RR	EN			oui			R
LAMIACEAE	<i>Prunella laciniata</i> (L.) L. f. <i>laciniata</i>	Brunelle laciniée (f.)	I	RR	EN			oui			R
LAMIACEAE	<i>Prunella laciniata</i> (L.) L. f. <i>subintegra</i> (Hamilt.) Ravarut	Brunelle laciniée (f.)	I	?	DD			oui			R
LAMIACEAE	<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunelle commune	I	CC	LC						
LAMIACEAE	<i>Prunella ×intermedia</i> Link [<i>Prunella laciniata</i> (L.) L. × <i>Prunella vulgaris</i> L.]	Brunelle intermédiaire	I	E	H						
LAMIACEAE	<i>Salvia nemorosa</i> L.	Sauge des bois	C(S)	D	H	p	?				
LAMIACEAE	<i>Salvia officinalis</i> L.	Sauge officinale [Sauge]	C(S)	E	H	p	C				
LAMIACEAE	<i>Salvia pratensis</i> L.	Sauge des prés	I	AR	LC						
LAMIACEAE	<i>Salvia sclarea</i> L.	Sauge sclarée [Sclarée ; Orvale]	C(NS)	E	H	j	?				
LAMIACEAE	<i>Salvia verbenaca</i> L.	Sauge verveine	N(I?A?)	RR	NE						
LAMIACEAE	<i>Salvia verticillata</i> L.	Sauge verticillée	A(N?)	D	H						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
LAMIACEAE	<i>Salvia × sylvestris</i> L. [<i>Salvia nemorosa</i> L. × <i>Salvia pratensis</i> L.]	Sauge sauvage	E?(S)	(D)	(H)						
LAMIACEAE	<i>Satureja hortensis</i> L.	Sarriette des jardins	C(S)	D	H	j	AR?				
LAMIACEAE	<i>Scutellaria galericulata</i> L.	Scutellaire toque [Toque]	I	AR	NT			oui			
LAMIACEAE	<i>Scutellaria minor</i> Huds.	Scutellaire naine	I	RR	EN			oui			R
LAMIACEAE	<i>Stachys alpina</i> L.	Épiaire des Alpes	I	PC	LC						
LAMIACEAE	<i>Stachys annua</i> (L.) L.	Épiaire annuelle	I	RR?	DD			oui			
LAMIACEAE	<i>Stachys arvensis</i> (L.) L.	Épiaire des champs	I	AR?	DD						
LAMIACEAE	<i>Stachys byzantina</i> K. Koch	Épiaire de Byzance	C(N?S)	D	H	j	?				
LAMIACEAE	<i>Stachys germanica</i> L.	Épiaire d'Allemagne	I	E	CR			oui			R
LAMIACEAE	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trev.	Épiaire officinale [Bétoine]	I	AC	LC						
LAMIACEAE	<i>Stachys palustris</i> L.	Épiaire des marais [Ortie morte]	I	PC	LC						
LAMIACEAE	<i>Stachys recta</i> L.	Épiaire droite	I	PC	LC						
LAMIACEAE	<i>Stachys recta</i> L. var. <i>recta</i>	Épiaire droite (var.)	I	PC	LC						
LAMIACEAE	<i>Stachys sylvatica</i> L.	Épiaire des forêts [Grande épiaire]	I	CC	LC						
LAMIACEAE	<i>Stachys × ambigua</i> Smith [<i>Stachys palustris</i> L. × <i>Stachys sylvatica</i> L.]	Épiaire ambiguë	I	RR?	H						
LAMIACEAE	<i>Teucrium botrys</i> L.	Germandrée botryde	I	R	VU			oui			R
LAMIACEAE	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	Germandrée petit-chêne (s.l.)	I	PC	LC						
LAMIACEAE	<i>Teucrium chamaedrys</i> L. subsp. <i>germanicum</i> (F. Hermann) Rech. f.	Germandrée d'Allemagne [Germandrée petit-chêne]	I	PC	LC						
LAMIACEAE	<i>Teucrium montanum</i> L.	Germandrée des montagnes	I	PC	LC						
LAMIACEAE	<i>Teucrium scordium</i> L.	Germandrée des marais (s.l.) [Germandrée aquatique]	I	D?	EX?			(oui)			(R)
LAMIACEAE	<i>Teucrium scordium</i> L. subsp. <i>scordium</i>	Germandrée des marais	I	D?	EX?			(oui)			(R)
LAMIACEAE	<i>Teucrium scorodonia</i> L.	Germandrée scorodaine	I	C	LC						
LAMIACEAE	<i>Thymus praecox</i> Opiz	Thym couché (s.l.)	I	AC	LC						
LAMIACEAE	<i>Thymus praecox</i> Opiz subsp. <i>ligusticus</i> (Briq.) Paiva et Salgueiro	Thym occidental	I	?	DD						
LAMIACEAE	<i>Thymus praecox</i> Opiz subsp. <i>praecox</i>	Thym couché	I	AC	LC						
LAMIACEAE	<i>Thymus pulegioides</i> L.	Thym faux-pouliot	I	R?	DD						
LAMIACEAE	<i>Thymus serpyllum</i> L.	Thym serpolet	E?(I)	(?)	(DD)						
LAMIACEAE	<i>Thymus vulgaris</i> L.	Thym commun	C(S)	?	H	a	C				
LAMIACEAE	<i>Thymus × braunii</i> Borbás [<i>Thymus praecox</i> Opiz × <i>Thymus pulegioides</i> L.]	Thym de Braun	??	??	??						
LAMIACEAE	<i>Thymus × citriodorus</i> (Pers.) Schreb. [<i>Thymus pulegioides</i> L. × <i>Thymus vulgaris</i> L.]	Thym à odeur de citron	C(N)	D	H	a	?				

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
LAURACEAE	<i>Laurus nobilis</i> L.	Laurier noble [Laurier sauce]	C		H	j(a)	PC				
LEMNACEAE	<i>Lemna gibba</i> L.	Lenticule gibbeuse	I	R	NT			oui			
LEMNACEAE	<i>Lemna minor</i> L.	Lenticule mineure	I	CC	LC						
LEMNACEAE	<i>Lemna minuta</i> Humb., Bonpl. et Kunth	Lenticule minuscule	N	?	H				P		
LEMNACEAE	<i>Lemna trisulca</i> L.	Lenticule à trois lobes	I	PC?	DD						
LEMNACEAE	<i>Lemna turionifera</i> Landolt	Lenticule à turion	??	??	??				[P]		
LEMNACEAE	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid.	Spirodèle à plusieurs racines	I	R	NT			oui			
LEMNACEAE	<i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Hork. ex Wimm.	Wolffie sans racines	I	RR	NT			oui			
LENTIBULARIACEAE	<i>Pinguicula lusitanica</i> L.	Grassette du Portugal	I	E	EN			oui		R1	R
LENTIBULARIACEAE	<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	Grassette commune	I	D	EX			(oui)			(R)
LENTIBULARIACEAE	<i>Utricularia australis</i> R. Brown	Utriculaire citrine	I	R?	DD			oui		R1	
LENTIBULARIACEAE	<i>Utricularia intermedia</i> Hayne	Utriculaire intermédiaire	I	D?	EX?			(oui)			(R)
LENTIBULARIACEAE	<i>Utricularia minor</i> L.	Utriculaire naine	I	D?	EX?			(oui)			(R)
LENTIBULARIACEAE	<i>Utricularia vulgaris</i> L.	Utriculaire commune	I	R?	DD						
LILIACEAE	<i>Anthericum liliago</i> L.	Phalangère fleur-de-lis	I	D	EX			(oui)			(R)
LILIACEAE	<i>Anthericum ramosum</i> L.	Phalangère rameuse [Herbe à l'araignée]	I(C)	AR	NT	p	E	oui			
LILIACEAE	<i>Asparagus officinalis</i> L.	Asperge officinale (s.l.)	Z(SC)	AR	ZLC	a	R			C0p	
LILIACEAE	<i>Asparagus officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>	Asperge officinale [Asperge]	Z(SC)	AR	ZLC	a	R				
LILIACEAE	<i>Chionodoxa luciliae</i> Boiss.	Chionodoxe de Lucilius	C(N)	E	H	j	?				
LILIACEAE	<i>Colchicum autumnale</i> L.	Colchique d'automne	I	R	NT			oui			
LILIACEAE	<i>Convallaria majalis</i> L.	Muguet de mai [Muguet]	I(C)	AR	LC	j	C			C0	
LILIACEAE	<i>Fritillaria meleagris</i> L.	Fritillaire pintade [Damier]	I(C)	D	EX	p	E	(oui)		C0	(R)
LILIACEAE	<i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L.	Hémérocalle fauve	C(S)	?	H	j	CC				
LILIACEAE	<i>Hyacinthoides hispanica</i> (Mill.) Rothm.	Endymion d'Espagne	C(??)	??	H	j	?				
LILIACEAE	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm.	Endymion penché [Jacinthe des bois]	I(NC)	C	LC	j	PC?			C0	
LILIACEAE	<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W. Schmidt	Maïanthème à deux feuilles	I	E	EN			oui		R1	R
LILIACEAE	<i>Muscari atlanticum</i> Boiss. et Reut.	Muscari à grappe	I(C)	R	NT	j	?	oui			
LILIACEAE	<i>Muscari botryoides</i> (L.) Mill.	Muscari faux-botryde	I	D	EX			(oui)			(R)
LILIACEAE	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	Muscari à toupet	I(C)	AR	LC	j	R?				
LILIACEAE	<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten.	Muscari négligé	I	D?	EX?			(oui)			(R)

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
LILIACEAE	<i>Ornithogalum nutans</i> L.	Ornithogale penché (s.l.)	C(S?)	E	H	j	?				
LILIACEAE	<i>Ornithogalum nutans</i> L. subsp. <i>boucheanum</i> (Aschers.) Hayek	Ornithogale de Bouché	??	??	??						
LILIACEAE	<i>Ornithogalum nutans</i> L. subsp. <i>nutans</i>	Ornithogale penché	??	??	??						
LILIACEAE	<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	Ornithogale des Pyrénées [Asperge des bois]	I	E	CR			oui			R
LILIACEAE	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	Ornithogale en ombelle (s.l.) [Dame d'onze heures]	I(NSC)	AR	LC	j	PC			C0	
LILIACEAE	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L. subsp. <i>campestre</i> Rouy	Ornithogale champêtre [Dame d'onze heures]	I(NSC)	AR	LC	j	PC				
LILIACEAE	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L. subsp. <i>umbellatum</i>	Ornithogale en ombelle [Dame d'onze heures]	I?	?	NE					C0*	
LILIACEAE	<i>Paris quadrifolia</i> L.	Parisette à quatre feuilles	I	PC	LC						
LILIACEAE	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	Sceau-de-Salomon multiflore [Muguet de serpent]	I	C	LC						
LILIACEAE	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	Sceau-de-Salomon odorant	I	R	NT			oui			
LILIACEAE	<i>Polygonatum ×hybridum</i> Brügger [<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All. × <i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce]	Sceau-de-Salomon hybride	I	E?	H						
LILIACEAE	<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Fragon piquant [Petit houx]	I(C)	AC	LC	j	?			H5;C0	
LILIACEAE	<i>Scilla autumnalis</i> L.	Scille d'automne	I	E	CR			oui			R
LILIACEAE	<i>Scilla bifolia</i> L.	Scille à deux feuilles	I(C)	E	EN	j	?	oui		R1	R
LILIACEAE	<i>Simethis planifolia</i> (L.) Gren.	Siméthis à feuilles planes	I	D	EX			(oui)			(R)
LILIACEAE	<i>Tulipa sylvestris</i> L.	Tulipe sauvage (s.l.)	N	E	H					[N1p]	
LILIACEAE	<i>Tulipa sylvestris</i> L. subsp. <i>sylvestris</i>	Tulipe sauvage [Avant-Pâques]	N	E	H					[N1]	
LINACEAE	<i>Linum bienne</i> Mill.	Lin bisannuel	I	E?	DD			oui			
LINACEAE	<i>Linum catharticum</i> L.	Lin purgatif	I	C	LC						
LINACEAE	<i>Linum leonii</i> F.W. Schultz	Lin de Leo	I	E	CR			oui			E(V);R
LINACEAE	<i>Linum perenne</i> L.	Lin vivace	C(S)	D	H	j	D?				
LINACEAE	<i>Linum tenuifolium</i> L.	Lin à feuilles ténues	I	AR	NT			oui			
LINACEAE	<i>Linum usitatissimum</i> L.	Lin cultivé	C(SA)	?	H	i	AC?				
LINACEAE	<i>Radiola linoides</i> Roth	Radiole faux-lin	I	D?	EX?			(oui)			(R)
LOBELIACEAE	<i>Lobelia erinus</i> L.	Lobélie érine	C(S)	?	H	j	AC				
LOBELIACEAE	<i>Lobelia urens</i> L.	Lobélie brûlante	I	E	CR			oui		R1	R
LORANTHACEAE	<i>Viscum album</i> L.	Gui blanc	I	CC	LC					C0	
LYTHRACEAE	<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	Salicaire à feuilles d'hyssope	I	RR	EN			oui			R
LYTHRACEAE	<i>Lythrum portula</i> (L.) D.A. Webb	Salicaire pourpier [Pourpier d'eau]	I	AR?	DD						
LYTHRACEAE	<i>Lythrum salicaria</i> L.	Salicaire commune	I(C)	C	LC	p	?				

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
MALACEAE	<i>Amelanchier lamarckii</i> F.G. Schroeder	Amélanchier d'Amérique	C		H	p	?				
MALACEAE	<i>Amelanchier ovalis</i> Med.	Amélanchier commun	I	R	VU			oui			R
MALACEAE	<i>Amelanchier ovalis</i> Med. subsp. <i>embergeri</i> Favarger et Stearn	Amélanchier d'Emberger	I	R	VU			oui			R
MALACEAE	<i>Cotoneaster bullatus</i> Bois	Cotonéaster boursoufflé	??	??	??						
MALACEAE	<i>Cotoneaster dammeri</i> C.K. Schneider	Cotonéaster de Dammer	??	??	??						
MALACEAE	<i>Cotoneaster dielsianus</i> Pritzel	Cotonéaster de Diels	??	??	??						
MALACEAE	<i>Cotoneaster franchetii</i> Bois	Cotonéaster de Franchet	C(S)	E?	H	j	?				
MALACEAE	<i>Cotoneaster hjelmqvistii</i> Flinck et Hylmö	Cotonéaster d'Hjelmvist	??	??	??						
MALACEAE	<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decaisne	Cotonéaster horizontal	C(NS)	RR?	H	j	CC				
MALACEAE	<i>Cotoneaster lacteus</i> W.W. Smith	Cotonéaster laiteux	C(S)	?	H	j	?				
MALACEAE	<i>Cotoneaster rehderi</i> Pojark	Cotonéaster de Rehder	??	??	??						
MALACEAE	<i>Cotoneaster salicifolius</i> Franch.	Cotonéaster à feuilles de saule	C(S)	?	H	j	?				
MALACEAE	<i>Cotoneaster simonsii</i> Baker	Cotonéaster de l'Himalaya	??	??	??						
MALACEAE	<i>Cotoneaster ×watereri</i> Exell	Cotonéaster de Waterer	C(S)	E?	H	j	?				
MALACEAE	<i>Crataegus laevigata</i> (Poirot) DC.	Aubépine à deux styles (s.l.)	I(NC)	AC	LC	p	?				
MALACEAE	<i>Crataegus laevigata</i> (Poirot) DC. subsp. <i>laevigata</i>	Aubépine à deux styles	I(NC)	AC	LC	p	?				
MALACEAE	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style	I(NC)	CC	LC	pj	AR				
MALACEAE	<i>Crataegus rhipidophylla</i> Gandoger	Aubépine à grands calices	I	?	DD						
MALACEAE	<i>Crataegus rhipidophylla</i> Gandoger var. <i>lindmanii</i> (Hrabetová-Uhrová) K.I. Christens.	Aubépine à grands calices (var.)	??	??	??						
MALACEAE	<i>Crataegus rhipidophylla</i> Gandoger var. <i>rhipidophylla</i>	Aubépine à grands calices (var.)	I	?	DD						
MALACEAE	<i>Crataegus ×media</i> Bechst. [<i>Crataegus laevigata</i> (Poirot) DC. × <i>Crataegus monogyna</i> Jacq.]	Aubépine intermédiaire	I	?	H						
MALACEAE	<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	Cognassier commun [Cognassier]	C		H	a	R?				
MALACEAE	<i>Malus sylvestris</i> (L.) Mill.	Pommier sauvage (s.l.)	IC(N?S)	PC?	DD	a	CC				
MALACEAE	<i>Malus sylvestris</i> (L.) Mill. subsp. <i>mitis</i> (Wallr.) Mansf.	Pommier commun	C(N?S)	?	H	a	CC				
MALACEAE	<i>Malus sylvestris</i> (L.) Mill. subsp. <i>sylvestris</i>	Pommier sauvage	I	AR?	DD						
MALACEAE	<i>Mespilus germanica</i> L.	Néflier d'Allemagne [Néflier]	Z(C)	AC	ZLC	a	?				
MALACEAE	<i>Pyracantha coccinea</i> Roem.	Pyracanthé écarlate [Buisson ardent]	C(S)	RR?	H	pj	CC				
MALACEAE	<i>Pyrus communis</i> L.	Poirier commun (s.l.)	IC(S)	{R,?}	NT	a	C	oui			
MALACEAE	<i>Pyrus communis</i> L. subsp. <i>communis</i>	Poirier commun [Poirier cultivé]	C(S)	?	H	a	C				
MALACEAE	<i>Pyrus communis</i> L. subsp. <i>pyraster</i> (L.) Ehrh.	Poirier poirasse [Poirier sauvage]	I	R	NT			oui			

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
MALACEAE	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Sorbier alouchier [Alouchier]	I(C)	E	CR	pj	?	oui		R1	Rp
MALACEAE	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz var. <i>aria</i>	Sorbier alouchier (var.) [Alouchier]	I(C)	E	CR	pj	?	oui			R
MALACEAE	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz var. <i>majestica</i> (Lavallée ex Dippel) C.K. Schneider	[Alouchier]	C		H	pj	?				
MALACEAE	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Sorbier des oiseleurs (s.l.)	I	AC	LC						
MALACEAE	<i>Sorbus aucuparia</i> L. subsp. <i>aucuparia</i>	Sorbier des oiseleurs	I	AC	LC						
MALACEAE	<i>Sorbus domestica</i> L.	Sorbier domestique [Cormier]	C(N)	?	H	j(p)	RR?				
MALACEAE	<i>Sorbus latifolia</i> (Lam.) Pers.	Sorbier à larges feuilles [Alisier de Fontainebleau]	I(C)	RR	CR	p	?	oui		N1	R
MALACEAE	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Sorbier alisier [Alisier]	I	PC	LC						
MALACEAE	<i>Sorbus ×thuringiaca</i> (Ilse) Fritsch [<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz × <i>Sorbus aucuparia</i> L.]	Sorbier de Thuringe	C(S)	E	H	j	?				
MALACEAE	<i>Sorbus ×vagensis</i> Wilmott [<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz × <i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz]	Sorbier vagabond	I	E	H						
MALVACEAE	<i>Althaea hirsuta</i> L.	Guimauve hérissée	I	RR	EN			oui			R
MALVACEAE	<i>Althaea officinalis</i> L.	Guimauve officinale [Guimauve]	I(SC)	R	NT	d	C	oui			
MALVACEAE	<i>Hibiscus trionum</i> L.	Hibiscus	A	D	H						
MALVACEAE	<i>Lavatera thuringiaca</i> L.	Lavatère de Thuringe	A	D	H						
MALVACEAE	<i>Malva alcea</i> L.	Mauve alcée	I	R	LC			oui			
MALVACEAE	<i>Malva moschata</i> L.	Mauve musquée	I	AC	LC						
MALVACEAE	<i>Malva neglecta</i> Wallr.	Mauve à feuilles rondes [Petite mauve]	I	AC?	DD						
MALVACEAE	<i>Malva nicaeensis</i> All.	Mauve de Nice	A	D	H						
MALVACEAE	<i>Malva parviflora</i> L.	Mauve à petites fleurs	E?(A?)	(E)	(H)						
MALVACEAE	<i>Malva pusilla</i> Smith	Mauve à petites feuilles	E?(A?)	(E)	(H)						
MALVACEAE	<i>Malva sylvestris</i> L.	Mauve sauvage	I	C	LC						
MALVACEAE	<i>Malva sylvestris</i> L. var. <i>sylvestris</i>	Mauve sauvage (var.)	I	C	LC						
MALVACEAE	<i>Malva verticillata</i> L.	Mauve verticillée	C(S)	D?	H	j	?				
MALVACEAE	<i>Malva verticillata</i> L. var. <i>crispa</i> L.	Mauve verticillée (var.) [Mauve crépue]	C(S)	D?	H	j	?				
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	Ményanthe trèfle-d'eau [Trèfle d'eau]	I	RR	CR			oui		R1	R
MENYANTHACEAE	<i>Nymphoides peltata</i> (S.G. Gmel.) O. Kuntze	Faux-nénuphar pelté	I(C)	D?	EX?	p	?	(oui)		R1	(R)
MONOTROPACEAE	<i>Monotropa hypopitys</i> L.	Monotrope sucepin (s.l.) [Sucepin]	I	R	NT			oui			
MONOTROPACEAE	<i>Monotropa hypopitys</i> L. subsp. <i>hypophegea</i> (Wallr.) Holmboe	Monotrope glabre [Sucepin]	I	?	DD			oui			
MONOTROPACEAE	<i>Monotropa hypopitys</i> L. subsp. <i>hypophegea</i> (Wallr.) Holmboe var. <i>hypophegea</i> (Wallr.) Fries	Monotrope glabre (var.) [Sucepin]	I	?	DD			oui			
MONOTROPACEAE	<i>Monotropa hypopitys</i> L. subsp. <i>hypophegea</i> (Wallr.) Holmboe var. <i>piliger</i> (Domin) Holmboe	Monotrope glabre (var.) [Sucepin]	??	??	??			[oui]			

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
MONOTROPACEAE	<i>Monotropa hypopitys</i> L. subsp. <i>hypopitys</i>	Monotrope sucepin [Sucepin]	I	?	DD			oui			
MORACEAE	<i>Ficus carica</i> L.	Figuier commun	C(S)	E	H	a	R				
MORACEAE	<i>Morus nigra</i> L.	Mûrier noir	C		H	a	?				
MYRICACEAE	<i>Myrica gale</i> L.	Myrica galé [Piment royal]	I	E	CR			oui			R
NAJADACEAE	<i>Najas marina</i> L.	Naïade commune (s.l.)	I	RR	VU			oui			R
NAJADACEAE	<i>Najas marina</i> L. subsp. <i>marina</i>	Naïade commune [Grande naïade]	I	RR	VU			oui			R
NAJADACEAE	<i>Najas minor</i> All.	Naïade mineure [Petite naïade]	I	D?	EX?			(oui)			(R)
NYMPHAEACEAE	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Smith	Nénuphar jaune	INC	AR	LC	p(j)	?				
NYMPHAEACEAE	<i>Nymphaea alba</i> L.	Nymphéa blanc (s.l.)	IN(C)	RR	VU	pj	?	oui			R
NYMPHAEACEAE	<i>Nymphaea alba</i> L. subsp. <i>alba</i>	Nymphéa blanc [Nénuphar blanc]	IN(C)	RR	VU	pj	?	oui			R
NYMPHAEACEAE	<i>Nymphaea alba</i> L. subsp. <i>alba</i> f. <i>alba</i>	Nymphéa blanc (f.) [Nénuphar blanc]	IN(C)	RR	VU	pj	?	oui			R
NYMPHAEACEAE	<i>Nymphaea alba</i> L. subsp. <i>alba</i> f. <i>rosea</i> Hartm.	Nymphéa blanc (f.)	C		H	pj	?				
NYMPHAEACEAE	<i>Nymphaea alba</i> L. subsp. <i>occidentalis</i> (Ostenf.) Hyl.	Nymphéa occidental	E?(I)	(D?)	(EX?)						
NYMPHAEACEAE	<i>Nymphaea xmarliacea</i> Lat.-Marl.	Nymphéa de Marliac	C		H	pj	?				
OLEACEAE	<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl	Frêne à folioles étroites (s.l.)	I	RR	NT			oui			
OLEACEAE	<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl subsp. <i>oxycarpa</i> (Bieb. ex Willd.) Franco et Rocha Afonso	Frêne oxyphylle	I	RR	NT			oui			
OLEACEAE	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne commun	I(NC)	CC	LC	spj	?				
OLEACEAE	<i>Fraxinus excelsior</i> L. var. <i>diversifolia</i> Ait.	Frêne commun (var.)	??	??	??						
OLEACEAE	<i>Fraxinus excelsior</i> L. var. <i>excelsior</i>	Frêne commun (var.)	I(N?C)	CC	LC	spj	?				
OLEACEAE	<i>Fraxinus ornus</i> L.	Frêne à fleurs	C(N)	E	H	j(p)	?				
OLEACEAE	<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk.	Troène du Japon	C(S)	R?	H	pj	CC				
OLEACEAE	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troène commun	I(C)	CC	LC	pj	?				
OLEACEAE	<i>Ligustrum vulgare</i> L. var. <i>vulgare</i>	Troène commun (var.)	I(C)	CC	LC	pj	?				
OLEACEAE	<i>Syringa vulgaris</i> L.	Lilas commun [Lilas]	C(NS)	?	H	j	C				
ONAGRACEAE	<i>Circaea lutetiana</i> L.	Circée de Paris	I	C	LC						
ONAGRACEAE	<i>Epilobium angustifolium</i> L.	Épilobe en épi [Laurier de Saint-Antoine]	I	C	LC						
ONAGRACEAE	<i>Epilobium ciliatum</i> Rafin.	Épilobe cilié	Z	C	ZLC						
ONAGRACEAE	<i>Epilobium collinum</i> C.C. Gmel.	Épilobe des collines	E?(A)	(D?)	(H)						
ONAGRACEAE	<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Épilobe hérissé	I	C	LC						
ONAGRACEAE	<i>Epilobium lanceolatum</i> Seb. et Mauri	Épilobe lancéolé	I	E?	DD			oui			

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
ONAGRACEAE	<i>Epilobium montanum</i> L.	Épilobe des montagnes	I	AC	LC						
ONAGRACEAE	<i>Epilobium obscurum</i> Schreb.	Épilobe obscur	I	R?	DD						
ONAGRACEAE	<i>Epilobium palustre</i> L.	Épilobe des marais	I	RR	VU			oui			R
ONAGRACEAE	<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Épilobe à petites fleurs	I	C	LC						
ONAGRACEAE	<i>Epilobium roseum</i> Schreb.	Épilobe rosé	I	AR	LC						
ONAGRACEAE	<i>Epilobium tetragonum</i> L.	Épilobe tétragone (s.l.)	I	C	LC						
ONAGRACEAE	<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. <i>lamyi</i> (F.W. Schultz) Nyman	Épilobe de Lamy	I	C?	DD						
ONAGRACEAE	<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. <i>tetragonum</i>	Épilobe tétragone	I	PC	LC						
ONAGRACEAE	<i>Epilobium ×limosum</i> Schur [<i>Epilobium montanum</i> L. × <i>Epilobium parviflorum</i> L.]	Épilobe des bourbiers	??	??	??						
ONAGRACEAE	<i>Epilobium ×mutabile</i> Boiss. et Reut. [<i>Epilobium montanum</i> L. × <i>Epilobium roseum</i> Schreb.]	Épilobe variable	I	D	H						
ONAGRACEAE	<i>Epilobium ×palatinum</i> F.W. Schultz [<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb. × <i>Epilobium tetragonum</i> L.]	Épilobe du Palatinat (s.l.)	??	??	??						
ONAGRACEAE	<i>Epilobium ×palatinum</i> F.W. Schultz nsubsp. <i>palatinum</i> [<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb. × <i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. <i>lamyi</i> (F.W. Schultz) Nyman]	Épilobe du Palatinat	??	??	??						
ONAGRACEAE	<i>Epilobium ×subhirsutum</i> Genn. [<i>Epilobium hirsutum</i> L. × <i>Epilobium montanum</i> L.]	Épilobe subhérissé	I	?	H						
ONAGRACEAE	<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michaux) Greuter et Burdet	Ludwigie à grandes fleurs [Jussie à grandes fleurs]	Z	R	ZLC				A		
ONAGRACEAE	<i>Ludwigia palustris</i> (L.) S. Elliott	Ludwigie des marais	I	E	CR			oui			R
ONAGRACEAE	<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven	Ludwigie fausse-péplide (s.l.)	??	??	??				[P]		
ONAGRACEAE	<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven subsp. <i>montevidensis</i> (Spreng.) P.H. Raven	Ludwigie de Montevideo [Jussie fausse-péplide]	??	??	??				[P]		
ONAGRACEAE	<i>Oenothera biennis</i> L.	Onagre bisannuelle [Herbe aux ânes]	Z(A?)	?	ZDD						
ONAGRACEAE	<i>Oenothera deflexa</i> R.R. Gates	Onagre penché	??	??	??						
ONAGRACEAE	<i>Oenothera glazioviana</i> Micheli	Onagre à grandes fleurs	Z	?	ZDD						
ONAGRACEAE	<i>Oenothera glazioviana</i> Micheli f. <i>glazioviana</i>	Onagre à grandes fleurs (f.)	Z	?	ZDD						
ONAGRACEAE	<i>Oenothera parviflora</i> L.	Onagre à petites fleurs	E?(A)	(?)	(H)						
ONAGRACEAE	<i>Oenothera ×fallax</i> Renner [<i>Oenothera biennis</i> L. × <i>Oenothera glazioviana</i> Micheli]	Onagre trompeuse	??	??	??						
ORCHIDACEAE	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) L.C.M. Rich.	Anacamptis pyramidal [Orchis pyramidal]	I	PC	LC					A2<>6;C(1)	
ORCHIDACEAE	<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce	Céphalanthère à grandes fleurs	I	AR	NT			oui		A2<>6;C(1)	
ORCHIDACEAE	<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch	Céphalanthère à longues feuilles	I	R	VU			oui		A2<>6;C(1)	R
ORCHIDACEAE	<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) L.C.M. Rich.	Céphalanthère rose	I	RR	CR			oui		R1;A2<>6;C(1)	R
ORCHIDACEAE	<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm.	Coeloglosse vert [Orchis grenouille]	I	RR	EN			oui		R1;A2<>6;C(1)	R
ORCHIDACEAE	<i>Cypripedium calceolus</i> L.	Cypripède sabot [Sabot de Vénus]	I	D	EX			(oui)		H2;B;N1;A2<>6;C(1)	E(V);(R)
ORCHIDACEAE	<i>Dactylorhiza elata</i> (Poiret) Soó	Dactylorhize élevée (s.l.)	E?(I)	(E)	(CR)					A2<>6;C(1)	

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
ORCHIDACEAE	<i>Dactylorhiza elata</i> (Poiret) Soó subsp. <i>sesquipedalis</i> (Willd.) Soó	Dactylorhize des Charentes [Orchis élevé]	E?(I)	(E)	(CR)					A2<>6*;C(1)*	
ORCHIDACEAE	<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó	Dactylorhize de Fuchs	I	AR	LC					A2<>6;C(1)	
ORCHIDACEAE	<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó	Dactylorhize incarnate (s.l.)	I	RR	CR			oui		A2<>6;C(1)	R
ORCHIDACEAE	<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó subsp. <i>incarnata</i>	Dactylorhize incarnate [Orchis incarnat]	I	RR?	DD			oui		A2<>6*;C(1)*	R
ORCHIDACEAE	<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó subsp. <i>incarnata</i> f. <i>incarnata</i>	Dactylorhize incarnate (f.) [Orchis incarnat]	I	RR?	DD			oui		A2<>6*;C(1)*	R
ORCHIDACEAE	<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó subsp. <i>pulchella</i> (Druce) Soó	Dactylorhize élégante [Orchis gracieux]	??	??	??			[oui]		[A2<>6*];[C(1)*]	[R]
ORCHIDACEAE	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó	Dactylorhize tachée (s.l.)	I	AR	LC					A2<>6;C(1)	
ORCHIDACEAE	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó subsp. <i>elodes</i> (Griseb.) Soó	Dactylorhize des marais	??	??	??					[A2<>6*];[C(1)*]	
ORCHIDACEAE	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó subsp. <i>ericetorum</i> (E.F. Linton) P.F. Hunt et Summerh.	Dactylorhize des bruyères	I	?	DD					A2<>6*;C(1)*	
ORCHIDACEAE	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó subsp. <i>maculata</i>	Dactylorhize tachée	I	?	DD					A2<>6*;C(1)*	
ORCHIDACEAE	<i>Dactylorhiza majalis</i> (Reichenb.) P.F. Hunt et Summerh.	Dactylorhize à larges feuilles [Orchis à larges feuilles]	I	RR	CR			oui		R1;A2<>6;C(1)	R
ORCHIDACEAE	<i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó	Dactylorhize négligée (s.l.)	I	AR	NT			oui		A2<>6;C(1)	
ORCHIDACEAE	<i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó subsp. <i>integrata</i> (E.G. Camus ex Fourcy) Soó	Dactylorhize à labelle entier [Orchis à labelle entier]	??	??	??			[oui]		[A2<>6]	
ORCHIDACEAE	<i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó subsp. <i>integrata</i> (E.G. Camus ex Fourcy) Soó var. <i>integrata</i> (E.G. Camus ex Fourcy) Tyteca et Gathoye	Dactylorhize négligée (var.) [Orchis à labelle entier]	??	??	??			[oui]		[A2<>6]	
ORCHIDACEAE	<i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó subsp. <i>integrata</i> (E.G. Camus ex Fourcy) Soó var. <i>maculosa</i> Tyteca et Gathoye	Dactylorhize négligée (var.) [Orchis à labelle entier]	??	??	??			[oui]		[A2<>6]	
ORCHIDACEAE	<i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó subsp. <i>praetermissa</i>	Dactylorhize négligée [Orchis négligé]	I	AR?	DD			oui		A2<>6	
ORCHIDACEAE	<i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó subsp. <i>praetermissa</i> var. <i>junialis</i> (Verm.) Senghas	Dactylorhize négligée (var.) [Orchis négligé]	I	?	DD			oui		A2<>6*;C(1)*	
ORCHIDACEAE	<i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó subsp. <i>praetermissa</i> var. <i>praetermissa</i>	Dactylorhize négligée (var.) [Orchis négligé]	I	?	DD			oui		A2<>6	
ORCHIDACEAE	<i>Dactylorhiza traunsteineri</i> (Sauter) Soó	Dactylorhize de Traunsteiner [Orchis de Traunsteiner]	E							A2<>6*;C(1)*	
ORCHIDACEAE	<i>Dactylorhiza traunsteinerioides</i> (Pugsley) Landwehr	Dactylorhize britannique	??	??	??					[A2<>6]	
ORCHIDACEAE	<i>Dactylorhiza</i> × <i>grandis</i> (Druce) P.F. Hunt [<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó × <i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó]	Dactylorhize géante	E?(I)	(E)	(H)					A2<>6	
ORCHIDACEAE	<i>Dactylorhiza</i> × <i>hallii</i> (Druce) Soó [<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó × <i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó]	Dactylorhize de Hall	I	E	H					A2<>6	
ORCHIDACEAE	<i>Dactylorhiza</i> × <i>kerneriorum</i> (Soó) Soó [<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó × <i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó]	Dactylorhize des Kerner	E?(I)	(E)	(H)					A2<>6	
ORCHIDACEAE	<i>Dactylorhiza</i> × <i>wintonii</i> (Druce ex A. Camus) P.F. Hunt [<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó × <i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó]	Dactylorhize de Winton	E?(I)	(E)	(H)					A2<>6	
ORCHIDACEAE	<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffmann) Besser	Épipactis brun rouge	I	PC	NT			oui		R1;A2<>6;C(1)	
ORCHIDACEAE	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	Épipactis à larges feuilles (s.l.)	I	PC	LC					A2<>6;C(1)	
ORCHIDACEAE	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz subsp. <i>helleborine</i>	Épipactis à larges feuilles	I	PC	LC					A2<>6*;C(1)*	
ORCHIDACEAE	<i>Epipactis leptochila</i> (Godf.) Godf.	Épipactis à labelle étroit (s.l.)	I	E	CR			oui		A2<>6;C(1)	R
ORCHIDACEAE	<i>Epipactis leptochila</i> (Godf.) Godf. subsp. <i>leptochila</i>	Épipactis à labelle étroit	I	E	CR			oui		A2<>6*;C(1)*	R
ORCHIDACEAE	<i>Epipactis leptochila</i> (Godf.) Godf. subsp. <i>leptochila</i> var. <i>leptochila</i>	Épipactis à labelle étroit (var.)	I	E	CR			oui		A2<>6*;C(1)*	R

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
ORCHIDACEAE	<i>Epipactis leptochila</i> (Godf.) Godf. subsp. <i>neglecta</i> Kümpel	Épipactis négligé	??	??	??			[oui]		[A2<>6*];[C(1)*]	[R]
ORCHIDACEAE	<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Swartz	Épipactis à petites feuilles	I	E	CR			oui		A2<>6;C(1)	R
ORCHIDACEAE	<i>Epipactis muelleri</i> Godf.	Épipactis de Müller	I	RR	VU			oui		A2<>6;C(1)	R
ORCHIDACEAE	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	Épipactis des marais	I	RR	CR			oui		R1;A2<>6;C(1)	R
ORCHIDACEAE	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz f. <i>palustris</i>	Épipactis des marais (f.)	I	RR	CR			oui		R1*;A2<>6*;C(1)*	R
ORCHIDACEAE	<i>Epipactis purpurata</i> Smith	Épipactis pourpré	E?(I)	(E)	(CR)					A2<>6;C(1)	
ORCHIDACEAE	<i>Goodyera repens</i> (L.) R. Brown	Goodyère rampante	I	RR	NT			oui		A2<>6;C(1)	
ORCHIDACEAE	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Brown	Gymnadénie moucheron	I	PC	LC					A2<>6;C(1)	
ORCHIDACEAE	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Brown var. <i>conopsea</i>	Gymnadénie moucheron (var.)	I	?	DD					A2<>6*;C(1)*	
ORCHIDACEAE	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Brown var. <i>densiflora</i> (Wahlenb.) Lindl.	Gymnadénie moucheron (var.)	I	?	DD					A2<>6*;C(1)*	
ORCHIDACEAE	<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) L.C.M. Rich.	Gymnadénie odorante	I	RR	CR			oui		R1;A2<>6;C(1)	R
ORCHIDACEAE	<i>Gymnadenia ×intermedia</i> Peterm. [<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Brown × <i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) L.C.M. Rich.]	Gymnadénie intermédiaire	I	E	H					A2<>6	
ORCHIDACEAE	<i>Herminium monorchis</i> (L.) R. Brown	Herminion caché [Orchis musc]	I	RR	CR			oui		R1;A2<>6;C(1)	R
ORCHIDACEAE	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng.	Himantoglosse barbe-de-bouc [Loroglosse ; Orchis bouc]	I	PC	LC					A2<>6;C(1)	
ORCHIDACEAE	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng. var. <i>hircinum</i>	Himantoglosse barbe-de-bouc (var.) [Loroglosse ; Orchis bouc]	I	PC	LC					A2<>6*;C(1)*	
ORCHIDACEAE	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Swartz	Limodore à feuilles avortées [Limodore]	I	RR	CR			oui		A2<>6;C(1)	R
ORCHIDACEAE	<i>Liparis loeselii</i> (L.) L.C.M. Rich.	Liparis de Loesel	I	E	CR			oui		H2;B;N1;A2<>6;C(1)	E(V);F1(V);R
ORCHIDACEAE	<i>Liparis loeselii</i> (L.) L.C.M. Rich. var. <i>loeselii</i>	Liparis de Loesel (var.)	I	E	CR			oui		H2*;B*;N1*;A2<>6*;C(1)*	E(V)*;F1(V)*;R*
ORCHIDACEAE	<i>Listera ovata</i> (L.) R. Brown	Listère ovale [Double-feuille]	I	AC	LC					A2<>6;C(1)	
ORCHIDACEAE	<i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase	[Orchis brûlé]	I	RR	EN			oui		A2<>6;C(1)	R
ORCHIDACEAE	<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) L.C.M. Rich.	Néottie nid-d'oiseau [Néottie]	I	AR	LC					A2<>6;C(1)	
ORCHIDACEAE	<i>Ophrys apifera</i> Huds.	Ophrys abeille	I	PC	LC					A2<>6;C(1)	
ORCHIDACEAE	<i>Ophrys apifera</i> Huds. var. <i>apifera</i>	Ophrys abeille (var.)	I	PC	LC					A2<>6*;C(1)*	
ORCHIDACEAE	<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W. Schmidt) Moench	Ophrys frelon [Ophrys bourdon]	I	AR	NT			oui		R1;A2<>6;C(1)	
ORCHIDACEAE	<i>Ophrys insectifera</i> L.	Ophrys mouche	I	PC	LC					A2<>6;C(1)	
ORCHIDACEAE	<i>Ophrys scolopax</i> Cav.	Ophrys bécasse	E?(I)	(E)	(CR)					A2<>6;C(1)	
ORCHIDACEAE	<i>Ophrys sphegodes</i> Mill.	Ophrys araignée (s.l.)	I	R	VU			oui		R1p;A2<>6;C(1)	R
ORCHIDACEAE	<i>Ophrys sphegodes</i> Mill. nsubsp. <i>jeanpertii</i> (E.G. Camus) J. Duvigneaud	Ophrys de Jeanpert	??	??	??					[A2<>6*];[C(1)*]	
ORCHIDACEAE	<i>Ophrys sphegodes</i> Mill. subsp. <i>araneola</i> (Reichenb.) Lainz	Ophrys litigieux	I	RR	EN			oui		R1;A2<>6*;C(1)*	R
ORCHIDACEAE	<i>Ophrys sphegodes</i> Mill. subsp. <i>sphogodes</i>	Ophrys araignée	I	R	VU			oui		A2<>6*;C(1)*	R

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
ORCHIDACEAE	<i>Ophrys splendida</i> Gözl et H.R. Reinhard	Ophrys splendide	I	E	CR			oui		A2<>6;C(1)	F1(V);R
ORCHIDACEAE	<i>Ophrys ×albertiana</i> E.G. Camus [<i>Ophrys apifera</i> Huds. × <i>Ophrys fuciflora</i> (F.W. Schmidt) Moench]	Ophrys d'Alberti	I	E?	H					A2<>6	
ORCHIDACEAE	<i>Ophrys ×devenensis</i> Reichenb. f. [<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W. Schmidt) Moench × <i>Ophrys insectifera</i> L.]	Ophrys de Devens	I	E	H					A2<>6	
ORCHIDACEAE	<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All.	Orchis homme pendu [Acéras ; Homme pendu]	I	E	CR			oui		R1;A2<>6;C(1)	R
ORCHIDACEAE	<i>Orchis coriophora</i> L.	Orchis punaise	I	E	CR			oui		N1;A2<>6;C(1)	R
ORCHIDACEAE	<i>Orchis laxiflora</i> Lam.	Orchis à fleurs lâches	I	RR	CR			oui		A2<>6;C(1)	R
ORCHIDACEAE	<i>Orchis mascula</i> (L.) L.	Orchis mâle	I	PC	LC					A2<>6;C(1)	
ORCHIDACEAE	<i>Orchis militaris</i> L.	Orchis militaire	I	AR	NT			oui		A2<>6;C(1)	
ORCHIDACEAE	<i>Orchis morio</i> L.	Orchis bouffon	I(C)	RR	CR	p	E	oui		A2<>6;C(1)	R
ORCHIDACEAE	<i>Orchis palustris</i> Jacq.	Orchis des marais	I	E	CR			oui		R1;A2<>6;C(1)*	R
ORCHIDACEAE	<i>Orchis purpurea</i> Huds.	Orchis pourpre	I	AC	LC					A2<>6;C(1)	
ORCHIDACEAE	<i>Orchis simia</i> Lam.	Orchis singe	I	R	VU			oui		R1;A2<>6;C(1)	R
ORCHIDACEAE	<i>Orchis ×angusticurris</i> Franch. ex Humnicki [<i>Orchis purpurea</i> Huds. × <i>Orchis simia</i> Lam.]	Orchis à jambes étroites	I	RR	H					A2<>6	
ORCHIDACEAE	<i>Orchis ×beyrichii</i> A. Kerner [<i>Orchis militaris</i> L. × <i>Orchis simia</i> Lam.]	Orchis de Beyrich	I	E	H					A2<>6	
ORCHIDACEAE	<i>Orchis ×hybrida</i> Boenningh. ex Reichenb. [<i>Orchis militaris</i> L. × <i>Orchis purpurea</i> Huds.]	Orchis hybride	I	AR	H					A2<>6	
ORCHIDACEAE	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) L.C.M. Rich.	Platanthère à deux feuilles (s.l.)	I	RR	VU			oui		A2<>6;C(1)	R
ORCHIDACEAE	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) L.C.M. Rich. subsp. <i>bifolia</i>	Platanthère à deux feuilles	I	?	DD			oui		A2<>6*;C(1)*	R
ORCHIDACEAE	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) L.C.M. Rich. subsp. <i>latiflora</i> (Drejer) Løjtnant	Platanthère à grandes fleurs	I	?	DD			oui		A2<>6*;C(1)*	R
ORCHIDACEAE	<i>Platanthera chlorantha</i> (Cust.) Reichenb.	Platanthère des montagnes	I	AC	LC					A2<>6;C(1)	
ORCHIDACEAE	<i>Platanthera ×hybrida</i> Brügger [<i>Platanthera chlorantha</i> (Cust.) Reichenb. × <i>Platanthera bifolia</i> (L.) L.C.M. Rich.]	Platanthère hybride	I	E?	H					A2<>6	
ORCHIDACEAE	<i>Pseudorchis albida</i> (L.) Á. et D. Löve	Pseudorchis blanchâtre [Orchis blanchâtre]	I	D	EX			(oui)		A2<>6;C(1)	(R)
ORCHIDACEAE	<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poiret) L.C.M. Rich.	Spiranthe d'été	I	D	EX			(oui)		H4;B;N1;A2<>6;C(1)	(R)
ORCHIDACEAE	<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall.	Spiranthe d'automne	I	RR	CR			oui		A2<>6;C(1)	R
ORCHIDACEAE	<i>×Dactylodenia st-quintinii</i> (Godf.) J. Duvalneaud [<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó × <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Brown]	Dactylodénie de Saint-Quintin	??	??	??					[A2<>6]	
ORCHIDACEAE	<i>×Dactyloglossum mixtum</i> (Aschers. et Graebn.) Rauschert [<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm. × <i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó]	Dactyloglosse mixte	I	E	H					A2<>6	
ORCHIDACEAE	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó × <i>Orchis morio</i> L.		E?(I)	(D)	(H)					A2<>6	
OROBANCHACEAE	<i>Lathraea squamaria</i> L.	Lathrée écailleuse	I	R	EN			oui		R1	R
OROBANCHACEAE	<i>Orobanche alba</i> Steph. ex Willd.	Orobanche du thym	I	RR	VU			oui			R
OROBANCHACEAE	<i>Orobanche amethystea</i> Thuill.	Orobanche améthyste	I	R	VU			oui			R

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
OROBANCHACEAE	<i>Orobanche arenaria</i> Borkh.	Orobanche des sables	I	D	EX			(oui)			(R)
OROBANCHACEAE	<i>Orobanche caryophyllacea</i> Smith	Orobanche du gaillet	I	RR	EN			oui			R
OROBANCHACEAE	<i>Orobanche elatior</i> Sutton	Orobanche élevée	I	E	CR			oui			R
OROBANCHACEAE	<i>Orobanche gracilis</i> Smith	Orobanche sanglante	I	AR	NT			oui			
OROBANCHACEAE	<i>Orobanche hederæ</i> Vaucher ex Duby	Orobanche du lierre	I	RR	VU			oui			R
OROBANCHACEAE	<i>Orobanche lutea</i> Baumg.	Orobanche rougeâtre	I	D	EX			(oui)			(R)
OROBANCHACEAE	<i>Orobanche minor</i> Smith	Orobanche à petites fleurs	I	RR	EN			oui			R
OROBANCHACEAE	<i>Orobanche picridis</i> F.W. Schultz	Orobanche de la picride	I	RR	VU			oui		R1	R
OROBANCHACEAE	<i>Orobanche purpurea</i> Jacq.	Orobanche pourpre	I	E	CR			oui			R
OROBANCHACEAE	<i>Orobanche ramosa</i> L.	Orobanche rameuse	Z	D	ZEX			(oui)			
OROBANCHACEAE	<i>Orobanche rapum-genistæ</i> Thuill.	Orobanche du genêt	I	R	VU			oui			R
OROBANCHACEAE	<i>Orobanche teucris</i> Holandre	Orobanche de la germandrée	I	R	VU			oui			R
OROBANCHACEAE	<i>Orobanche teucris</i> Holandre f. <i>aurea</i> Teyber	Orobanche de la germandrée (f.)	??	??	??			[oui]			[R]
OROBANCHACEAE	<i>Orobanche teucris</i> Holandre f. <i>teucris</i>	Orobanche de la germandrée (f.)	??	??	??			[oui]			[R]
OXALIDACEAE	<i>Oxalis acetosella</i> L.	Oxalide oseille [Surelle ; Pain de coucou]	I	AC	LC						
OXALIDACEAE	<i>Oxalis corniculata</i> L.	Oxalide cornue	NS(C)	?	H	j	?				
OXALIDACEAE	<i>Oxalis corniculata</i> L. var. <i>atropurpurea</i> Planch.	Oxalide cornue (var.)	NS(C)	?	H	j	?				
OXALIDACEAE	<i>Oxalis corniculata</i> L. var. <i>corniculata</i>	Oxalide cornue (var.)	NS(C)	?	H	j	?				
OXALIDACEAE	<i>Oxalis dillenii</i> Jacq.	Oxalide de Dillenius	??	??	??						
OXALIDACEAE	<i>Oxalis fontana</i> Bunge	Oxalide droite	Z	PC	ZLC						
PAPAVERACEAE	<i>Chelidonium majus</i> L.	Chélidoine éclairée	I	C	LC						
PAPAVERACEAE	<i>Chelidonium majus</i> L. var. <i>majus</i>	Chélidoine éclairée (var.)	I	C	LC						
PAPAVERACEAE	<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Eschscholzie de Californie	C(S)	?	H	j	C				
PAPAVERACEAE	<i>Glaucium corniculatum</i> (L.) Rudolph	Glaucière cornue [Pavot cornu]	A	D	H						
PAPAVERACEAE	<i>Glaucium flavum</i> Crantz	Glaucière jaune	I(A)	RR	NT			oui			
PAPAVERACEAE	<i>Papaver argemone</i> L.	Pavot argémone	I	RR?	DD			oui			(Rp)
PAPAVERACEAE	<i>Papaver argemone</i> L. var. <i>argemone</i>	Pavot argémone (var.)	I	RR?	DD			oui			
PAPAVERACEAE	<i>Papaver argemone</i> L. var. <i>glabrum</i> Koch	Pavot argémone (var.)	I	D	EX			(oui)			(R)
PAPAVERACEAE	<i>Papaver dubium</i> L.	Pavot douteux (s.l.)	I	PC	LC						
PAPAVERACEAE	<i>Papaver dubium</i> L. subsp. <i>dubium</i>	Pavot douteux [Petit coquelicot]	I	PC	LC						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
PAPAVERACEAE	<i>Papaver dubium</i> L. subsp. <i>lecoqii</i> (Lamotte) Syme	Pavot de Lecoq	I	E?	DD			oui			
PAPAVERACEAE	<i>Papaver hybridum</i> L.	Pavot hispide	I	E	CR			oui			R
PAPAVERACEAE	<i>Papaver rhoeas</i> L.	Pavot coquelicot [Grand coquelicot]	I(C)	CC	LC	p	?				
PAPAVERACEAE	<i>Papaver rhoeas</i> L. f. <i>rhoeas</i>	Pavot coquelicot (f.) [Grand coquelicot]	I	?	DD						
PAPAVERACEAE	<i>Papaver rhoeas</i> L. f. <i>strigosum</i> (Boenningh.) Rothm.	Pavot coquelicot (f.) [Grand coquelicot]	I	?	DD						
PAPAVERACEAE	<i>Papaver somniferum</i> L.	Pavot somnifère (s.l.)	S(C)	?	H	aj	AC				
PAPAVERACEAE	<i>Papaver somniferum</i> L. subsp. <i>setigerum</i> (DC.) Arcang.	Pavot sétigère	E?(A)	(D)	(H)						
PAPAVERACEAE	<i>Papaver somniferum</i> L. subsp. <i>somniferum</i>	Pavot somnifère [Pavot ; Œillette]	S(C)	?	H	aj	AC				
PAPAVERACEAE	<i>Papaver ×hungaricum</i> Borbás [<i>Papaver dubium</i> L. × <i>Papaver rhoeas</i> L.]	Pavot de Hongrie	??	??	??						
PHYTOLACCACEAE	<i>Phytolacca americana</i> L.	Phytolaque d'Amérique	C(SA)	E	H	j	?				
PLANTAGINACEAE	<i>Littorella uniflora</i> (L.) Aschers.	Littorelle des étangs	I	E	CR			oui		N1	R
PLANTAGINACEAE	<i>Plantago altissima</i> L.	Plantain élevé	A	E	H						
PLANTAGINACEAE	<i>Plantago arenaria</i> Waldst. et Kit.	Plantain des sables	A(N?)	E	H						
PLANTAGINACEAE	<i>Plantago coronopus</i> L.	Plantain corne de cerf	I	PC	LC						
PLANTAGINACEAE	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé	I	CC	LC						
PLANTAGINACEAE	<i>Plantago lanceolata</i> L. var. <i>lanceolata</i>	Plantain lancéolé (var.)	I	CC	LC						
PLANTAGINACEAE	<i>Plantago lanceolata</i> L. var. <i>tenuifolia</i> Crépin	Plantain lancéolé (var.)	??	??	??						
PLANTAGINACEAE	<i>Plantago major</i> L.	Plantain à larges feuilles (s.l.)	I	CC	LC						
PLANTAGINACEAE	<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>intermedia</i> (Gilib.) Lange	Plantain intermédiaire	I	?	DD						
PLANTAGINACEAE	<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Plantain à larges feuilles	I	CC	LC						
PLANTAGINACEAE	<i>Plantago maritima</i> L.	Plantain maritime	I	D?	EX?			(oui)			(R)
PLANTAGINACEAE	<i>Plantago media</i> L.	Plantain moyen	I	AC	LC						
PLATANACEAE	<i>Platanus occidentalis</i> L.	Platane d'Occident	E?(C)		(H)	j	?				
PLATANACEAE	<i>Platanus ×hispanica</i> Mill. ex Muenchh.	Platane à feuilles d'érable	C		H	pj	C				
PLUMBAGINACEAE	<i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult.	Armérie des sables	I	RR	CR			oui			R
PLUMBAGINACEAE	<i>Armeria maritima</i> Willd.	Armérie maritime (s.l.) [Gazon d'Olympe]	I(C)	RR	NT	p	E?	oui			
PLUMBAGINACEAE	<i>Armeria maritima</i> Willd. subsp. <i>maritima</i>	Armérie maritime	I	RR	NT			oui			
PLUMBAGINACEAE	<i>Limonium vulgare</i> Mill.	Statice commun	I	D	EX			(oui)		C0	(R)
POACEAE	<i>Agrostis canina</i> L.	Agrostide des chiens	I	AR	LC						
POACEAE	<i>Agrostis capillaris</i> L.	Agrostide capillaire	I	C	LC						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
POACEAE	<i>Agrostis capillaris</i> L. f. <i>aristata</i> Lindm.	Agrostide capillaire (f.)	??	??	??						
POACEAE	<i>Agrostis capillaris</i> L. f. <i>capillaris</i>	Agrostide capillaire (f.)	I	C	LC						
POACEAE	<i>Agrostis castellana</i> Boiss. et Reut.	Agrostide de Castille	??	??	??						
POACEAE	<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Agrostide géante	I	AC	LC						
POACEAE	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifère	I	CC	LC						
POACEAE	<i>Agrostis stolonifera</i> L. var. <i>marina</i> (S.F. Gray) Kerguelén	Agrostide stolonifère (var.)	I	?	DD						
POACEAE	<i>Agrostis stolonifera</i> L. var. <i>pseudopungens</i> (Lange) Kerguelén	Agrostide stolonifère (var.)	??	??	??						
POACEAE	<i>Agrostis stolonifera</i> L. var. <i>stolonifera</i>	Agrostide stolonifère (var.)	I	CC	LC						
POACEAE	<i>Agrostis vinealis</i> Schreb.	Agrostide des sables	I	?	DD						
POACEAE	<i>Agrostis xfoilladeana</i> Lambinon et Verloove [<i>Agrostis capillaris</i> L. x <i>Agrostis castellana</i> Boiss. et Reut.]	Agrostide de Fouillade	??	??	??						
POACEAE	<i>Agrostis xmurbeckii</i> Fouillade [<i>Agrostis capillaris</i> L. x <i>Agrostis stolonifera</i> L.]	Agrostide de Murbeck	I	?	H						
POACEAE	<i>Aira caryophyllea</i> L.	Aïra caryophyllée (s.l.)	I	R	VU			oui			R
POACEAE	<i>Aira caryophyllea</i> L. subsp. <i>caryophyllea</i>	Aïra caryophyllée	I	R?	DD			oui			R
POACEAE	<i>Aira caryophyllea</i> L. subsp. <i>multiculmis</i> (Dum.) Bonnier et Layens	Aïra à tiges nombreuses	I?	?	NE						
POACEAE	<i>Aira praecox</i> L.	Aïra précoce	I	AR	LC						
POACEAE	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol.	Vulpin fauve	I	RR?	DD			oui			
POACEAE	<i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan	Vulpin bulbeux	I	E	CR			oui			R
POACEAE	<i>Alopecurus geniculatus</i> L.	Vulpin genouillé	I	PC	LC						
POACEAE	<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	Vulpin des champs	I	CC	LC						
POACEAE	<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds. f. <i>latifolius</i> Jansen et Wachter	Vulpin des champs (f.)	I	?	DD						
POACEAE	<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds. f. <i>myosuroides</i>	Vulpin des champs (f.)	I	CC	LC						
POACEAE	<i>Alopecurus pratensis</i> L.	Vulpin des prés	I	AC	LC						
POACEAE	<i>Alopecurus xbrachystylus</i> Peterm. [<i>Alopecurus geniculatus</i> L. x <i>Alopecurus pratensis</i> L.]	Vulpin à style court	??	??	??						
POACEAE	<i>Alopecurus xhaussknechtianus</i> Aschers. et Graebn. [<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol. x <i>Alopecurus geniculatus</i> L.]	Vulpin d'Hausknecht	??	??	??						
POACEAE	<i>Ammophila arenaria</i> (L.) Link	Oyat des sables [Oyat]	I(NC)	E	EN	f	E?	oui			R
POACEAE	<i>Anthoxanthum aristatum</i> Boiss.	Flouve aristée	I	E	CR			oui			R
POACEAE	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Flouve odorante	I	C	LC						
POACEAE	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L. var. <i>odoratum</i>	Flouve odorante (var.)	I	?	DD						
POACEAE	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L. var. <i>villosum</i> Loisel. ex DC.	Flouve odorante (var.)	I	?	DD						
POACEAE	<i>Apera interrupta</i> (L.) Beauv.	Apère interrompue	Z	E	ZVU			oui			R

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
POACEAE	<i>Apera spica-venti</i> (L.) Beauv.	Apère jouet-du-vent [Jouet du vent]	I	PC	LC						
POACEAE	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) Beauv. ex J. et C. Presl	Fromental élevé (s.l.)	I	CC	LC						
POACEAE	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) Beauv. ex J. et C. Presl subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schübl. et Martens	Fromental bulbeux [Avoine à chapelet]	I	PC	LC						
POACEAE	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) Beauv. ex J. et C. Presl subsp. <i>elatius</i>	Fromental élevé [Fromental]	I	CC	LC						
POACEAE	<i>Avena brevis</i> Roth	Avoine courte	??	??	??						
POACEAE	<i>Avena fatua</i> L.	Avoine folle (s.l.) [Folle-avoine]	I	PC?	DD						
POACEAE	<i>Avena fatua</i> L. subsp. <i>fatua</i>	Avoine folle [Folle-avoine]	I	PC?	DD						
POACEAE	<i>Avena sativa</i> L.	Avoine cultivée (s.l.)	C(SA)	?	H	a	AR?				
POACEAE	<i>Avena sativa</i> L. subsp. <i>contracta</i> (Neilr.) Celak.	Avoine contractée [Avoine de Hongrie]	C		H	a	D				
POACEAE	<i>Avena sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Avoine cultivée [Avoine]	C(SA)	?	H	a	AR?				
POACEAE	<i>Avena sterilis</i> L.	Avoine stérile (s.l.)	A	E	H						
POACEAE	<i>Avena sterilis</i> L. subsp. <i>ludoviciana</i> (Durieu) Nyman	Avoine de Louis	A	E	H						
POACEAE	<i>Avena sterilis</i> L. subsp. <i>sterilis</i>	Avoine stérile	??	??	??						
POACEAE	<i>Avena strigosa</i> Schreb.	Avoine maigre	A	D	H						
POACEAE	<i>Avenula pratensis</i> (L.) Dum.	Avenule des prés	I	PC	LC						
POACEAE	<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dum.	Avenule pubescente	I	AR?	DD						
POACEAE	<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng	Bothriochloa pied-de-poule [Pied-de-poule]	I	D	EX			(oui)			(R)
POACEAE	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) Beauv.	Brachypode penné (s.l.)	I	C	LC						
POACEAE	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) Beauv. subsp. <i>pinnatum</i>	Brachypode penné	??	??	??						
POACEAE	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) Beauv. subsp. <i>rupestre</i> (Host) Schübl. et Martens	Brachypode rupestre	??	??	??						
POACEAE	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) Beauv. var. <i>glabratum</i> Spenner	Brachypode penné (s.l.) (var.)	I	?	DD						
POACEAE	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) Beauv. var. <i>pinnatum</i>	Brachypode penné (s.l.) (var.)	I	?	DD						
POACEAE	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) Beauv.	Brachypode des forêts	I	CC	LC						
POACEAE	<i>Briza maxima</i> L.	Brize élevée	C		H	p	D				
POACEAE	<i>Briza media</i> L.	Brize intermédiaire [Amourette commune]	I	PC	LC						
POACEAE	<i>Briza minor</i> L.	Brize mineure [Petite amourette]	I	D?	EX?			(oui)			(R)
POACEAE	<i>Bromus arvensis</i> L.	Brome des champs	I	E	CR			oui			R
POACEAE	<i>Bromus carinatus</i> Hook. et Arnott	Brome caréné	??	??	??						
POACEAE	<i>Bromus catharticus</i> Vahl	Brome purgatif	NC	E	H	p	?				
POACEAE	<i>Bromus commutatus</i> Schrad.	Brome variable	I	AR?	DD						
POACEAE	<i>Bromus commutatus</i> Schrad. var. <i>commutatus</i>	Brome variable (var.)	I	AR?	DD						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
POACEAE	<i>Bromus commutatus</i> Schrad. var. <i>pubens</i> H.C. Watson	Brome variable (var.)	??	??	??						
POACEAE	<i>Bromus diandrus</i> Roth	Brome à deux étamines (s.l.)	I(N?A?)	R?	DD						
POACEAE	<i>Bromus diandrus</i> Roth subsp. <i>diandrus</i>	Brome à deux étamines	I(N?A?)	?	DD						
POACEAE	<i>Bromus diandrus</i> Roth subsp. <i>maximus</i> (Desf.) Soó	Brome raide	I(N?A?)	?	DD						
POACEAE	<i>Bromus erectus</i> Huds.	Brome dressé	I	PC	LC						
POACEAE	<i>Bromus erectus</i> Huds. var. <i>erectus</i>	Brome dressé (var.)	I	?	DD						
POACEAE	<i>Bromus erectus</i> Huds. var. <i>villosus</i> Leight.	Brome dressé (var.)	I	?	DD						
POACEAE	<i>Bromus grossus</i> Desf. ex DC.	Brome épais	I	D	EX			(oui)		H2;B;N1	E(E);(R)
POACEAE	<i>Bromus grossus</i> Desf. ex DC. var. <i>grossus</i>	Brome épais (var.)	I	D	EX			(oui)		H2*;B*;N1*	E(E*);(R)
POACEAE	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Brome mou (s.l.)	I	CC	LC						
POACEAE	<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>feronii</i> (Mabille) Ph. Smith	Brome de Ferron [Brome des falaises]	E?(I?)	(D)	(NE)						
POACEAE	<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>hordeaceus</i>	Brome mou	I	CC	LC						
POACEAE	<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>thominei</i> (Hardouin) Br.-Bl.	Brome des dunes	I	?	DD						
POACEAE	<i>Bromus inermis</i> Leyss.	Brome inerme	A	E?	H						
POACEAE	<i>Bromus lanceolatus</i> Roth	Brome lancéolé	A	D	H						
POACEAE	<i>Bromus madritensis</i> L.	Brome de Madrid	A	D	H						
POACEAE	<i>Bromus racemosus</i> L.	Brome en grappe	I	AR?	DD						
POACEAE	<i>Bromus ramosus</i> Huds.	Brome rude (s.l.)	I	AC	LC						
POACEAE	<i>Bromus ramosus</i> Huds. subsp. <i>benekenii</i> (Lange) Schinz et Thell.	Brome de Beneken	I	RR	VU			oui			R
POACEAE	<i>Bromus ramosus</i> Huds. subsp. <i>ramosus</i>	Brome rude	I	PC	LC						
POACEAE	<i>Bromus secalinus</i> L.	Brome faux-seigle (s.l.)	I	RR	EN			oui			R
POACEAE	<i>Bromus secalinus</i> L. subsp. <i>decipiens</i> Bomble et H. Scholz	Brome trompeur	??	??	??			[oui]			[R]
POACEAE	<i>Bromus secalinus</i> L. subsp. <i>secalinus</i>	Brome faux-seigle	I	RR	EN			oui			R
POACEAE	<i>Bromus secalinus</i> L. subsp. <i>secalinus</i> var. <i>pubescens</i> Stokes	Brome faux-seigle (var.)	I	?	DD			oui			R
POACEAE	<i>Bromus secalinus</i> L. subsp. <i>secalinus</i> var. <i>secalinus</i>	Brome faux-seigle (var.)	I	?	DD			oui			R
POACEAE	<i>Bromus secalinus</i> L. subsp. <i>secalinus</i> var. <i>submuticus</i> Reichenb.	Brome faux-seigle (var.)	??	??	??			[oui]			[R]
POACEAE	<i>Bromus sitchensis</i> Trin.	Brome de Sitka	??	??	??						
POACEAE	<i>Bromus sterilis</i> L.	Brome stérile	I	CC	LC						
POACEAE	<i>Bromus tectorum</i> L.	Brome des toits	I	R?	DD						
POACEAE	<i>Bromus tectorum</i> L. var. <i>hirsutus</i> Regel	Brome des toits (var.)	I	?	DD						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
POACEAE	<i>Bromus tectorum</i> L. var. <i>tectorum</i>	Brome des toits (var.)	I	?	DD						
POACEAE	<i>Bromus xpseudothominei</i> Ph. Smith [<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>hordeaceus</i> x <i>Bromus lepidus</i> Holmberg]	Brome de Thomine	??	??	??						
POACEAE	<i>Calamagrostis canescens</i> (Weber) Roth	Calamagrostide blanchâtre	I	D?	EX?			(oui)			(R)
POACEAE	<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth	Calamagrostide commune	I	AC	LC						
POACEAE	<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) Beauv.	Catabrose aquatique	I	RR	CR			oui			R
POACEAE	<i>Catapodium marinum</i> (L.) C.E. Hubbard	Catapode marine	I	RR	NT			oui			
POACEAE	<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E. Hubbard	Catapode rigide	I	PC	LC						
POACEAE	<i>Corynephorus canescens</i> (L.) Beauv.	Corynéphore blanchâtre	I	D?	EX?			(oui)			(R)
POACEAE	<i>Cutandia maritima</i> (L.) Barbey	Cutandie maritime	E?(A)	(D)	(H)						
POACEAE	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Chiendent dactyle	I	R?	DD						
POACEAE	<i>Cynosurus cristatus</i> L.	Cynosure crételle [Crételle]	I	C	LC						
POACEAE	<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle aggloméré	I(NC)	CC	LC	ap	?				
POACEAE	<i>Dactylis glomerata</i> L. var. <i>abbreviata</i> (Link) Lange	Dactyle aggloméré (var.)	I	?	DD						
POACEAE	<i>Dactylis glomerata</i> L. var. <i>glomerata</i>	Dactyle aggloméré (var.)	I(NC)	CC	LC	ap	?				
POACEAE	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC.	Danthonie décombante (s.l.)	I	AR	NT			oui			
POACEAE	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC. subsp. <i>decipiens</i> O. Schwarz et Bässler ex Bässler	Danthonie trompeuse	??	??	??			[oui]			
POACEAE	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC. subsp. <i>decumbens</i>	Danthonie décombante [Sieglingie décombante]	I	AR	NT			oui			
POACEAE	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) Beauv.	Canche cespiteuse	I	AC	LC						
POACEAE	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) Beauv. subsp. <i>convoluta</i> (Rouy) P. Fourn.	Canche à feuilles enroulées	??	??	??						
POACEAE	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) Beauv. var. <i>cespitosa</i>	Canche cespiteuse (var.)	I	?	DD						
POACEAE	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) Beauv. var. <i>parviflora</i> (Thuill.) Coss. et Germ.	Canche cespiteuse (var.)	I	?	DD						
POACEAE	<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	Canche flexueuse	I	C	LC						
POACEAE	<i>Deschampsia media</i> (Gouan) Roem. et Schult.	Canche intermédiaire	I	D	EX			(oui)			(R)
POACEAE	<i>Deschampsia setacea</i> (Huds.) Hack.	Canche des marais	I	D	EX			(oui)			E(V);(R)
POACEAE	<i>Digitaria ischaemum</i> (Schreb. ex Schweigg.) Muhlenb.	Digitaire glabre	I	R?	DD						
POACEAE	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Digitaire sanguine	I	AR?	DD						
POACEAE	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop. var. <i>atricha</i> (Aschers. et Graebn.) Henrard	Digitaire sanguine (var.)	I	?	DD						
POACEAE	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop. var. <i>sanguinalis</i>	Digitaire sanguine (var.)	I	?	DD						
POACEAE	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Beauv.	Échinochloa pied-de-coq (s.l.) [Pied-de-coq]	I	PC?	DD						
POACEAE	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Beauv. subsp. <i>crus-galli</i>	Échinochloa pied-de-coq [Pied-de-coq]	I	PC?	DD						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
POACEAE	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Beauv. subsp. <i>crus-galli</i> var. <i>crus-galli</i>	Échinochloa pied-de-coq (var.) [Pied-de-coq]	I	PC?	DD						
POACEAE	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Beauv. subsp. <i>crus-galli</i> var. <i>submutica</i> Opiz	Échinochloa pied-de-coq (var.) [Pied-de-coq]	I	PC?	DD						
POACEAE	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Beauv. subsp. <i>spiralis</i> (Vasing.) Tzvelev	Échinochloa spirale [Pied-de-coq]	??	??	??						
POACEAE	<i>Echinochloa muricata</i> (Beauv.) Fernald	Échinochloa muriqué (s.l.)	A	E	H						
POACEAE	<i>Echinochloa muricata</i> (Beauv.) Fernald subsp. <i>microstachya</i> (Wiegand) Jauzein	Échinochloa à petits épis	A	E	H						
POACEAE	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	Éleusine des Indes (s.l.)	A	D	H						
POACEAE	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn. subsp. <i>africana</i> (Kennedy-O'Byrne) S.M. Phillips	Éleusine d'Afrique	??	??	??						
POACEAE	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn. subsp. <i>indica</i>	Éleusine des Indes	??	??	??						
POACEAE	<i>Eleusine tristachya</i> (Lam.) Lam.	Éleusine à trois épis	A	E	H						
POACEAE	<i>Elymus athericus</i> (Link) Kerguelen	Élyme piquant	I	RR	NT			oui			
POACEAE	<i>Elymus campestris</i> (Godr. et Gren.) Kerguelen	Élyme champêtre (s.l.)	I	?	DD						
POACEAE	<i>Elymus campestris</i> (Godr. et Gren.) Kerguelen subsp. <i>campestris</i>	Élyme champêtre [Chiendent des champs]	I	?	DD						
POACEAE	<i>Elymus campestris</i> (Godr. et Gren.) Kerguelen subsp. <i>maritimus</i> (Tzvelev) Lambinon	Élyme des sables [Chiendent des sables]	??	??	??						
POACEAE	<i>Elymus caninus</i> (L.) L.	Élyme des chiens [Chiendent commun]	I	AR	NT			oui			
POACEAE	<i>Elymus farctus</i> (Viv.) Runemark ex Melderis	Élyme à feuilles de jonc (s.l.) [Chiendent à feuilles de jonc]	I	E	EN			oui			R
POACEAE	<i>Elymus farctus</i> (Viv.) Runemark ex Melderis subsp. <i>boreoatlanticus</i> (Simonet et Guinochet) Melderis	Élyme nord-atlantique [Chiendent à feuilles de jonc]	I	E	EN			oui			R
POACEAE	<i>Elymus repens</i> (L.) Gould	Élyme rampant [Chiendent commun]	I	CC	LC						
POACEAE	<i>Elymus ×acutus</i> (DC.) Thiébaud nsubsp. <i>obtusiusculus</i> (Lange) Lambinon [<i>Elymus athericus</i> (Link) Kerguelen × <i>Elymus farctus</i> (Viv.) Runemark ex Melderis subsp. <i>boreoatlanticus</i> (Simonet et Guinochet) Melderis]	Élyme à glumes obtuses	I	?	H						
POACEAE	<i>Elymus ×drucei</i> (Stace) Lambinon [<i>Elymus athericus</i> (Link) Kerguelen × <i>Elymus repens</i> (L.) Gould]	Élyme de Druce	??	??	??						
POACEAE	<i>Elymus ×laxus</i> (Fries) Melderis et McClintock [<i>Elymus farctus</i> (Viv.) Runemark ex Melderis subsp. <i>boreoatlanticus</i> (Simonet et Guinochet) Melderis × <i>Elymus repens</i> (L.) Gould]	Élyme lâche	??	??	??						
POACEAE	<i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Vign.-Lut. ex Janchen	Éragrostis de Cigliano	A	D?	H						
POACEAE	<i>Eragrostis curvula</i> (Schrad.) Nees	Éragrostis courbé	A	E	H						
POACEAE	<i>Eragrostis mexicana</i> (Hornem.) Link	Éragrostis du Mexique	A	E	H						
POACEAE	<i>Eragrostis minor</i> Host	Éragrostis faux-pâturin	A	E	H						
POACEAE	<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) Beauv.	Éragrostis poilu (s.l.)	A	E	H						
POACEAE	<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) Beauv. subsp. <i>damiensiana</i> (Bonnet) Thell.	Éragrostis à tiges nombreuses	A	E	H						
POACEAE	<i>Eragrostis virescens</i> J. Presl	Éragrostis verdâtre	A	E	H						
POACEAE	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Fétuque roseau (s.l.)	I(NC)	C	LC	ap	?				
POACEAE	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb. subsp. <i>arundinacea</i>	Fétuque roseau	I(NC)	C	LC	ap	?				

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
POACEAE	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb. subsp. <i>arundinacea</i> var. <i>arundinacea</i>	Fétuque roseau (var.)	I(NC)	?	DD	ap	?				
POACEAE	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb. subsp. <i>arundinacea</i> var. <i>aspera</i> (Mutel) Aschers. et Graebn.	Fétuque roseau (var.)	N?	?	H						
POACEAE	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb. subsp. <i>fenas</i> (Lag.) Arcang.	Fétuque fenasse	A	D	H						
POACEAE	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb. subsp. <i>mediterranea</i> (Hack.) K. Richt.	Fétuque méditerranéenne	??	??	??						
POACEAE	<i>Festuca brevipila</i> R. Tracey	Fétuque à feuilles rudes	NC	?	H	p	?		P		
POACEAE	<i>Festuca brevipila</i> R. Tracey var. <i>brevipila</i>	Fétuque à feuilles rudes (var.)	??	??	??				[P]		
POACEAE	<i>Festuca brevipila</i> R. Tracey var. <i>multinervis</i> (Stohr) Dengler	Fétuque à feuilles rudes (var.)	??	??	??				[P]		
POACEAE	<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	Fétuque capillaire	I	AC	LC						
POACEAE	<i>Festuca filiformis</i> Pourr. f. <i>filiformis</i>	Fétuque capillaire (f.)	I	AC	LC						
POACEAE	<i>Festuca filiformis</i> Pourr. f. <i>mucronata</i> (Auquier) Kerguelen et Plonka	Fétuque capillaire (f.)	??	??	??						
POACEAE	<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill.	Fétuque géante	I	AC	LC						
POACEAE	<i>Festuca heteropachys</i> (St-Yves) Patzke ex Auquier	Fétuque hétéropachyde	I	R?	DD						
POACEAE	<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	Fétuque hétérophylle	I	PC	LC						
POACEAE	<i>Festuca juncifolia</i> St-Amans	Fétuque à feuilles de jonc	??	??	??						
POACEAE	<i>Festuca lemanii</i> Bast.	Fétuque de Léman	I	AC	LC						
POACEAE	<i>Festuca longifolia</i> Thuill.	Fétuque à longues feuilles (s.l.)	I	E	CR			oui			R
POACEAE	<i>Festuca longifolia</i> Thuill. subsp. <i>longifolia</i>	Fétuque à longues feuilles	I	E	CR			oui			R
POACEAE	<i>Festuca marginata</i> (Hack.) K. Richt.	Fétuque marginée (s.l.)	I	R	LC			oui			
POACEAE	<i>Festuca marginata</i> (Hack.) K. Richt. subsp. <i>marginata</i>	Fétuque marginée	I	R	LC			oui			
POACEAE	<i>Festuca ovina</i> L.	Fétuque ovine (s.l.)	E								[E(Kp)]
POACEAE	<i>Festuca pallens</i> Host	Fétuque des rochers	E								
POACEAE	<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Fétuque des prés	I	AC	LC						
POACEAE	<i>Festuca rubra</i> L.	Fétuque rouge (s.l.)	I(C)	CC	LC	p	CC				Rp
POACEAE	<i>Festuca rubra</i> L. subsp. <i>arenaria</i> (Osbeck) Aresch.	Fétuque des sables	I	E	VU			oui			R
POACEAE	<i>Festuca rubra</i> L. subsp. <i>commutata</i> Gaudin	Fétuque variable	I	?	DD						
POACEAE	<i>Festuca rubra</i> L. subsp. <i>fallax</i> (Thuill.) Nyman	Fétuque trompeuse	I?(C)	?	NE	p	?				
POACEAE	<i>Festuca rubra</i> L. subsp. <i>junceae</i> (Hack.) K. Richt.	Fétuque jonciforme	I	?	DD						
POACEAE	<i>Festuca rubra</i> L. subsp. <i>litoralis</i> (G.F.W. Mey.) Auquier	Fétuque littorale	I	E	NT			oui			
POACEAE	<i>Festuca rubra</i> L. subsp. <i>microphylla</i> St-Yves	Fétuque à petites feuilles	C		H	p	?				
POACEAE	<i>Festuca rubra</i> L. subsp. <i>pruinosa</i> (Hack.) Piper	Fétuque pruneuse	I	R	LC			oui			

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
POACEAE	<i>Festuca rubra</i> L. subsp. <i>rubra</i>	Fétuque rouge	I(C)	CC	LC	p	CC				
POACEAE	<i>Gastridium ventricosum</i> (Gouan) Schinz et Thell.	Gastridie ventrue	I?	D	NE						
POACEAE	<i>Gaudinia fragilis</i> (L.) Beauv.	Gaudinie fragile	I	R	VU			oui			R
POACEAE	<i>Glyceria declinata</i> Bréb.	Glycérie dentée	I	?	DD						
POACEAE	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R. Brown	Glycérie flottante	I	C	LC						
POACEAE	<i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmberg	Glycérie aquatique	I	AR	LC						
POACEAE	<i>Glyceria notata</i> Chevall.	Glycérie pliée	I	?	DD						
POACEAE	<i>Glyceria striata</i> (Lam.) A.S. Hitchc.	Glycérie striée	N	E	H						
POACEAE	<i>Glyceria xpedicellata</i> F. Townsend [<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R. Brown x <i>Glyceria notata</i> Chevall.]	Glycérie pédicellée	??	??	??						
POACEAE	<i>Glyceria declinata</i> Bréb. x <i>G. fluitans</i> (L.) R. Brown		??	??	??						
POACEAE	<i>Glyceria declinata</i> Bréb. x <i>G. notata</i> Chevall.		??	??	??						
POACEAE	<i>Holcus lanatus</i> L.	Houlque laineuse	I	CC	LC						
POACEAE	<i>Holcus mollis</i> L.	Houlque molle	I	AC	LC						
POACEAE	<i>Holcus xhybridus</i> K. Wein [<i>Holcus lanatus</i> L. x <i>Holcus mollis</i> L.]	Houlque hybride	??	??	??						
POACEAE	<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Jessen ex Harz	Hordélyme d'Europe [Orge des bois]	I	R	NT			oui			
POACEAE	<i>Hordeum distichon</i> L.	Orge à deux rangs (s.l.)	C(SA)	?	H	a	AR				
POACEAE	<i>Hordeum distichon</i> L. subsp. <i>distichon</i>	Orge à deux rangs [Orge d'été ; Orge plate]	C(SA)	?	H	a	AR				
POACEAE	<i>Hordeum distichon</i> L. subsp. <i>zeocriton</i> (L.) Schinz et R. Keller	Orge en éventail [Riz d'Allemagne]	C		H	a	D				
POACEAE	<i>Hordeum marinum</i> Huds.	Orge maritime	I	D?	EX?			(oui)			(R)
POACEAE	<i>Hordeum murinum</i> L.	Orge queue-de-rat	I	AC	LC						
POACEAE	<i>Hordeum secalinum</i> Schreb.	Orge faux-seigle	I	AR	NT			oui			
POACEAE	<i>Hordeum vulgare</i> L.	Orge commune (s.l.)	C(SA)	C?	H	a	CC				
POACEAE	<i>Hordeum vulgare</i> L. subsp. <i>hexastichon</i> (L.) Celak.	Orge à six rangs [Escourgeon]	C(SA)	C?	H	a	CC				
POACEAE	<i>Hordeum vulgare</i> L. subsp. <i>vulgare</i>	Orge commune [Orge carrée]	C(SA)	AC?	H	a	C				
POACEAE	<i>Koeleria albescens</i> DC.	Koellerie blanchâtre	??	??	??						
POACEAE	<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult.	Koellerie grêle	I	?	DD						
POACEAE	<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) Beauv.	Koellerie pyramidale	I	AC	LC						
POACEAE	<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) Beauv. var. <i>pubescens</i> (Hausm.) Domin	Koellerie pyramidale (var.)	??	??	??						
POACEAE	<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) Beauv. var. <i>pyramidata</i>	Koellerie pyramidale (var.)	I	AC	LC						
POACEAE	<i>Koeleria vallesiana</i> (Honck.) Gaudin	Koellerie du Valais	I	E	EN			oui			R

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
POACEAE	<i>Lagurus ovatus</i> L.	Lagure ovoïde [Queue-de-lièvre]	A	E	H						
POACEAE	<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Swartz	Léersie à fleurs de riz [Faux-riz]	I	E?	DD			oui			
POACEAE	<i>Leymus arenarius</i> (L.) Hochst.	Leyme des sables [Elyme des sables]	I(C)	E	CR	j	R?	oui		N1	R
POACEAE	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	lvraie multiflore [Ray-grass d'Italie]	NC	AC	H	ap	AC				
POACEAE	<i>Lolium perenne</i> L.	lvraie vivace [Ray-grass commun]	I(NC)	CC	LC	ap	CC				
POACEAE	<i>Lolium remotum</i> Schrank	lvraie du lin	A	D	H						
POACEAE	<i>Lolium temulentum</i> L.	lvraie enivrante	I	D	EX			(oui)			(R)
POACEAE	<i>Lolium temulentum</i> L. var. <i>arvense</i> Liljeb.	lvraie enivrante (var.)	I	D	EX			(oui)			(R)
POACEAE	<i>Lolium temulentum</i> L. var. <i>temulentum</i>	lvraie enivrante (var.)	I	D	EX			(oui)			(R)
POACEAE	<i>Lolium ×boucheanum</i> Kunth [<i>Lolium multiflorum</i> Lam. × <i>Lolium perenne</i> L.]	lvraie de Bouché	??	??	??						
POACEAE	<i>Melica ciliata</i> L.	Mélique ciliée (s.l.)	I	E	EN			oui			R
POACEAE	<i>Melica ciliata</i> L. subsp. <i>ciliata</i>	Mélique ciliée	I	E	EN			oui			R
POACEAE	<i>Melica ciliata</i> L. subsp. <i>magnolii</i> (Godr. et Gren.) K. Richt.	Mélique de Magnol	E								
POACEAE	<i>Melica uniflora</i> Retz.	Mélique uniflore	I	C	LC						
POACEAE	<i>Mibora minima</i> (L.) Desv.	Mibore naine	I	R	VU			oui			R
POACEAE	<i>Milium effusum</i> L.	Millet étalé [Millet des bois]	I	C	LC						
POACEAE	<i>Miscanthus sinensis</i> Anderss.	Miscanthus du Japon	C		H	pj	?				
POACEAE	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	Molinie bleue (s.l.)	I	PC	LC						
POACEAE	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench subsp. <i>arundinacea</i> (Schrank) K. Richt.	Molinie roseau	??	??	??						
POACEAE	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench subsp. <i>caerulea</i>	Molinie bleue	I	PC	LC						
POACEAE	<i>Muhlenbergia mexicana</i> (L.) Trin.	Muhlenbergie du Mexique	A	E	H						
POACEAE	<i>Nardurus maritimus</i> (L.) Murb.	Nardure unilatéral	I	RR?	DD			oui			
POACEAE	<i>Nardurus maritimus</i> (L.) Murb. var. <i>maritimus</i>	Nardure unilatéral (var.)	I	RR?	DD			oui			
POACEAE	<i>Nardurus maritimus</i> (L.) Murb. var. <i>muticus</i> (Koch) De Langhe	Nardure unilatéral (var.)	??	??	??			[oui]			
POACEAE	<i>Nardus stricta</i> L.	Nard raide	I	E	CR			oui			R
POACEAE	<i>Panicum capillare</i> L.	Panic capillaire (s.l.) [Millet capillaire]	A	E	H						
POACEAE	<i>Panicum capillare</i> L. subsp. <i>barbipulvinatum</i> (Nash) Tzvelev	Panic barbu [Millet capillaire]	??	??	??						
POACEAE	<i>Panicum capillare</i> L. subsp. <i>capillare</i>	Panic capillaire [Millet capillaire]	??	??	??						
POACEAE	<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michaux	Panic à inflorescence dichotome	A	E?	H						
POACEAE	<i>Panicum miliaceum</i> L.	Panic millet (s.l.) [Millet commun]	A(C)	?	H	a	?				

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
POACEAE	<i>Panicum miliaceum</i> L. subsp. <i>agricola</i> H. Scholz et Mikoláš	Panic agricole [Millet commun]	??	??	??						
POACEAE	<i>Panicum miliaceum</i> L. subsp. <i>miliaceum</i>	Panic millet [Millet commun]	??	??	??						
POACEAE	<i>Panicum miliaceum</i> L. subsp. <i>ruderales</i> (Kitagawa) Tzvelev	Panic rudéral [Millet commun]	??	??	??						
POACEAE	<i>Parapholis incurva</i> (L.) C.E. Hubbard	Lepture courbé	E?(I?)	(D)	(NE)						
POACEAE	<i>Parapholis strigosa</i> (Dum.) C.E. Hubbard	Lepture maigre	I	E	CR			oui			R
POACEAE	<i>Paspalum dilatatum</i> Poiré	Paspale dilaté	A	D	H						
POACEAE	<i>Phalaris aquatica</i> L.	Alpiste aquatique	??	??	??						
POACEAE	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Alpiste roseau [Baldingère]	I	C	LC						
POACEAE	<i>Phalaris arundinacea</i> L. var. <i>picta</i> L.	Alpiste roseau (var.) [Baldingère à feuilles panachées]	C(S)	?	H	j	?				
POACEAE	<i>Phalaris canariensis</i> L.	Alpiste des Canaries	A(C)	?	H	a	D?				
POACEAE	<i>Phalaris minor</i> Retz.	Alpiste mineur	A	D	H						
POACEAE	<i>Phalaris paradoxa</i> L.	Alpiste paradoxal	A	D	H						
POACEAE	<i>Phleum arenarium</i> L.	Fléole des sables	I	E	VU			oui			R
POACEAE	<i>Phleum nodosum</i> L.	Fléole noueuse	I	AC?	DD						
POACEAE	<i>Phleum phleoides</i> (L.) Karst.	Fléole de Boehmer	I	R	NT			oui			
POACEAE	<i>Phleum pratense</i> L.	Fléole des prés	I	C	LC						
POACEAE	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud.	Phragmite commun [Roseau commun ; Phragmite]	I	C	LC						
POACEAE	<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel	I	CC	LC						
POACEAE	<i>Poa bulbosa</i> L.	Pâturin bulbeux	I	R	VU			oui			R
POACEAE	<i>Poa bulbosa</i> L. var. <i>bulbosa</i>	Pâturin bulbeux (var.)	I	?	DD						R
POACEAE	<i>Poa bulbosa</i> L. var. <i>vivipara</i> Koeler	Pâturin bulbeux (var.)	I	R	VU			oui			R
POACEAE	<i>Poa chaixii</i> Vill.	Pâturin de Chaix	N?	D?	H						
POACEAE	<i>Poa compressa</i> L.	Pâturin comprimé	I	PC?	DD						
POACEAE	<i>Poa infirma</i> Kunth	Pâturin faible	I	E?	DD			oui			
POACEAE	<i>Poa nemoralis</i> L.	Pâturin des bois	I	C	LC						
POACEAE	<i>Poa nemoralis</i> L. var. <i>firmula</i> Gaudin	Pâturin des bois (var.) [Pâturin raide]	I	?	DD						
POACEAE	<i>Poa nemoralis</i> L. var. <i>nemoralis</i>	Pâturin des bois (var.)	I	C	LC						
POACEAE	<i>Poa palustris</i> L.	Pâturin des marais	I	E?	DD			oui			
POACEAE	<i>Poa pratensis</i> L.	Pâturin des prés (s.l.)	I(NC)	C	LC	p	AC?				
POACEAE	<i>Poa pratensis</i> L. subsp. <i>angustifolia</i> (L.) Gaudin	Pâturin à feuilles étroites	I	AC?	DD						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
POACEAE	<i>Poa pratensis</i> L. subsp. <i>latifolia</i> (Weihe) Schübl. et Martens	Pâturin à larges feuilles	??	??	??						
POACEAE	<i>Poa pratensis</i> L. subsp. <i>latifolia</i> (Weihe) Schübl. et Martens var. <i>latifolia</i>	Pâturin à larges feuilles (var.)	??	??	??						
POACEAE	<i>Poa pratensis</i> L. subsp. <i>latifolia</i> (Weihe) Schübl. et Martens var. <i>maritima</i> Corb.	Pâturin à larges feuilles (var.) [Pâturin humble]	??	??	??						
POACEAE	<i>Poa pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Pâturin des prés	I(NC)	C	LC	p	AC?				
POACEAE	<i>Poa trivialis</i> L.	Pâturin commun (s.l.)	I(NC)	CC	LC	p	?				
POACEAE	<i>Poa trivialis</i> L. subsp. <i>trivialis</i>	Pâturin commun	I(NC)	CC	LC	p	?				
POACEAE	<i>Poa ×sanionis</i> Aschers. et Graebn. [<i>Poa pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i> × <i>Poa trivialis</i> L.]	Pâturin de Sanio	??	??	??						
POACEAE	<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf.	Polypogon de Montpellier	I	E	EN			oui			R
POACEAE	<i>Pseudarrhenatherum longifolium</i> (Thore) Rouy	Fausse-arrhénathère à longues feuilles	I	D	EX			(oui)			(R)
POACEAE	<i>Puccinellia distans</i> (L.) Parl.	Atropis distant	I	E	CR			oui			R
POACEAE	<i>Puccinellia fasciculata</i> (Torr.) E.P. Bicknell	Atropis fasciculé	??	??	??						
POACEAE	<i>Puccinellia maritima</i> (Huds.) Parl.	Atropis maritime	I	E	VU			oui			R
POACEAE	<i>Puccinellia rupestris</i> (With.) Fernald et Weath.	Atropis couché	I	D	EX			(oui)			(R)
POACEAE	<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev	Rostraire à crêtes	A	E?	H						
POACEAE	<i>Sclerochloa dura</i> (L.) Beauv.	Sclérochloa dur	A	E	H						
POACEAE	<i>Secale cereale</i> L.	Seigle cultivé [Seigle]	C(A)	?	H	a	?				
POACEAE	<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard.	Seslérie bleuâtre	I	PC	LC						
POACEAE	<i>Setaria italica</i> (L.) Beauv.	Sétaire d'Italie [Millet des oiseaux]	SA(C)	?	H	a	R?				
POACEAE	<i>Setaria pumila</i> (Poirét) Roem. et Schult.	Sétaire glauque	I	?	DD						
POACEAE	<i>Setaria verticillata</i> (L.) Beauv.	Sétaire verticillée	I	AR?	DD						
POACEAE	<i>Setaria verticillata</i> (L.) Beauv. var. <i>ambigua</i> (Guss.) Parl.	Sétaire verticillée (var.)	??	??	??						
POACEAE	<i>Setaria verticillata</i> (L.) Beauv. var. <i>verticillata</i>	Sétaire verticillée (var.)	I	AR?	DD						
POACEAE	<i>Setaria viridis</i> (L.) Beauv.	Sétaire verte	I	AR?	DD						
POACEAE	<i>Setaria viridis</i> (L.) Beauv. var. <i>major</i> (Gaudin) Pospichal	Sétaire verte (var.)	??	??	??						
POACEAE	<i>Setaria viridis</i> (L.) Beauv. var. <i>viridis</i>	Sétaire verte (var.)	I	AR?	DD						
POACEAE	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	Sorgho commun	??	??	??						
POACEAE	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Sorgho d'Alep	A	E	H						
POACEAE	<i>Spartina townsendii</i> H. et J. Groves	Spartine anglaise	Z	E	ZLC				A		
POACEAE	<i>Spartina townsendii</i> H. et J. Groves var. <i>anglica</i> (C.E. Hubbard) Lambinon et Maquet	Spartine anglaise (var.)	Z	E	ZLC				A		
POACEAE	<i>Spartina townsendii</i> H. et J. Groves var. <i>townsendii</i>	Spartine anglaise (var.)	??	??	??				[P]		

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
POACEAE	<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R. Brown	Sporobole des Indes	A	E	H						
POACEAE	<i>Stipa papposa</i> Nees	Stipe à feuilles ténues	C		H	p	E				
POACEAE	<i>Stipa pennata</i> L.	Stipe plumeuse [Plumet]	I	E	CR			oui		R1	R
POACEAE	<i>Tragus racemosus</i> (L.) All.	Tragus en grappe	A	D	H						
POACEAE	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) Beauv.	Triseté jaunâtre (s.l.)	I	AC	LC						
POACEAE	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) Beauv. subsp. <i>flavescens</i>	Triseté jaunâtre [Avoine dorée]	I	AC	LC						
POACEAE	<i>Triticum aestivum</i> L., nom. conserv.	Blé commun	C(SA)	C	H	a	CC				
POACEAE	<i>Triticum durum</i> Desf.	Blé dur	C(A)	E	H	a	D				
POACEAE	<i>Triticum monococcum</i> L.	Blé locular [Engrain ; Petite épeautre]	C		H	a	D				
POACEAE	<i>Triticum spelta</i> L.	Blé épeautre [Épeautre]	C		H	a	D				
POACEAE	<i>Triticum turgidum</i> L.	Blé renflé [Blé barbu ; Gros blé]	C		H	a	D				
POACEAE	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) S.F. Gray	Vulpie queue-d'écureuil	I	AR	LC						
POACEAE	<i>Vulpia ciliata</i> Dum.	Vulpie ciliée (s.l.)	I(N)	RR?	DD			oui			Rp
POACEAE	<i>Vulpia ciliata</i> Dum. subsp. <i>ambigua</i> (Le Gall) Stace et Auquier	Vulpie ambiguë	I	E	VU			oui			R
POACEAE	<i>Vulpia ciliata</i> Dum. subsp. <i>ciliata</i>	Vulpie ciliée	N	RR?	H						
POACEAE	<i>Vulpia fasciculata</i> (Forssk.) Fritsch	Vulpie à une glume	??	??	??						
POACEAE	<i>Vulpia membranacea</i> (L.) Dum.	Vulpie à longues arêtes	I	E?	DD			oui			
POACEAE	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C. Gmel.	Vulpie queue-de-rat	I	PC	LC						
POACEAE	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C. Gmel. var. <i>megalura</i> (Nutt.) Auquier	Vulpie queue-de-rat (var.)	??	??	??						
POACEAE	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C. Gmel. var. <i>myuros</i>	Vulpie queue-de-rat (var.)	I	PC	LC						
POACEAE	<i>Zea mays</i> L.	Maïs cultivé [Maïs]	C(S)	?	H	a	CC				
POACEAE	× <i>Agropogon littoralis</i> (Smith) C.E. Hubbard [<i>Agrostis stolonifera</i> L. × <i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf.]	Agropogon littoral	A	E?	H						
POACEAE	× <i>Festulolium loliaceum</i> (Huds.) P. Fourn. [<i>Festuca pratensis</i> Huds. × <i>Lolium perenne</i> L.]	Festulolium ivraie	I	?	H						
POLEMONIACEAE	<i>Navarretia cotulaefolia</i> (Benth.) Hook. et Arn.	Navarretie à feuilles de cotule	C(S)	D	H	j	?				
POLEMONIACEAE	<i>Polemonium caeruleum</i> L.	Polémoine bleue	C(NS)	D?	H	j	?			[N2]	
POLYGALACEAE	<i>Polygala amarella</i> Crantz	Polygala d'Autriche [Polygala amer]	E?(I)	(D?)	(EX?)						
POLYGALACEAE	<i>Polygala calcarea</i> F.W. Schultz	Polygala du calcaire	I	PC	LC						
POLYGALACEAE	<i>Polygala comosa</i> Schkuhr	Polygala chevelu	I	D?	EX?			(oui)			(R)
POLYGALACEAE	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose	Polygala à feuilles de serpolet	I	AR	NT			oui			
POLYGALACEAE	<i>Polygala vulgaris</i> L.	Polygala commun (s.l.)	I	AC	LC						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
POLYGALACEAE	<i>Polygala vulgaris</i> L. subsp. <i>oxyptera</i> (Reichenb.) Schübl. et Martens	Polygala à ailes aiguës	I	?	DD						
POLYGALACEAE	<i>Polygala vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	Polygala commun	I	AC	LC						
POLYGONACEAE	<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench	Sarrasin cultivé [Blé noir ; Sarrasin]	C(SA)	?	H	a	AR?				
POLYGONACEAE	<i>Fagopyrum tataricum</i> (L.) Gaertn.	Sarrasin de Tartarie	C(A)	D	H	a	D				
POLYGONACEAE	<i>Fallopia aubertii</i> (L. Henry) Holub	Vrillée d'Aubert [Renouée de Chine]	C(S)	?	H	pj	AR				
POLYGONACEAE	<i>Fallopia baldschuanica</i> (Regel) Holub	Vrillée de Bal'dzhuan	E?(SC)	(E)	(H)	j	?				
POLYGONACEAE	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á. Löve	Vrillée liseron [Faux-liseron]	I	C	LC						
POLYGONACEAE	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á. Löve var. <i>convolvulus</i>	Vrillée liseron (var.) [Faux-liseron]	I	C	LC						
POLYGONACEAE	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á. Löve var. <i>subalata</i> (Lej. et Court.) D.H. Kent	Vrillée liseron (var.) [Faux-liseron]	I	?	DD						
POLYGONACEAE	<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub	Vrillée des buissons	I	RR?	DD			oui			
POLYGONACEAE	<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decraene	Vrillée du Japon [Renouée du Japon]	Z(C)	C	ZLC	j	?		A		
POLYGONACEAE	<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decraene var. <i>japonica</i>	Vrillée du Japon (var.) [Renouée du Japon]	Z(C)	C	ZLC	j	?		A		
POLYGONACEAE	<i>Fallopia sachalinensis</i> (F. Schmidt Petrop.) Ronse Decraene	Vrillée de Sakhaline [Renouée de Sakhaline]	N(C)	R?	H	j	?		P		
POLYGONACEAE	<i>Fallopia sponhemica</i> (Chmel et Chirkova) J.F. Baley [<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decraene × <i>Fallopia sachalinensis</i> (F. Schmidt Petrop.) Ronse Decraene]	Vrillée de Bohème [Renouée de Bohème]	??	??	??				[P]		
POLYGONACEAE	<i>Persicaria amphibia</i> (L.) S.F. Gray	[Renouée amphibie]	I	AC	LC						
POLYGONACEAE	<i>Persicaria bistorta</i> (L.) Samp.	[Renouée bistorte, Bistorte]	I(C)	RR	CR	p	E	oui			R
POLYGONACEAE	<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach	[Renouée poivre-d'eau, Poivre d'eau]	I	C	LC						
POLYGONACEAE	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre	[Renouée à feuilles de patience (s.l.)]	I	CC	LC						
POLYGONACEAE	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre subsp. <i>brittingeri</i> (Opiz) Soják	[Renouée du Danube]	??	??	??						
POLYGONACEAE	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre subsp. <i>lapathifolia</i>	[Renouée à feuilles de patience]	I	?	DD						
POLYGONACEAE	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre subsp. <i>mesomorpha</i> (Danser) Soják	[Renouée intermédiaire]	I	?	DD						
POLYGONACEAE	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre subsp. <i>pallida</i> (With.) Á. Love	[Renouée pâle ; Renouée tomenteuse]	I	?	DD						
POLYGONACEAE	<i>Persicaria maculosa</i> S.F. Gray, nom. conserv. propos.	[Renouée persicaire, Persicaire]	I	CC	LC						
POLYGONACEAE	<i>Persicaria minor</i> (Huds.) Opiz	[Renouée mineure]	I	E?	DD			oui			
POLYGONACEAE	<i>Persicaria mitis</i> (Schränk) Asenov, nom. conserv. propos.	[Renouée douce]	I	E	CR			oui			R
POLYGONACEAE	<i>Persicaria wallichii</i> Greuter et Burdet	[Renouée à nombreux épis]	C(S)	E?	H	j	?				
POLYGONACEAE	<i>Polygonum aviculare</i> L.	Renouée des oiseaux (s.l.) [Traînage]	I	CC	LC						
POLYGONACEAE	<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	Renouée des oiseaux [Traînage]	I	CC	LC						
POLYGONACEAE	<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>depressum</i> (Meissner) Arcang.	Renouée des graviers [Traînage]	I	CC	LC						
POLYGONACEAE	<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>rurivagum</i> (Jord. ex Boreau) Berher	Renouée des guérets [Traînage]	A	?	H						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
POLYGONACEAE	<i>Rheum xrhubarbarum</i> L.	Rhubarbe cultivée	C		H	a(p)	C				
POLYGONACEAE	<i>Rumex acetosa</i> L.	Patience oseille [Oseille sauvage]	I	C	LC						
POLYGONACEAE	<i>Rumex acetosella</i> L.	Patience petite-oseille (s.l.) [Petite oseille]	I	AC	LC						
POLYGONACEAE	<i>Rumex acetosella</i> L. subsp. <i>acetosella</i>	Patience petite-oseille [Petite oseille]	E?(I)	(E?)	(DD)						
POLYGONACEAE	<i>Rumex acetosella</i> L. subsp. <i>acetosella</i> var. <i>acetosella</i>	Patience petite-oseille (var.) [Petite oseille]	??	??	??			[oui]			
POLYGONACEAE	<i>Rumex acetosella</i> L. subsp. <i>acetosella</i> var. <i>tenuifolius</i> Wallr.	Patience petite-oseille (var.) [Petite oseille]	??	??	??			[oui]			
POLYGONACEAE	<i>Rumex acetosella</i> L. subsp. <i>pyrenaicus</i> (Pourr. ex Lapeyr.) Akeroyd	Patience à fruits soudés [Petite oseille]	I	AC	LC						
POLYGONACEAE	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Patience agglomérée	I	C	LC						
POLYGONACEAE	<i>Rumex crispus</i> L.	Patience crépue	I	CC	LC						
POLYGONACEAE	<i>Rumex crispus</i> L. var. <i>crispus</i>	Patience crépue (var.)	I	CC	LC						
POLYGONACEAE	<i>Rumex crispus</i> L. var. <i>littoreus</i> Hardy	Patience crépue (var.)	I	?	DD						
POLYGONACEAE	<i>Rumex crispus</i> L. var. <i>uliginosus</i> Le Gall	Patience crépue (var.)	I	RR?	DD			oui			
POLYGONACEAE	<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds.	Patience des eaux	I	PC	LC						
POLYGONACEAE	<i>Rumex maritimus</i> L.	Patience maritime	I	E?	DD			oui			
POLYGONACEAE	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Patience à feuilles obtuses (s.l.)	I	CC	LC						
POLYGONACEAE	<i>Rumex obtusifolius</i> L. subsp. <i>obtusifolius</i>	Patience à feuilles obtuses [Patience sauvage]	I	CC	LC						
POLYGONACEAE	<i>Rumex obtusifolius</i> L. subsp. <i>transiens</i> (Simonk.) Rech. f.	Patience errante	??	??	??						
POLYGONACEAE	<i>Rumex palustris</i> Smith	Patience des marais	I	?	DD						
POLYGONACEAE	<i>Rumex patientia</i> L.	Patience des moines [Épinard immortel]	S(NC)	E?	H	a	RR				
POLYGONACEAE	<i>Rumex pulcher</i> L.	Patience élégante	I	RR?	DD			oui			
POLYGONACEAE	<i>Rumex rugosus</i> Campd.	Oseille cultivée [Oseille]	C		H	a	AC				
POLYGONACEAE	<i>Rumex sanguineus</i> L.	Patience sanguine [Sang-de-dragon]	I(SC)	C	LC	j	E?				
POLYGONACEAE	<i>Rumex sanguineus</i> L. var. <i>sanguineus</i>	Patience sanguine (var.) [Sang-de-dragon]	S(C)	D?	H	j	E?				
POLYGONACEAE	<i>Rumex sanguineus</i> L. var. <i>viridis</i> (Sibth.) Koch	Patience sanguine (var.) [Patience des bois]	I	C	LC						
POLYGONACEAE	<i>Rumex scutatus</i> L.	Patience à écussons [Oseille ronde]	N	D?	H						
POLYGONACEAE	<i>Rumex thyrsoiflorus</i> Fingerh.	Patience à fleurs en thyse [Oseille à oreillettes]	Z	R?	ZDD				P		
POLYGONACEAE	<i>Rumex xduftii</i> Hausskn. [<i>Rumex obtusifolius</i> L. × <i>Rumex sanguineus</i> L.]	Patience de Duft	I	E	H						
POLYGONACEAE	<i>Rumex xheterophyllus</i> C.F. Schultz [<i>Rumex aquaticus</i> L. × <i>Rumex hydrolapathum</i> Huds.]	Patience hétérophylle	I	E?	H						
POLYGONACEAE	<i>Rumex xpratensis</i> Mert. et Koch [<i>Rumex crispus</i> L. × <i>Rumex obtusifolius</i> L.]	Patience des prés	I	?	H						
POLYGONACEAE	<i>Rumex xruhmeri</i> Hausskn. [<i>Rumex conglomeratus</i> Murray × <i>Rumex sanguineus</i> L.]	Patience de Ruhmer	??	??	??						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
PONTEDERIAACEAE	<i>Pontederia cordata</i> L.	Pontédérie à feuilles en cœur	C		H	p	?				
PORTULACACEAE	<i>Claytonia perfoliata</i> Donn ex Willd.	Claytonie perfoliée	N	E	H						
PORTULACACEAE	<i>Montia fontana</i> L.	Montie des fontaines (s.l.)	I	E	CR			oui			R
PORTULACACEAE	<i>Montia fontana</i> L. subsp. <i>amporitana</i> Sennen	Montie du Portugal	I	E	CR			oui			R
PORTULACACEAE	<i>Montia minor</i> C.C. Gmel.	Montie naine	I	E	CR			oui			R
PORTULACACEAE	<i>Portulaca oleracea</i> L.	Pourpier potager (s.l.)	Z(A?C)	R?	ZDD	a	?				
PORTULACACEAE	<i>Portulaca oleracea</i> L. subsp. <i>granulostellulata</i> (Poelln.) Danin et H.G. Baker	Pourpier granuleux	??	??	??						
PORTULACACEAE	<i>Portulaca oleracea</i> L. subsp. <i>nitida</i> Danin et H.G. Baker	Pourpier luisant	??	??	??						
PORTULACACEAE	<i>Portulaca oleracea</i> L. subsp. <i>oleracea</i>	Pourpier potager	??(C)	??	??	a	?				
PORTULACACEAE	<i>Portulaca oleracea</i> L. subsp. <i>oleracea</i> var. <i>oleracea</i>	Pourpier potager (var.)	??	??	??						
PORTULACACEAE	<i>Portulaca oleracea</i> L. subsp. <i>oleracea</i> var. <i>sativa</i> (Haw.) DC.	Pourpier potager (var.)	C		H	a	?				
PORTULACACEAE	<i>Portulaca oleracea</i> L. subsp. <i>papillatostellulata</i> Danin et H.G. Baker	Pourpier papilleux	??	??	??						
PORTULACACEAE	<i>Portulaca oleracea</i> L. subsp. <i>stellata</i> Danin et H.G. Baker	Pourpier étoilé	??	??	??						
POTAMOGETONACEAE	<i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr.	Groenlandie dense [Potamot dense]	I	RR	EN			oui			R
POTAMOGETONACEAE	<i>Potamogeton acutifolius</i> Link	Potamot à feuilles aiguës	I	D	EX			(oui)			(R)
POTAMOGETONACEAE	<i>Potamogeton alpinus</i> Balb.	Potamot des Alpes	I	D	EX			(oui)			(R)
POTAMOGETONACEAE	<i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieb.	Potamot de Berchtold	I	RR	EN			oui			R
POTAMOGETONACEAE	<i>Potamogeton coloratus</i> Hornem.	Potamot coloré	I	E	CR			oui			R
POTAMOGETONACEAE	<i>Potamogeton compressus</i> L.	Potamot comprimé	I	D	EX			(oui)			(R)
POTAMOGETONACEAE	<i>Potamogeton crispus</i> L.	Potamot crépu	I	PC	LC						
POTAMOGETONACEAE	<i>Potamogeton gramineus</i> L.	Potamot graminée	I	D	EX			(oui)			(R)
POTAMOGETONACEAE	<i>Potamogeton lucens</i> L.	Potamot luisant	I	E	CR			oui			R
POTAMOGETONACEAE	<i>Potamogeton natans</i> L.	Potamot nageant	I	PC	NT			oui			
POTAMOGETONACEAE	<i>Potamogeton nodosus</i> Poirét	Potamot flottant	I	E	CR			(oui)			(R)
POTAMOGETONACEAE	<i>Potamogeton obtusifolius</i> Mert. et Koch	Potamot à feuilles obtuses	I	D	EX			(oui)			(R)
POTAMOGETONACEAE	<i>Potamogeton pectinatus</i> L.	Potamot pectiné	I	PC	LC						
POTAMOGETONACEAE	<i>Potamogeton perfoliatus</i> L.	Potamot perfolié	I	R	NT			oui			
POTAMOGETONACEAE	<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr.	Potamot à feuilles de renouée	I	E?	DD			oui			
POTAMOGETONACEAE	<i>Potamogeton praelongus</i> Wulfen	Potamot à longs pédoncules	E?(I)	(D)	(EX)						F1(V)
POTAMOGETONACEAE	<i>Potamogeton pusillus</i> L.	Potamot fluet	I	RR?	DD			oui			

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
POTAMOGETONACEAE	<i>Potamogeton trichoides</i> Cham. et Schlecht.	Potamot capillaire	I	E?	DD			oui			
PRIMULACEAE	<i>Anagallis arvensis</i> L.	Mouron des champs (s.l.)	I	CC	LC						
PRIMULACEAE	<i>Anagallis arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i>	Mouron des champs [Mouron rouge]	I	CC	LC						
PRIMULACEAE	<i>Anagallis arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i> f. <i>arvensis</i>	Mouron des champs (f.) [Mouron rouge]	I	CC	LC						
PRIMULACEAE	<i>Anagallis arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i> f. <i>azurea</i> Hyl.	Mouron des champs (f.)	I	?	DD						
PRIMULACEAE	<i>Anagallis arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i> f. <i>camea</i> (Schrank) Hyl.	Mouron des champs (f.)	I	?	DD						
PRIMULACEAE	<i>Anagallis arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i> f. <i>lilacina</i> (Alef.) Schinz et R. Keller	Mouron des champs (f.)	??	??	??						
PRIMULACEAE	<i>Anagallis arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i> f. <i>pallida</i> (Hook. f.) Hyl.	Mouron des champs (f.)	??	??	??						
PRIMULACEAE	<i>Anagallis arvensis</i> L. subsp. <i>foemina</i> (Mill.) Schinz et Thell.	Mouron bleu	I	R?	DD						
PRIMULACEAE	<i>Anagallis tenella</i> (L.) L.	Mouron délicat	I	E	CR			oui		R1	R
PRIMULACEAE	<i>Centunculus minimus</i> L.	Centenille naine [Centenille]	I	E	EN			oui			R
PRIMULACEAE	<i>Cyclamen hederifolium</i> Ait.	Cyclamen de Naples	C(NS)	?	H	j	?			A2<>1;C(2)	
PRIMULACEAE	<i>Glaux maritima</i> L.	Glaux maritime [Glaux]	I	E	CR			oui			R
PRIMULACEAE	<i>Hottonia palustris</i> L.	Hottonie des marais	I	RR	CR			oui		R1	R
PRIMULACEAE	<i>Lysimachia nemorum</i> L.	Lysimaque des bois	I	PC	LC						
PRIMULACEAE	<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Lysimaque nummulaire [Herbe aux écus]	I	PC	LC						
PRIMULACEAE	<i>Lysimachia punctata</i> L.	Lysimaque ponctuée	C(N)	E?	H	j	C				
PRIMULACEAE	<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Lysimaque commune [Herbe aux corneilles]	I	PC	LC						
PRIMULACEAE	<i>Primula elatior</i> (L.) Hill	Primevère élevée	I	PC	LC						
PRIMULACEAE	<i>Primula veris</i> L.	Primevère officinale (s.l.)	I	C	LC						
PRIMULACEAE	<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i>	Primevère officinale [Coucou]	I	C	LC						
PRIMULACEAE	<i>Primula vulgaris</i> Huds.	Primevère acaule	I(NSC)	AC	LC	j	?				
PRIMULACEAE	<i>Primula ×digenea</i> A. Kerner [<i>Primula vulgaris</i> Huds. × <i>Primula elatior</i> (L.) Hill.]	Primevère hybride	I	?	H						
PRIMULACEAE	<i>Primula ×media</i> Peterm. [<i>Primula elatior</i> (L.) Hill. × <i>Primula veris</i> L.]	Primevère intermédiaire	I	?	H						
PRIMULACEAE	<i>Primula ×polyantha</i> Mill. [<i>Primula vulgaris</i> Huds. × <i>Primula veris</i> L.]	Primevère à fleurs nombreuses	I	?	H						
PRIMULACEAE	<i>Samolus valerandi</i> L.	Samole de Valerandus [Mouron d'eau ; Samole]	I	RR	EN			oui			R
PYROLACEAE	<i>Pyrola chlorantha</i> Swartz	Pyrole à fleurs verdâtres	E?(N?)	(D)	(H)						
PYROLACEAE	<i>Pyrola minor</i> L.	Pyrole mineure	I	R	EN			oui			R
PYROLACEAE	<i>Pyrola rotundifolia</i> L.	Pyrole à feuilles rondes	I	E	CR			oui		N1p	E(Vp);R
PYROLACEAE	<i>Pyrola rotundifolia</i> L. var. <i>arenaria</i> Koch	Pyrole à feuilles rondes (var.) [Pyrole maritime]	I	E	CR			oui		N1	E(V);R

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
PYROLACEAE	<i>Pyrola rotundifolia</i> L. var. <i>rotundifolia</i>	Pyrole à feuilles rondes (var.)	I	E	CR			oui			R
RANUNCULACEAE	<i>Aconitum napellus</i> L.	Aconit napel (s.l.)	I(C)	RR	VU	j	AC	oui		R1;C0	Rp
RANUNCULACEAE	<i>Aconitum napellus</i> L. subsp. <i>lusitanicum</i> Rouy	Aconit du Portugal	I	RR	VU			oui		R1*;C0*	R
RANUNCULACEAE	<i>Aconitum napellus</i> L. subsp. <i>napellus</i>	Aconit napel	C?		H	j	??			R1*;C0*	
RANUNCULACEAE	<i>Aconitum napellus</i> L. subsp. <i>napellus</i> var. <i>giganteum</i> (Dum. ex Thielens) J. Duvigneaud	Aconit napel (var.)	C?		H	j	??			R1*;C0*	
RANUNCULACEAE	<i>Aconitum ×stoerkianum</i> Reichenb. [<i>Aconitum napellus</i> L. × <i>Aconitum variegatum</i> L.]	Aconit de Stoerck	??	??	??						
RANUNCULACEAE	<i>Actaea spicata</i> L.	Actée en épi	I	AR	NT			oui		R1	
RANUNCULACEAE	<i>Adonis aestivalis</i> L.	Adonide d'été	I	D?	EX?			(oui)			(R)
RANUNCULACEAE	<i>Adonis aestivalis</i> L. f. <i>aestivalis</i>	Adonide d'été (f.)	I	D?	EX?			(oui)			(R)
RANUNCULACEAE	<i>Adonis aestivalis</i> L. f. <i>citrina</i> (Hoffmann) Riedl	Adonide d'été (f.)	I	D	EX			(oui)			(R)
RANUNCULACEAE	<i>Adonis annua</i> L.	Adonide d'automne [Goutte-de-sang]	I	E	CR			oui			R
RANUNCULACEAE	<i>Adonis flammea</i> Jacq.	Adonide flamme	I	E	CR			oui			R
RANUNCULACEAE	<i>Adonis flammea</i> Jacq. f. <i>flammea</i>	Adonide flamme (f.)	I	E	CR			oui			R
RANUNCULACEAE	<i>Anemone nemorosa</i> L.	Anémone sylvie	I	CC	LC						
RANUNCULACEAE	<i>Anemone ranunculoides</i> L.	Anémone fausse-renoncule	I	E	CR			oui		R1	R
RANUNCULACEAE	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	Ancolie commune	IC(NS)	AR{AR,?,?}	NT	j(p)	C,E	oui			
RANUNCULACEAE	<i>Caltha palustris</i> L.	Populage des marais [Souci d'eau]	I	AC	LC						
RANUNCULACEAE	<i>Caltha palustris</i> L. var. <i>palustris</i>	Populage des marais (var.) [Souci d'eau]	I	AC	LC						
RANUNCULACEAE	<i>Clematis recta</i> L.	Clématite droite	C(S)	E	H	j	?				
RANUNCULACEAE	<i>Clematis vitalba</i> L.	Clématite des haies [Herbe aux gueux]	I	CC	LC						
RANUNCULACEAE	<i>Consolida ajacis</i> (L.) Schur	Pied-d'alouette d'Ajax	C(S)	?	H	j	AR?				
RANUNCULACEAE	<i>Consolida regalis</i> S.F. Gray	Pied-d'alouette des champs [Dauphinelle consoude ; Pied-d'alouette]	I	E	CR			oui			R
RANUNCULACEAE	<i>Eranthis hyemalis</i> (L.) Salisb.	Éranthe d'hiver	C(NS)	D	H	j	AR				
RANUNCULACEAE	<i>Helleborus foetidus</i> L.	Hellébore fétide	I(C)	AC	LC	j	R				
RANUNCULACEAE	<i>Helleborus viridis</i> L.	Hellébore vert (s.l.)	I(N?)	R	NT			oui			
RANUNCULACEAE	<i>Helleborus viridis</i> L. subsp. <i>occidentalis</i> (Reut.) Schiffn.	Hellébore occidentale	I(N?)	R	NT			oui			
RANUNCULACEAE	<i>Hepatica nobilis</i> Schreb.	Hépatique à trois lobes [Anémone hépatique]	I(C)	R	LC	j	R?	oui		R1	
RANUNCULACEAE	<i>Isopyrum thalictroides</i> L.	Isopyre faux-pigamon	I	E	CR			oui		R1	R
RANUNCULACEAE	<i>Myosurus minimus</i> L.	Ratoncule naine	I	RR	VU			oui			R
RANUNCULACEAE	<i>Nigella arvensis</i> L.	Nigelle des champs	I	D?	EX?			(oui)			F1(V);(R)

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
RANUNCULACEAE	<i>Nigella damascena</i> L.	Nigelle de Damas	C(S)	?	H	j	AC				
RANUNCULACEAE	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill.	Pulsatille commune [Anémone pulsatille]	I	AR	VU			oui		C0	R
RANUNCULACEAE	<i>Ranunculus acris</i> L.	Renoncule âcre (s.l.)	I	CC	LC						
RANUNCULACEAE	<i>Ranunculus acris</i> L. subsp. <i>acris</i>	Renoncule âcre	I	CC?	DD						
RANUNCULACEAE	<i>Ranunculus acris</i> L. subsp. <i>friesianus</i> (Jord.) Syme	Renoncule de Fries	I	?	DD						
RANUNCULACEAE	<i>Ranunculus aquatilis</i> L.	Renoncule aquatique	I	AR	NT			oui			
RANUNCULACEAE	<i>Ranunculus arvensis</i> L.	Renoncule des champs	I	D?	EW?			(oui)			(R)
RANUNCULACEAE	<i>Ranunculus auricomus</i> L.	Renoncule tête-d'or	I	AC	LC						
RANUNCULACEAE	<i>Ranunculus baudotii</i> Godr.	Renoncule de Baudot	I	RR	CR			oui			R
RANUNCULACEAE	<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Renoncule bulbeuse	I	C	LC						
RANUNCULACEAE	<i>Ranunculus circinatus</i> Sibth.	Renoncule en crosse	I	R	NT			oui			
RANUNCULACEAE	<i>Ranunculus ficaria</i> L.	Renoncule à bulbilles (s.l.) [Renoncule ficaire (s.l.)]	I	CC	LC						
RANUNCULACEAE	<i>Ranunculus ficaria</i> L. subsp. <i>fertilis</i> A.R. Clapham ex Laegaard	Renoncule fertile [Ficaire fausse-renoncule]	I	?	DD						
RANUNCULACEAE	<i>Ranunculus ficaria</i> L. subsp. <i>ficaria</i>	Renoncule à bulbilles [Ficaire à bulbilles]	I	CC	LC						
RANUNCULACEAE	<i>Ranunculus flammula</i> L.	Renoncule flammette [Petite douve]	I	AC	LC						
RANUNCULACEAE	<i>Ranunculus flammula</i> L. var. <i>flammula</i>	Renoncule flammette (var.) [Petite douve]	I	AC	LC						
RANUNCULACEAE	<i>Ranunculus flammula</i> L. var. <i>major</i> Schulth.	Renoncule flammette (var.) [Petite douve]	I	RR?	DD			oui			
RANUNCULACEAE	<i>Ranunculus fluitans</i> Lam.	Renoncule flottante	I	PC	LC						
RANUNCULACEAE	<i>Ranunculus gramineus</i> L.	Renoncule graminée	E?(I)	(D)	(EX)						
RANUNCULACEAE	<i>Ranunculus hederaceus</i> L.	Renoncule à feuilles de lierre	I	E	CR			oui			R
RANUNCULACEAE	<i>Ranunculus lanuginosus</i> L.	Renoncule laineuse	E								
RANUNCULACEAE	<i>Ranunculus lingua</i> L.	Renoncule langue [Grande douve]	I(C)	E	CR	pj	?	oui		N1	R
RANUNCULACEAE	<i>Ranunculus omiophyllus</i> Ten.	Renoncule de Lenormand	I	D	EX			(oui)			(R)
RANUNCULACEAE	<i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill.	Renoncule à feuilles d'ophioglosse	I	D	EX			(oui)		N1	(R)
RANUNCULACEAE	<i>Ranunculus paludosus</i> Poiret	Renoncule des marais	E?(I)	(D)	(EX)						
RANUNCULACEAE	<i>Ranunculus parviflorus</i> L.	Renoncule à petites fleurs	A?	D	H						
RANUNCULACEAE	<i>Ranunculus peltatus</i> Schrank	Renoncule peltée	I	R	NT			oui			
RANUNCULACEAE	<i>Ranunculus penicillatus</i> (Dum.) Bab.	Renoncule en pinceau (s.l.)	I	E	CR			oui			R
RANUNCULACEAE	<i>Ranunculus penicillatus</i> (Dum.) Bab. subsp. <i>penicillatus</i>	Renoncule en pinceau	??	??	??			[oui]			[R]
RANUNCULACEAE	<i>Ranunculus penicillatus</i> (Dum.) Bab. subsp. <i>pseudofluitans</i> (Syme) S. Webster	Renoncule des eaux calcaires	??	??	??			[oui]			[R]

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
RANUNCULACEAE	<i>Ranunculus polyanthemus</i> L.	Renoncule multiflore	E								
RANUNCULACEAE	<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante [Pied-de-poule]	I	CC	LC						
RANUNCULACEAE	<i>Ranunculus sardous</i> Crantz	Renoncule sardonie	I	AC	LC						
RANUNCULACEAE	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	Renoncule scélérate	I	PC	LC						
RANUNCULACEAE	<i>Ranunculus serpens</i> Schrank	Renoncule serpent (s.l.) [Renoncule des bois]	I	E	CR			oui			R
RANUNCULACEAE	<i>Ranunculus serpens</i> Schrank subsp. <i>nemorosus</i> (DC.) G. López	Renoncule des bois [Renoncule des bois]	I	E	CR			oui			R
RANUNCULACEAE	<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix	Renoncule à feuilles capillaires	I	R	NT			oui			
RANUNCULACEAE	<i>Ranunculus tripartitus</i> DC.	Renoncule tripartite	I	D?	EX?			(oui)			(R)
RANUNCULACEAE	<i>Thalictrum flavum</i> L.	Pigamon jaune	I	AR	VU			oui			R
RANUNCULACEAE	<i>Thalictrum minus</i> L.	Pigamon mineur (s.l.)	I	E	CR			oui			R
RANUNCULACEAE	<i>Thalictrum minus</i> L. subsp. <i>saxatile</i> Cesati	Pigamon des rochers [Pigamon des dunes ; Pigamon mineur]	I	E	CR			oui			R
RANUNCULACEAE	<i>Thalictrum simplex</i> L.	Pigamon simple	C		H	p	E				
RESEDACEAE	<i>Reseda alba</i> L.	Réséda blanc	A	E	H						
RESEDACEAE	<i>Reseda lutea</i> L.	Réséda jaune	I	C	LC						
RESEDACEAE	<i>Reseda luteola</i> L.	Réséda gaude [Gaude]	I	AC	LC						
RESEDACEAE	<i>Reseda phyteuma</i> L.	Réséda raiponce	I	E	CR			oui			R
RHAMNACEAE	<i>Frangula alnus</i> Mill.	Bourdaine commune [Bourdaine]	I	PC	LC						
RHAMNACEAE	<i>Rhamnus alaternus</i> L.	Nerprun alaterne [Alaterne]	C(N?S)	E	H	j	?				
RHAMNACEAE	<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Nerprun purgatif	I	AC	LC						
ROSACEAE	<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Aigremoine eupatoire	I	CC	LC						
ROSACEAE	<i>Agrimonia procera</i> Wallr.	Aigremoine odorante	I	AR	NT			oui			
ROSACEAE	<i>Alchemilla glabra</i> Neygenf.	Alchémille glabre	E								
ROSACEAE	<i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm.	Alchémille vert jaunâtre	I(C)	R	NT	p	E	oui			
ROSACEAE	<i>Aphanes arvensis</i> L.	Aphane des champs	I	C	LC						
ROSACEAE	<i>Aphanes australis</i> Rydb.	Aphane à petits fruits	I	RR	EN			oui			R
ROSACEAE	<i>Comarum palustre</i> L.	Comaret des marais	I	RR	CR			oui			R
ROSACEAE	<i>Duchesnea indica</i> (Andrews) Focke	Duchesnée des Indes	C(NS)	E	H	j	?				
ROSACEAE	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Filipendule ulmaire [Reine-des-prés]	I	C	LC						
ROSACEAE	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim. var. <i>denudata</i> (J. et C. Presl) Maxim.	Filipendule ulmaire (var.) [Reine-des-prés]	I	?	DD						
ROSACEAE	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim. var. <i>ulmaria</i>	Filipendule ulmaire (var.) [Reine-des-prés]	I	?	DD						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
ROSACEAE	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	Filipendule à six pétales [Filipendule]	I(N?C)	E	CR	p	E	oui			R
ROSACEAE	<i>Fragaria moschata</i> Weston	Fraisier musqué	I?(N?)	R?	NE						
ROSACEAE	<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier sauvage	I(C)	C	LC	a	?				
ROSACEAE	<i>Fragaria viridis</i> Weston	Fraisier vert	I	E	CR			oui			R
ROSACEAE	<i>Fragaria ×ananassa</i> (Weston) Decaisne et Naudin [<i>Fragaria chiloensis</i> (L.) Mill. × <i>Fragaria virginiana</i> Mill.]	Fraisier cultivé	C(NS)	?	H	a	CC				
ROSACEAE	<i>Geum rivale</i> L.	Benoîte des ruisseaux	I	R	VU			oui			R
ROSACEAE	<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte commune	I	CC	LC						
ROSACEAE	<i>Geum ×intermedium</i> Ehrh. [<i>Geum urbanum</i> L. × <i>Geum rivale</i> L.]	Benoîte intermédiaire	I	E	H						
ROSACEAE	<i>Potentilla anglica</i> Laichard.	Potentille d'Angleterre	I	RR	VU			oui			R
ROSACEAE	<i>Potentilla anserina</i> L.	Potentille des oies [Ansérine ; Argentine]	I	CC	LC						
ROSACEAE	<i>Potentilla anserina</i> L. var. <i>anserina</i>	Potentille des oies (var.) [Ansérine ; Argentine]	I	PC?	DD						
ROSACEAE	<i>Potentilla anserina</i> L. var. <i>sericea</i> Hayne	Potentille des oies (var.) [Ansérine ; Argentine]	I	CC	LC						
ROSACEAE	<i>Potentilla argentea</i> L.	Potentille argentée	I	R	NT			oui			
ROSACEAE	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Räuschel	Potentille tormentille [Tormentille]	I	AC	LC						
ROSACEAE	<i>Potentilla fruticosa</i> L.	Potentille frutescente	C		H	pj	C?			[N1]	
ROSACEAE	<i>Potentilla intermedia</i> L.	Potentille intermédiaire	A	D	H						
ROSACEAE	<i>Potentilla montana</i> Brot.	Potentille des montagnes	I	D?	EX?			(oui)			(R)
ROSACEAE	<i>Potentilla neumanniana</i> Reichenb.	Potentille printanière	I	AR	LC						
ROSACEAE	<i>Potentilla norvegica</i> L.	Potentille de Norvège (s.l.)	A	E	H						
ROSACEAE	<i>Potentilla norvegica</i> L. subsp. <i>monspeliensis</i> (L.) Aschers. et Graebn.	Potentille hérissée	??	??	??						
ROSACEAE	<i>Potentilla norvegica</i> L. subsp. <i>norvegica</i>	Potentille de Norvège	??	??	??						
ROSACEAE	<i>Potentilla recta</i> L.	Potentille droite	A(NC)	RR	H	p	E				
ROSACEAE	<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante [Quintefeuille]	I	CC	LC						
ROSACEAE	<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke	Potentille faux-fraisier [Faux-fraisier]	I	CC	LC						
ROSACEAE	<i>Potentilla supina</i> L.	Potentille couchée	A	E	H						
ROSACEAE	<i>Potentilla ×mixta</i> Nolte ex Reichenb. [<i>Potentilla anglica</i> Laichard. × <i>Potentilla reptans</i> L.]	Potentille mixte	E?(I)	(D)	(H)						
ROSACEAE	<i>Potentilla ×suberecta</i> Zimmeter [<i>Potentilla anglica</i> Laichard. × <i>Potentilla erecta</i> (L.) Räuschel]	Potentille fausse-tormentille	I	E	H						
ROSACEAE	<i>Rosa agrestis</i> Savi	Rosier agreste	I	?	DD						
ROSACEAE	<i>Rosa arvensis</i> Huds.	Rosier des champs	I	C	LC						
ROSACEAE	<i>Rosa caesia</i> Smith	Rosier bleuâtre	??	??	??						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
ROSACEAE	<i>Rosa canina</i> L. s. str.	Rosier des chiens (s.str.)	I	?	DD						
ROSACEAE	<i>Rosa carolina</i> L.	Rosier de Caroline	C(N)	D?	H	j	?				
ROSACEAE	<i>Rosa corymbifera</i> Borkh.	Rosier à corymbes	I	?	DD						
ROSACEAE	<i>Rosa dumalis</i> Bechst.	Rosier des halliers	I	RR?	DD			oui			
ROSACEAE	<i>Rosa elliptica</i> Tausch	Rosier elliptique	E?(I)	(?)	(DD)						
ROSACEAE	<i>Rosa foetida</i> J. Hermann	Rosier jaune	C(N)	D?	H	j	?				
ROSACEAE	<i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Smith	Rosier à petites fleurs	I	?	DD						
ROSACEAE	<i>Rosa obtusifolia</i> auct. non Desv.	Rosier à feuilles obtuses	I	?	DD						
ROSACEAE	<i>Rosa pseudoscabriuscula</i> (R. Keller) Henker et G. Schulze	Rosier faux-rosier scabre	??	??	??						
ROSACEAE	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosier rouillé [Églantier odorant]	I	?	DD						
ROSACEAE	<i>Rosa rugosa</i> Thunb.	Rosier rugueux	C(N)	?	H	pj	C		P		
ROSACEAE	<i>Rosa sherardii</i> Davies	Rosier de Sherard	??	??	??						
ROSACEAE	<i>Rosa spinosissima</i> L.	Rosier pimprenelle	I(C)	RR	CR	p	?	oui			R
ROSACEAE	<i>Rosa stylosa</i> Desv.	Rosier à longs styles	I	?	DD						
ROSACEAE	<i>Rosa tomentosa</i> Smith	Rosier tomenteux	I	R	NT			oui			
ROSACEAE	<i>Rosa villosa</i> L.	Rosier pomifère	??	??	??						
ROSACEAE	<i>Rosa xandegavensis</i> Bast. [<i>Rosa stylosa</i> Desv. × <i>Rosa canina</i> L. s. str.]	Rosier d'Anjou	I	?	H						
ROSACEAE	<i>Rosa xnitidula</i> Besser [<i>Rosa canina</i> L. s. str. × <i>Rosa rubiginosa</i> L.]	Rosier luisant	??	??	??						
ROSACEAE	<i>Rosa xscabriuscula</i> Smith [<i>Rosa canina</i> L. s. str. × <i>Rosa tomentosa</i> Smith]	Rosier scabre	??	??	??						
ROSACEAE	<i>Rosa xverticillacantha</i> Mérat [<i>Rosa arvensis</i> Huds. × <i>Rosa canina</i> L. s. str.]	Rosier spiralé	I	?	H						
ROSACEAE	<i>Rubus adscitus</i> Genev.	Ronce empruntée	??	??	??						
ROSACEAE	<i>Rubus adpersus</i> Weihe ex H.E. Weber	Ronce dispersée	??	??	??						
ROSACEAE	<i>Rubus arduennensis</i> Libert ex Lej.	Ronce des Ardennes	??	??	??						
ROSACEAE	<i>Rubus armeniacus</i> Focke	Ronce d'Arménie	??	??	??						
ROSACEAE	<i>Rubus caesius</i> L.	Ronce bleuâtre	I	C	LC						
ROSACEAE	<i>Rubus canadensis</i> L.	Ronce du Canada	??	??	??						
ROSACEAE	<i>Rubus canescens</i> DC.	Ronce tomenteuse	E?(I)	(?)	(DD)						
ROSACEAE	<i>Rubus divaricatus</i> P.J. Muell.	Ronce divariquée	??	??	??						
ROSACEAE	<i>Rubus edesii</i> H.E. Weber et A.L. Bull.	Ronce de Edees	??	??	??						
ROSACEAE	<i>Rubus flexuosus</i> P.J. Muell. et Lef.	Ronce flexueuse	??	??	??						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
ROSACEAE	<i>Rubus fruticosus</i> L.	Ronce frutescente	E?(I)	(?)	(DD)						
ROSACEAE	<i>Rubus gratus</i> Focke	Ronce agréable	??	??	??						
ROSACEAE	<i>Rubus idaeus</i> L.	Ronce framboisier [Framboisier]	I(SC)	PC	LC	a	C				
ROSACEAE	<i>Rubus macrophyllus</i> Weihe et Nees	Ronce à larges feuilles	I	?	DD						
ROSACEAE	<i>Rubus micans</i> Godr. et Gren.	Ronce brillante	??	??	??						
ROSACEAE	<i>Rubus nessensis</i> W. Hall	Ronce de Ness (s.l.)	??	??	??						
ROSACEAE	<i>Rubus nessensis</i> W. Hall subsp. <i>nessensis</i>	Ronce de Ness	??	??	??						
ROSACEAE	<i>Rubus nessensis</i> W. Hall subsp. <i>scissoides</i> H.E. Weber	Ronce faux-scissus	??	??	??						
ROSACEAE	<i>Rubus odoratus</i> L.	Ronce odorante	??	??	??						
ROSACEAE	<i>Rubus oreades</i> P.J. Muell. et Wirtg.	Ronce des Oréades	??	??	??						
ROSACEAE	<i>Rubus polyanthemus</i> Lindeb.	Ronce à fleurs nombreuses	??	??	??						
ROSACEAE	<i>Rubus prolectus</i> v.d. Beek	Ronce saillante	??	??	??						
ROSACEAE	<i>Rubus promachonicus</i> v.d. Beek		??	??	??						
ROSACEAE	<i>Rubus radula</i> Weihe	Ronce râpe	??	??	??						
ROSACEAE	<i>Rubus scissus</i> W.C.R. Watson	Ronce fendue	??	??	??						
ROSACEAE	<i>Rubus spectabilis</i> Pursh	Ronce admirable	C(??)	??	H	j	?				
ROSACEAE	<i>Rubus sprengelii</i> Weihe	Ronce de Sprengel	I	?	DD						
ROSACEAE	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Ronce à feuilles d'orme	I	C?	DD						
ROSACEAE	<i>Rubus vestitus</i> Weihe	Ronce vêtue	I	C?	DD						
ROSACEAE	<i>Rubus vigorosus</i> P.J. Muell. et Wirtg.	Ronce vigoureuse	??	??	??						
ROSACEAE	<i>Rubus ×amplifolius</i> Sudre [<i>Rubus caesius</i> L. × <i>Rubus ulmifolius</i> Schott]	Ronce à feuilles amples	??	??	??						
ROSACEAE	<i>Rubus ×pseudidaeus</i> (Weihe) Lej. [<i>Rubus caesius</i> L. × <i>Rubus idaeus</i> L.]	Ronce faux-framboisier	??	??	??						
ROSACEAE	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	Sanguisorbe pimprenelle (s.l.)	I	AC	LC						
ROSACEAE	<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. <i>balearica</i> (Bourgeau ex Nyman) Muñoz Garmendia et C. Navarro	Sanguisorbe muriquée	C(N?S)	?	H	p	?				
ROSACEAE	<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. <i>minor</i>	Sanguisorbe pimprenelle [Petite pimprenelle]	I	AC	LC						
ROSACEAE	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	Sanguisorbe officinale [Pimprenelle des bois ; Sanguisorbe]	I(C)	D	EX	p	E	(oui)			(R)
ROSACEAE	<i>Spiraea salicifolia</i> L.	Spirée à feuilles de saule	E?(SC)	(E)	(H)	j	?				
ROSACEAE	<i>Spiraea ×vanhouttei</i> Carr. [<i>Spiraea cantoniensis</i> Lour. × <i>Spiraea trilobata</i> L.]		C(S)	E?	H	j	?				
RUBIACEAE	<i>Asperula arvensis</i> L.	Aspérule des champs	I	D?	EX?			(oui)			(R)
RUBIACEAE	<i>Asperula cynanchica</i> L.	Aspérule à l'esquinancie [Herbe à l'esquinancie]	I	PC	LC						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
RUBIACEAE	<i>Asperula cynanchica</i> L. var. <i>cynanchica</i>	Aspérule à l'esquinancie (var.) [Herbe à l'esquinancie]	I	PC	LC						
RUBIACEAE	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Croisette velue [Gaillet croisette]	I	C	LC						
RUBIACEAE	<i>Galium aparine</i> L.	Gaillet gratteron	I	CC	LC						
RUBIACEAE	<i>Galium debile</i> Desv.	Gaillet chétif	I	D?	EX?			(oui)			(R)
RUBIACEAE	<i>Galium fleurotii</i> Jord.	Gaillet de Fleurot	I	R	NT			oui			E(R);F1(R)
RUBIACEAE	<i>Galium fleurotii</i> Jord. var. <i>gracilicaule</i> (Rouy) J. Duval	Gaillet de Fleurot (var.)	I	R	NT			oui			E(R*);F1(R*)
RUBIACEAE	<i>Galium glaucum</i> L.	Gaillet glauque	I	E	CR			oui			R
RUBIACEAE	<i>Galium mollugo</i> L.	Gaillet élevé (s.l.)	I	CC	LC						
RUBIACEAE	<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>erectum</i> Syme	Gaillet dressé [Caille-lait blanc]	I	CC	LC						
RUBIACEAE	<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>erectum</i> Syme var. <i>erectum</i>	Gaillet élevé (var.) [Caille-lait blanc]	I	CC	LC						
RUBIACEAE	<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>mollugo</i>	Gaillet élevé [Caille-lait blanc]	E?(I)	(?)	(DD)						
RUBIACEAE	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	Gaillet odorant [Aspérule odorante]	I	C	LC						
RUBIACEAE	<i>Galium palustre</i> L.	Gaillet des marais (s.l.)	I	AC	LC						
RUBIACEAE	<i>Galium palustre</i> L. subsp. <i>elongatum</i> (C. Presl) Lange	Gaillet allongé	I	?	DD						
RUBIACEAE	<i>Galium palustre</i> L. subsp. <i>palustre</i>	Gaillet des marais	I	?	DD						
RUBIACEAE	<i>Galium parisiense</i> L.	Gaillet de Paris	I	E?	DD			oui			(Rp)
RUBIACEAE	<i>Galium parisiense</i> L. var. <i>leiocarpum</i> Tausch	Gaillet de Paris (var.)	I	E?	DD			oui			
RUBIACEAE	<i>Galium parisiense</i> L. var. <i>parisiense</i>	Gaillet de Paris (var.)	I	D?	EX?			(oui)			(R)
RUBIACEAE	<i>Galium pumilum</i> Murray	Gaillet couché	I	PC	LC						
RUBIACEAE	<i>Galium pumilum</i> Murray var. <i>pubescens</i> (Schrad.) Schinz et Thell.	Gaillet couché (var.)	I	?	DD						
RUBIACEAE	<i>Galium pumilum</i> Murray var. <i>pumilum</i>	Gaillet couché (var.)	I	?	DD						
RUBIACEAE	<i>Galium saxatile</i> L.	Gaillet des rochers	I	AR	NT			oui			
RUBIACEAE	<i>Galium spurium</i> L.	Gaillet bâtard	I	D	EX			(oui)			(R)
RUBIACEAE	<i>Galium spurium</i> L. var. <i>spurium</i>	Gaillet bâtard (var.)	I	D	EX			(oui)			(R)
RUBIACEAE	<i>Galium sylvaticum</i> L.	Gaillet des forêts	E								
RUBIACEAE	<i>Galium tricorutum</i> Dandy	Gaillet à trois cornes	I	D	EX			(oui)			(R)
RUBIACEAE	<i>Galium uliginosum</i> L.	Gaillet des fanges	I	AR	VU			oui			R
RUBIACEAE	<i>Galium verum</i> L.	Gaillet jaune	I	C	LC						
RUBIACEAE	<i>Galium verum</i> L. var. <i>maritimum</i> DC.	Gaillet jaune (var.)	I	RR?	DD			oui			
RUBIACEAE	<i>Galium verum</i> L. var. <i>verum</i>	Gaillet jaune (var.)	I	C	LC						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
RUBIACEAE	<i>Galium</i> × <i>pomeranicum</i> Retz. [<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>erectum</i> Syme × <i>Galium verum</i> L.]	Gaillet de Poméranie	I	E?	H						
RUBIACEAE	<i>Rubia peregrina</i> L.	Garance voyageuse	I	AR	LC						
RUBIACEAE	<i>Rubia tinctorum</i> L.	Garance des teinturiers [Garance]	N?A(C)	?	H	i	D				
RUBIACEAE	<i>Sherardia arvensis</i> L.	Shérardie des champs	I	PC	LC						
RUBIACEAE	<i>Sherardia arvensis</i> L. var. <i>arvensis</i>	Shérardie des champs (var.)	I	PC	LC						
RUPPIACEAE	<i>Ruppia cirrhosa</i> (Petagna) Grande	Ruppie spiralée	I	E	CR			oui			R
RUPPIACEAE	<i>Ruppia maritima</i> L.	Ruppie maritime	I	E	CR			oui			R
RUTACEAE	<i>Ruta graveolens</i> L.	Rue fétide [Rue des jardins]	C(S)	D?	H	j	?				
SALICACEAE	<i>Populus alba</i> L.	Peuplier blanc [Ypréau]	C(S)	?	H	sp(j)	?				
SALICACEAE	<i>Populus nigra</i> L.	Peuplier noir	C(I?N?)	?	NE	p(j)	CC				
SALICACEAE	<i>Populus nigra</i> L. var. <i>italica</i> Muenchh.	Peuplier noir (var.) [Peuplier d'Italie]	C		H	pj	CC				
SALICACEAE	<i>Populus nigra</i> L. var. <i>nigra</i>	Peuplier noir (var.)	C(I?N?)	?	NE	pj	?				
SALICACEAE	<i>Populus tremula</i> L.	Peuplier tremble [Tremble]	I	C	LC						
SALICACEAE	<i>Populus trichocarpa</i> Torr. et A. Gray ex Hook.	Peuplier à fruits capillaires	C		H	s	?				
SALICACEAE	<i>Populus</i> × <i>canadensis</i> Moench	Peuplier du Canada	C		H	sp(j)	C				
SALICACEAE	<i>Populus</i> × <i>canadensis</i> Moench var. <i>canadensis</i>	Peuplier du Canada (var.)	??	??	??						
SALICACEAE	<i>Populus</i> × <i>canadensis</i> Moench var. <i>canadensis</i> f. <i>canadensis</i>	Peuplier du Canada (f.)	??	??	??						
SALICACEAE	<i>Populus</i> × <i>canadensis</i> Moench var. <i>canadensis</i> f. <i>eugenei</i> (Simon-Louis ex K. Koch) Schelle	Peuplier du Canada (f.)	??	??	??						
SALICACEAE	<i>Populus</i> × <i>canadensis</i> Moench var. <i>gelrica</i> (Houtzagers) Geerinck	Peuplier du Canada (var.)	??	??	??						
SALICACEAE	<i>Populus</i> × <i>canadensis</i> Moench var. <i>marilandica</i> (Bosc ex Poiret) Rehd.	Peuplier du Canada (var.)	??	??	??						
SALICACEAE	<i>Populus</i> × <i>canadensis</i> Moench var. <i>marilandica</i> (Bosc ex Poiret) Rehd. f. <i>marilandica</i> (Bosc ex Poiret) Geerinck	Peuplier du Canada (f.)	??	??	??						
SALICACEAE	<i>Populus</i> × <i>canadensis</i> Moench var. <i>marilandica</i> (Bosc ex Poiret) Rehd. f. <i>robusta</i> (Simon-Louis) Schelle	Peuplier du Canada (f.)	??	??	??						
SALICACEAE	<i>Populus</i> × <i>canescens</i> (Ait.) Smith [<i>Populus alba</i> L. × <i>Populus tremula</i> L.]	Peuplier blanchâtre [Grisard]	C(NS)	?	H	p(j)	?				
SALICACEAE	<i>Populus</i> × <i>generosa</i> A. Henry [<i>Populus deltoides</i> Marshall × <i>Populus trichocarpa</i> Torr. et A. Gray ex Hook.]	Peuplier généreux	C		H	sp(j)	?				
SALICACEAE	<i>Salix alba</i> L.	Saule blanc	I(C)	AC	LC	pj	?				
SALICACEAE	<i>Salix alba</i> L. var. <i>alba</i>	Saule blanc (var.)	I(C)	AC	LC	pj	?				
SALICACEAE	<i>Salix alba</i> L. var. <i>caerulea</i> (Smith) Dum.	Saule blanc (var.)	C	?	H	pj	?				
SALICACEAE	<i>Salix alba</i> L. var. <i>vitellina</i> (L.) Stokes	Saule blanc (var.)	C	?	H	pj	?				
SALICACEAE	<i>Salix atrocinerea</i> Brot.	Saule roux	I	PC?	DD						
SALICACEAE	<i>Salix aurita</i> L.	Saule à oreillettes	I	AR	NT			oui			

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
SALICACEAE	<i>Salix babylonica</i> L. var. <i>babylonica</i>	Saule de Babylone (var.)	E								
SALICACEAE	<i>Salix caprea</i> L.	Saule marsault	I	CC	LC						
SALICACEAE	<i>Salix cinerea</i> L.	Saule cendré	I	AC	LC						
SALICACEAE	<i>Salix elaeagnos</i> Scop.	Saule blanchâtre (s.l.)	C(S)	E?	H	p	?				
SALICACEAE	<i>Salix fragilis</i> L.	Saule fragile	I(C)	AR?	DD	p	?				
SALICACEAE	<i>Salix pentandra</i> L.	Saule à cinq étamines [Saule laurier]	C?		H	p	?				
SALICACEAE	<i>Salix purpurea</i> L.	Saule pourpre [Osier rouge]	I?N(C)	E?	NE	p	?				
SALICACEAE	<i>Salix purpurea</i> L. var. <i>lambertiana</i> (Smith) Koch	Saule pourpre (var.) [Saule de Lambert]	I?N(C)	E?	NE	p	?				
SALICACEAE	<i>Salix purpurea</i> L. var. <i>purpurea</i>	Saule pourpre (var.)	C		H	p	E?				
SALICACEAE	<i>Salix repens</i> L.	Saule rampant (s.l.)	I	RR	CR			oui			R
SALICACEAE	<i>Salix repens</i> L. subsp. <i>dunensis</i> Rouy	Saule argenté	I	E	CR			oui			R
SALICACEAE	<i>Salix repens</i> L. subsp. <i>repens</i>	Saule rampant	I	E	CR			oui			R
SALICACEAE	<i>Salix repens</i> L. subsp. <i>rosmarinifolia</i> (L.) Hartm.	Saule à feuilles de rosmarin	??	??	??			[oui]			[R]
SALICACEAE	<i>Salix triandra</i> L.	Saule à trois étamines [Saule amandier]	I(NC)	RR?	DD	p		oui			
SALICACEAE	<i>Salix viminalis</i> L.	Saule des vanniers [Osier blanc]	I(NC)	PC?	DD	p	?				
SALICACEAE	<i>Salix</i> × <i>capreola</i> A. Kerner ex Anderss. [<i>Salix aurita</i> L. × <i>Salix caprea</i> L.]	Saule capréole	??	??	??						
SALICACEAE	<i>Salix</i> × <i>charrieri</i> Chassagne [<i>Salix atrocinerea</i> Brot. × <i>Salix aurita</i> L.]	Saule de Charrier	I	E?	H						
SALICACEAE	<i>Salix</i> × <i>erythroclados</i> Simonk. [<i>Salix alba</i> L. × <i>Salix triandra</i> L.]	Saule à rameaux rouges	I(I?)	?	H						
SALICACEAE	<i>Salix</i> × <i>fruticosa</i> Döll [<i>Salix aurita</i> L. × <i>Salix viminalis</i> L.]	Saule frutescent	E?(I)	(D)	(H)						
SALICACEAE	<i>Salix</i> × <i>guinieri</i> Chassagne [<i>Salix atrocinerea</i> Brot. × <i>Salix cinerea</i> L.]	Saule de Guinier	I	?	H						
SALICACEAE	<i>Salix</i> × <i>holosericea</i> Willd. [<i>Salix cinerea</i> L. × <i>Salix viminalis</i> L.]	Saule de Smith	I	?	H						
SALICACEAE	<i>Salix</i> × <i>mollissima</i> Hoffmann ex Elwert [<i>Salix triandra</i> L. × <i>Salix viminalis</i> L.]	Saule très mou	I	?	H						
SALICACEAE	<i>Salix</i> × <i>multinervis</i> Döll [<i>Salix aurita</i> L. × <i>Salix cinerea</i> L.]	Saule multinervé	I	?	H						
SALICACEAE	<i>Salix</i> × <i>pendulina</i> Wender. [<i>Salix babylonica</i> L. × <i>Salix fragilis</i> L.]	Saule pendant	C		H	pj	?				
SALICACEAE	<i>Salix</i> × <i>quercifolia</i> Sennen ex Götz [<i>Salix atrocinerea</i> Brot. × <i>Salix caprea</i> L.]	Saule à feuilles de chêne	I	?	H						
SALICACEAE	<i>Salix</i> × <i>reichardtii</i> A. Kerner [<i>Salix caprea</i> L. × <i>Salix cinerea</i> L.]	Saule de Reichardt	I	?	H						
SALICACEAE	<i>Salix</i> × <i>rubens</i> Schrank [<i>Salix alba</i> L. × <i>Salix fragilis</i> L.]	Saule rougeâtre	I(C)	?	H	pj	?				
SALICACEAE	<i>Salix</i> × <i>rubra</i> Huds. [<i>Salix purpurea</i> L. × <i>Salix viminalis</i> L.]	Saule rouge	I?	?	H						
SALICACEAE	<i>Salix</i> × <i>sepulcralis</i> Simonk.	Saule sépulcral [Saule pleureur]	C		H	j(p)	AC?				
SALICACEAE	<i>Salix</i> × <i>sepulcralis</i> Simonk. nvar. <i>chrysocoma</i> (Dode) Meikle	Saule sépulcral (var.) [Saule pleureur]	C		H	j(p)	AC?				

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
SALICACEAE	<i>Salix ×sericans</i> Tausch ex A. Kerner [<i>Salix caprea</i> L. × <i>Salix viminalis</i> L.]	Saule soyeux	I(?)	?	H						
SALICACEAE	<i>Salix alba</i> L. × <i>S. viminalis</i> L.		??	??	??						
SANTALACEAE	<i>Thesium humifusum</i> DC.	Thésion couché	I	AR	NT			oui			
SAXIFRAGACEAE	<i>Chrysosplenium alternifolium</i> L.	Dorine à feuilles alternes	I	E	EN			oui			R
SAXIFRAGACEAE	<i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L.	Dorine à feuilles opposées	I	AR	NT			oui			
SAXIFRAGACEAE	<i>Darmera peltata</i> (Torr. ex Benth.) Voss ex Post et Kuntze	[Saxifrage peltée]	C(S)	E	H	j(p)	?				
SAXIFRAGACEAE	<i>Parnassia palustris</i> L.	Parnassie des marais	I	RR	CR			oui			R
SAXIFRAGACEAE	<i>Parnassia palustris</i> L. var. <i>condensata</i> Travis et Wheldon	Parnassie des marais (var.)	I	RR	CR			oui			R
SAXIFRAGACEAE	<i>Parnassia palustris</i> L. var. <i>palustris</i>	Parnassie des marais (var.)	I	D?	EX?			(oui)			(R)
SAXIFRAGACEAE	<i>Saxifraga granulata</i> L.	Saxifrage granulée	I	AR	NT			oui			
SAXIFRAGACEAE	<i>Saxifraga rotundifolia</i> L.	Saxifrage à feuilles rondes	E								
SAXIFRAGACEAE	<i>Saxifraga tridactylites</i> L.	Saxifrage tridactyle	I	C	LC						
SCROPHULARIACEAE	<i>Antirrhinum majus</i> L.	Muflier à grandes fleurs [Gueule-de-loup]	C(NS)	R?	H	j	AC?				
SCROPHULARIACEAE	<i>Chaenorhinum minus</i> (L.) Lange	Chaenorhine naine [Petite linaira]	I	PC	LC						
SCROPHULARIACEAE	<i>Cymbalaria muralis</i> P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.	Cymbalaire des murs (s.l.) [Cymbalaire ; Ruine de Rome]	Z	C	ZLC						
SCROPHULARIACEAE	<i>Cymbalaria muralis</i> P. Gaertn., B. Mey. et Scherb. subsp. <i>muralis</i>	Cymbalaire des murs [Cymbalaire ; Ruine de Rome]	Z	C	ZLC						
SCROPHULARIACEAE	<i>Cymbalaria muralis</i> P. Gaertn., B. Mey. et Scherb. subsp. <i>visianii</i> (Kümmerle ex Jáv.) D.A. Webb	Cymbalaire de Visiani	N	E	H						
SCROPHULARIACEAE	<i>Digitalis lutea</i> L.	Digitale jaune	I	PC	LC						
SCROPHULARIACEAE	<i>Digitalis purpurea</i> L.	Digitale pourpre [Gant de Notre-Dame]	I	C	LC						
SCROPHULARIACEAE	<i>Digitalis ×fucata</i> Ehrh. [<i>Digitalis lutea</i> L. × <i>Digitalis purpurea</i> L.]	Digitale fardée	I	E	H						
SCROPHULARIACEAE	<i>Euphrasia micrantha</i> Reichenb.	Euphrase à petites fleurs	I	RR?	DD			oui			
SCROPHULARIACEAE	<i>Euphrasia nemorosa</i> (Pers.) Wallr.	Euphrase des bois	I	?	DD						
SCROPHULARIACEAE	<i>Euphrasia officinalis</i> L.	Euphrase officinale (s.l.) [Casse-lunettes ; Euphrase glanduleuse]	I	?	DD						
SCROPHULARIACEAE	<i>Euphrasia officinalis</i> L. subsp. <i>campestris</i> (Jord.) Kerguelen et Lambinon	Euphrase champêtre [Casse-lunettes ; Euphrase glanduleuse]	I	?	DD						
SCROPHULARIACEAE	<i>Euphrasia officinalis</i> L. subsp. <i>rostkoviana</i> (Hayne) F. Townsend	Euphrase de Rostkovius [Casse-lunettes ; Euphrase glanduleuse]	I	?	DD						
SCROPHULARIACEAE	<i>Euphrasia stricta</i> J.P. Wolff ex Lehm.	Euphrase raide	I	PC	LC						
SCROPHULARIACEAE	<i>Euphrasia tetraquetra</i> (Bréb.) Arrond.	Euphrase à quatre angles	I	E	EN			oui			R
SCROPHULARIACEAE	<i>Euphrasia ×haussknechtii</i> Wettst. [<i>Euphrasia nemorosa</i> (Pers.) Wallr. × <i>Euphrasia stricta</i> J.P. Wolff ex Lehm.]	Euphrase de Haussknecht	??	??	??						
SCROPHULARIACEAE	<i>Gratiola officinalis</i> L.	Gratiolle officinale [Gratiolle]	I	D	EX			(oui)		N2	(R)
SCROPHULARIACEAE	<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dum.	Kickxie élatine [Velvete vraie]	I	PC?	DD						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
SCROPHULARIACEAE	<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dum.	Kickxie bâtarde [Fausse velvete]	I	AR?	DD						
SCROPHULARIACEAE	<i>Kickxia ×confinis</i> (Lacroix) Soó [<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dum. × <i>Kickxia spuria</i> (L.) Dum.]	Kickxie voisine	??	??	??						
SCROPHULARIACEAE	<i>Limosella aquatica</i> L.	Limoselle aquatique	I	D?	EX?			(oui)			(R)
SCROPHULARIACEAE	<i>Linaria arvensis</i> (L.) Desf.	Linaire des champs	I	D?	EX?			(oui)			(R)
SCROPHULARIACEAE	<i>Linaria purpurea</i> (L.) Mill.	Linaire pourpre	A	E	H						
SCROPHULARIACEAE	<i>Linaria repens</i> (L.) Mill.	Linaire striée	I	AR	LC						
SCROPHULARIACEAE	<i>Linaria simplex</i> (Willd.) DC.	Linaire simple	A	E	H						
SCROPHULARIACEAE	<i>Linaria supina</i> (L.) Chazelles	Linaire couchée	I	AR	LC						
SCROPHULARIACEAE	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Linaire commune [Linaire]	I	CC	LC						
SCROPHULARIACEAE	<i>Linaria ×sepium</i> Allman [<i>Linaria repens</i> (L.) Mill. × <i>Linaria vulgaris</i> Mill.]	Linaire des haies	I	E	H						
SCROPHULARIACEAE	<i>Melampyrum arvense</i> L.	Mélampyre des champs (s.l.)	I	R	NT			oui			
SCROPHULARIACEAE	<i>Melampyrum arvense</i> L. subsp. <i>arvense</i>	Mélampyre des champs [Rougeole ; Blé de vache]	I	R	NT			oui			
SCROPHULARIACEAE	<i>Melampyrum cristatum</i> L.	Mélampyre à crêtes	I	RR	EN			oui			R
SCROPHULARIACEAE	<i>Melampyrum pratense</i> L.	Mélampyre des prés	I	AC	LC						
SCROPHULARIACEAE	<i>Mimulus guttatus</i> DC.	Mimule tacheté	N(SC)	E	H	j	?				
SCROPHULARIACEAE	<i>Misopates orontium</i> (L.) Rafin.	Misopates rubicond [Tête-de-mort ; Muflier des champs]	I	RR	VU			oui			R
SCROPHULARIACEAE	<i>Odontites jaubertianus</i> (Boreau) D. Dietrich ex Walp.	Odontite de Jaubert	I	E	CR			oui		N1	E(I);R
SCROPHULARIACEAE	<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dum.	Odontite rouge (s.l.)	I	C	LC						
SCROPHULARIACEAE	<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dum. subsp. <i>serotinus</i> Corb.	Odontite tardive	I	C	LC						
SCROPHULARIACEAE	<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dum. subsp. <i>vernus</i>	Odontite rouge	I	?	DD						
SCROPHULARIACEAE	<i>Parentucellia viscosa</i> (L.) Caruel	Eufragie visqueuse	I(A)	E?{E?,E}	DD			oui			
SCROPHULARIACEAE	<i>Pedicularis palustris</i> L.	Pédiculaire des marais	I	D	EX			(oui)			(R)
SCROPHULARIACEAE	<i>Pedicularis sylvatica</i> L.	Pédiculaire des forêts	I	RR	CR			oui			R
SCROPHULARIACEAE	<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich	Rhinanthe velu (s.l.)	I	RR	EN			oui			R
SCROPHULARIACEAE	<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich subsp. <i>buccalis</i> (Wallr.) Schinz et Thell.	Rhinanthe champêtre [Rhinanthe velu]	I	RR	EN			oui			R
SCROPHULARIACEAE	<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich subsp. <i>buccalis</i> (Wallr.) Schinz et Thell. var. <i>arvensis</i> (Semler) U. Schneider	Rhinanthe champêtre (var.) [Rhinanthe velu]	I	?	DD			oui			R
SCROPHULARIACEAE	<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich subsp. <i>buccalis</i> (Wallr.) Schinz et Thell. var. <i>walrothii</i> (Rouy) Lambinon	Rhinanthe champêtre (var.) [Rhinanthe velu]	??	??	??			[oui]			[R]
SCROPHULARIACEAE	<i>Rhinanthus angustifolius</i> C.C. Gmel.	Rhinanthe à feuilles étroites (s.l.)	I	RR	EN			oui			R
SCROPHULARIACEAE	<i>Rhinanthus angustifolius</i> C.C. Gmel. subsp. <i>angustifolius</i>	Rhinanthe à feuilles étroites	??	??	??			[oui]			[R]
SCROPHULARIACEAE	<i>Rhinanthus angustifolius</i> C.C. Gmel. subsp. <i>grandiflorus</i> (Wallr.) D.A. Webb	Rhinanthe à grandes fleurs	I	RR	EN			oui			R

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
SCROPHULARIACEAE	<i>Rhinanthus minor</i> L.	Rhinanthe à petites fleurs (s.l.)	I	PC?	DD						Rp
SCROPHULARIACEAE	<i>Rhinanthus minor</i> L. subsp. <i>minor</i>	Rhinanthe à petites fleurs	I	PC?	DD						
SCROPHULARIACEAE	<i>Rhinanthus minor</i> L. subsp. <i>stenophyllus</i> (Schur) P. Fourn.	Rhinanthe tardive	I	E	CR			oui			R
SCROPHULARIACEAE	<i>Rhinanthus ×fallax</i> (Wimm. et Grab.) Chabert [<i>Rhinanthus angustifolius</i> C.C. Gmel. × <i>Rhinanthus minor</i> L.]	Rhinanthe trompeur	??	??	??						
SCROPHULARIACEAE	<i>Scrophularia auriculata</i> L.	Scrofulaire aquatique	I	AC	LC						
SCROPHULARIACEAE	<i>Scrophularia nodosa</i> L.	Scrofulaire noueuse	I	C	LC						
SCROPHULARIACEAE	<i>Scrophularia umbrosa</i> Dum.	Scrofulaire ailée (s.l.)	E?(I)	(D)	(EX)						
SCROPHULARIACEAE	<i>Scrophularia umbrosa</i> Dum. subsp. <i>neesii</i> (Wirtg.) E. Mayer	Scrofulaire de Nees	E								
SCROPHULARIACEAE	<i>Scrophularia umbrosa</i> Dum. subsp. <i>umbrosa</i>	Scrofulaire ailée	E?(I)	(D)	(EX)						
SCROPHULARIACEAE	<i>Scrophularia vernalis</i> L.	Scrofulaire printanière	N	E	H						
SCROPHULARIACEAE	<i>Sibthorpia europaea</i> L.	Sibthorpie d'Europe	I	D	EX			(oui)			(R)
SCROPHULARIACEAE	<i>Verbascum blattaria</i> L.	Molène blattaire	I	R	NT			oui			
SCROPHULARIACEAE	<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol.	Molène à fleurs denses	I	R?	DD						
SCROPHULARIACEAE	<i>Verbascum lychnitis</i> L.	Molène lychnite	I	R?	DD						
SCROPHULARIACEAE	<i>Verbascum lychnitis</i> L. f. <i>album</i> (Mill.) Koch	Molène lychnite (f.)	I	?	DD						
SCROPHULARIACEAE	<i>Verbascum lychnitis</i> L. f. <i>lychnitis</i>	Molène lychnite (f.)	I	?	DD						
SCROPHULARIACEAE	<i>Verbascum nigrum</i> L.	Molène noire	I	AC	LC						
SCROPHULARIACEAE	<i>Verbascum phlomoides</i> L.	Molène fausse-phlomide	I	RR	VU			oui			R
SCROPHULARIACEAE	<i>Verbascum phoeniceum</i> L.	Molène pourpre	A(C)	D	H	j	?				
SCROPHULARIACEAE	<i>Verbascum pulverulentum</i> Vill.	Molène floconneuse	I	R	NT			oui			
SCROPHULARIACEAE	<i>Verbascum sinuatum</i> L.	Molène sinuée	A	D	H						
SCROPHULARIACEAE	<i>Verbascum thapsus</i> L.	Molène bouillon-blanc [Bouillon blanc]	I	C	LC						
SCROPHULARIACEAE	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Molène effilée	A	E	H						
SCROPHULARIACEAE	<i>Verbascum ×ambiguum</i> Lej. [<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol. × <i>Verbascum nigrum</i> L.]	Molène ambiguë	I	D?	H						
SCROPHULARIACEAE	<i>Verbascum ×incanum</i> Gaudin [<i>Verbascum lychnitis</i> L. × <i>Verbascum nigrum</i> L.]	Molène tomenteuse	I	D?	H						
SCROPHULARIACEAE	<i>Verbascum ×interjectum</i> Pfund [<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol. × <i>Verbascum phlomoides</i> L.]	Molène interposée	I	E?	H						
SCROPHULARIACEAE	<i>Verbascum ×intermedium</i> Rupr. ex Berchtold et Pfund [<i>Verbascum blattaria</i> L. × <i>Verbascum nigrum</i> L.]	Molène intermédiaire	I	D	H						
SCROPHULARIACEAE	<i>Verbascum ×mixtum</i> Ramond ex DC. [<i>Verbascum nigrum</i> L. × <i>Verbascum pulverulentum</i> Vill.]	Molène mixte	I	D?	H						
SCROPHULARIACEAE	<i>Verbascum ×nothum</i> Koch [<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol. × <i>Verbascum pulverulentum</i> Vill.]	Molène métissée	I	D?	H						
SCROPHULARIACEAE	<i>Verbascum ×ramigerum</i> Link [<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol. × <i>Verbascum lychnitis</i> L.]	Molène ramifiée	I	D?	H						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
SCROPHULARIACEAE	<i>Verbascum xramosissimum</i> (Bast.) DC. [<i>Verbascum blattaria</i> L. x <i>Verbascum densiflorum</i> Bertol.]	Molène de Bastard	I	E?	H						
SCROPHULARIACEAE	<i>Verbascum xregelianum</i> Wirtg. [<i>Verbascum lychnitis</i> L. x <i>Verbascum pulverulentum</i> Vill.]	Molène de Regel	I	D?	H						
SCROPHULARIACEAE	<i>Verbascum xsemialbum</i> Chaub. [<i>Verbascum nigrum</i> L. x <i>Verbascum thapsus</i> L.]	Molène blanchâtre	I	?	H						
SCROPHULARIACEAE	<i>Verbascum xspurium</i> Koch [<i>Verbascum lychnitis</i> L. x <i>Verbascum thapsus</i> L.]	Molène bâtarde	I	D?	H						
SCROPHULARIACEAE	<i>Veronica acinifolia</i> L.	Véronique à feuilles d'acinos	I	E	CR			oui			R
SCROPHULARIACEAE	<i>Veronica agrestis</i> L.	Véronique agreste	I	PC?	DD						
SCROPHULARIACEAE	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	Véronique mouron-d'eau (s.l.)	I	PC	LC						
SCROPHULARIACEAE	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L. subsp. <i>anagallis-aquatica</i>	Véronique mouron-d'eau [Mouron d'eau]	I	?	DD						
SCROPHULARIACEAE	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L. subsp. <i>aquatica</i> Nyman	Véronique caténaire [Mouron d'eau]	I	?	DD						
SCROPHULARIACEAE	<i>Veronica arvensis</i> L.	Véronique des champs	I	C	LC						
SCROPHULARIACEAE	<i>Veronica beccabunga</i> L.	Véronique des ruisseaux	I	AC	LC						
SCROPHULARIACEAE	<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Véronique petit-chêne	I	CC	LC						
SCROPHULARIACEAE	<i>Veronica chamaedrys</i> L. var. <i>chamaedrys</i>	Véronique petit-chêne (var.)	I	CC	LC						
SCROPHULARIACEAE	<i>Veronica chamaedrys</i> L. var. <i>lamiifolia</i> (Hayne) G. Beck	Véronique petit-chêne (var.)	I	?	DD						
SCROPHULARIACEAE	<i>Veronica filiformis</i> Smith	Véronique filiforme	NC	?	H	j	?				
SCROPHULARIACEAE	<i>Veronica hederifolia</i> L.	Véronique à feuilles de lierre (s.l.)	I	C	LC						
SCROPHULARIACEAE	<i>Veronica hederifolia</i> L. subsp. <i>hederifolia</i>	Véronique à feuilles de lierre	I	C?	DD						
SCROPHULARIACEAE	<i>Veronica hederifolia</i> L. subsp. <i>lucorum</i> (Klett et Richt.) Hartl	Véronique des lisières	I	AC?	DD						
SCROPHULARIACEAE	<i>Veronica longifolia</i> L.	Véronique à longues feuilles	C		H	pj	{E,?}				
SCROPHULARIACEAE	<i>Veronica montana</i> L.	Véronique des montagnes	I	PC	LC						
SCROPHULARIACEAE	<i>Veronica officinalis</i> L.	Véronique officinale [Thé d'Europe]	I	AC	LC						
SCROPHULARIACEAE	<i>Veronica opaca</i> Fries	Véronique opaque	??	??	??						
SCROPHULARIACEAE	<i>Veronica peregrina</i> L.	Véronique voyageuse	Z	AR?	ZDD						
SCROPHULARIACEAE	<i>Veronica persica</i> Poiret	Véronique de Perse	I	CC	LC						
SCROPHULARIACEAE	<i>Veronica polita</i> Fries	Véronique luisante	I	AC?	DD						
SCROPHULARIACEAE	<i>Veronica praecox</i> All.	Véronique précoce	I	E?	DD			oui			
SCROPHULARIACEAE	<i>Veronica prostrata</i> L.	Véronique couchée (s.l.)	I	E	CR			oui			R
SCROPHULARIACEAE	<i>Veronica prostrata</i> L. subsp. <i>scheereri</i> J.P. Brandt	Véronique de Scheerer	I	E	CR			oui			R
SCROPHULARIACEAE	<i>Veronica scutellata</i> L.	Véronique à écussons	I	R	VU			oui			R
SCROPHULARIACEAE	<i>Veronica scutellata</i> L. var. <i>pilosa</i> Vahl	Véronique à écussons (var.)	I	?	DD			oui			R

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
SCROPHULARIACEAE	<i>Veronica scutellata</i> L. var. <i>scutellata</i>	Véronique à écussons (var.)	I	?	DD			oui			R
SCROPHULARIACEAE	<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	Véronique à feuilles de serpolet	I	C	LC						
SCROPHULARIACEAE	<i>Veronica spicata</i> L.	Véronique en épi	I	D?	EX?			(oui)			(R)
SCROPHULARIACEAE	<i>Veronica teucrium</i> L.	Véronique germandrée (s.l.)	I	AR	NT			oui			
SCROPHULARIACEAE	<i>Veronica teucrium</i> L. subsp. <i>teucrium</i>	Véronique germandrée	E?(S?)	(?)	(H)						
SCROPHULARIACEAE	<i>Veronica teucrium</i> L. subsp. <i>vahlil</i> Gaudin	Véronique de Vahl	I	AR	NT			oui			
SCROPHULARIACEAE	<i>Veronica triphyllos</i> L.	Véronique à trois lobes	I	D?	EX?			(oui)			(R)
SCROPHULARIACEAE	<i>Veronica verna</i> L.	Véronique printanière	I	D?	EX?			(oui)			(R)
SCROPHULARIACEAE	<i>Veronica xgodronii</i> Rouy [<i>Veronica chamaedrys</i> L. × <i>Veronica montana</i> L.]	Véronique de Godron	E?(I)	(E)	(H)						
SIMAROUBACEAE	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	Ailante glanduleux	C(NS)	?	H	j	?		A		
SOLANACEAE	<i>Atropa bella-donna</i> L.	Belladone vénéneuse [Belladone]	I(A?)	AR	LC						
SOLANACEAE	<i>Datura stramonium</i> L.	Datura stramoine [Stramoine]	Z	R	ZLC			oui			
SOLANACEAE	<i>Datura stramonium</i> L. var. <i>stramonium</i>	Datura stramoine (var.) [Stramoine]	Z(A)	R	ZLC			oui			
SOLANACEAE	<i>Datura stramonium</i> L. var. <i>stramonium</i> f. <i>inermis</i> (Juss. ex Jacq.) Hupke	Datura stramoine (f.) [Stramoine]	A	?	H						
SOLANACEAE	<i>Datura stramonium</i> L. var. <i>stramonium</i> f. <i>stramonium</i>	Datura stramoine (f.) [Stramoine]	Z	R	ZLC			oui			
SOLANACEAE	<i>Datura stramonium</i> L. var. <i>tatula</i> (L.) Torr.	Datura stramoine (var.) [Stramoine]	A	D?	H						
SOLANACEAE	<i>Datura stramonium</i> L. var. <i>tatula</i> (L.) Torr. f. <i>tatula</i> (L.) Danert	Datura stramoine (f.) [Stramoine]	??	??	??						
SOLANACEAE	<i>Hyoscyamus niger</i> L.	Jusquiame noire [Jusquiame]	I	E	EN			oui			R
SOLANACEAE	<i>Lycium barbarum</i> L.	Lyciet de Barbarie	C(NS)	?	H	j(p)	?		P		
SOLANACEAE	<i>Lycium chinense</i> Mill.	Lyciet de Chine	C(S)	?	H	j	?				
SOLANACEAE	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. nom. conserv.	Tomate comestible [Tomate]	C(S)	?	H	a	C				
SOLANACEAE	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill., nom. conserv. var. <i>cerasiforme</i> (Dun.) Alef.	[Tomate cerise]	C		H	a	AC				
SOLANACEAE	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill., nom. conserv. var. <i>esculentum</i>	[Tomate ronde]	C		H	a	C				
SOLANACEAE	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill., nom. conserv. var. <i>pyriforme</i> (Dun.) Alef.	[Tomate en poire]	C		H	a	?				
SOLANACEAE	<i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn.	Nicandre faux-coqueret	SC	D?	H	j	?				
SOLANACEAE	<i>Nicotiana rustica</i> L.	Tabac rustique [Tabac des paysans]	A	D	H						
SOLANACEAE	<i>Nicotiana tabacum</i> L.	Tabac de Virginie [Tabac]	A	D	H						
SOLANACEAE	<i>Physalis alkekengi</i> L.	Coqueret alkékege [Amour en cage]	IC(S?)	D	EX	j	AR?	(oui)			(Rp)
SOLANACEAE	<i>Physalis alkekengi</i> L. var. <i>alkekengi</i>	Coqueret alkékege (var.) [Amour en cage]	I	D	EX			(oui)			(R)
SOLANACEAE	<i>Physalis alkekengi</i> L. var. <i>franchetii</i> (Masters) Makino	Coqueret alkékege (var.) [Amour en cage]	C(S?)	?	H	j	AR?				

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
SOLANACEAE	<i>Physalis philadelphica</i> Lam.	Coqueret de Philadelphie	A	D	H						
SOLANACEAE	<i>Solanum dulcamara</i> L.	Morelle douce-amère	I	CC	LC						
SOLANACEAE	<i>Solanum dulcamara</i> L. f. <i>dulcamara</i>	Morelle douce-amère (f.)	I	CC	LC						
SOLANACEAE	<i>Solanum dulcamara</i> L. f. <i>littorale</i> Raab	Morelle douce-amère (f.)	I	?	DD						
SOLANACEAE	<i>Solanum nigrum</i> L.	Morelle noire (s.l.)	I(A)	C	LC						
SOLANACEAE	<i>Solanum nigrum</i> L. subsp. <i>nigrum</i>	Morelle noire [Crève-chien]	I	C	LC						
SOLANACEAE	<i>Solanum nigrum</i> L. subsp. <i>nigrum</i> var. <i>atriplicifolium</i> G.F.W. Mey.	Morelle noire (var.) [Crève-chien]	??	??	??						
SOLANACEAE	<i>Solanum nigrum</i> L. subsp. <i>nigrum</i> var. <i>atriplicifolium</i> G.F.W. Mey. f. <i>atriplicifolium</i> (G.F.W. Mey.) Wessely	Morelle noire (f.) [Crève-chien]	??	??	??						
SOLANACEAE	<i>Solanum nigrum</i> L. subsp. <i>nigrum</i> var. <i>atriplicifolium</i> G.F.W. Mey. f. <i>pallidum</i> Wessely	Morelle noire (f.) [Crève-chien]	??	??	??						
SOLANACEAE	<i>Solanum nigrum</i> L. subsp. <i>nigrum</i> var. <i>nigrum</i>	Morelle noire (var.) [Crève-chien]	I	C	LC						
SOLANACEAE	<i>Solanum nigrum</i> L. subsp. <i>nigrum</i> var. <i>nigrum</i> f. <i>chlorocarpum</i> (Spencer) Lindm.	Morelle noire (f.) [Crève-chien]	I	?	DD						
SOLANACEAE	<i>Solanum nigrum</i> L. subsp. <i>nigrum</i> var. <i>nigrum</i> f. <i>nigrum</i>	Morelle noire (f.) [Crève-chien]	I	C	LC						
SOLANACEAE	<i>Solanum nigrum</i> L. subsp. <i>schultesii</i> (Opiz) Wessely	Morelle de Schultes [Crève-chien]	A	E?	H						
SOLANACEAE	<i>Solanum physalifolium</i> Rusby	Morelle à feuilles de coqueret	A	E?	H						
SOLANACEAE	<i>Solanum physalifolium</i> Rusby var. <i>nitidibaccatum</i> (Bitter) Edmonds	Morelle à baies luisantes	A	E?	H						
SOLANACEAE	<i>Solanum rostratum</i> Dun.	Morelle rostrée	A	E	H						
SOLANACEAE	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Morelle tubéreuse [Pomme de terre]	C(S)	?	H	a	CC				
SOLANACEAE	<i>Solanum villosum</i> Mill.	Morelle velue (s.l.)	A	D	H						
SOLANACEAE	<i>Solanum villosum</i> Mill. subsp. <i>miniaturum</i> (Bernh. ex Willd.) Edmonds	Morelle ailée	??	??	??						
SOLANACEAE	<i>Solanum villosum</i> Mill. subsp. <i>villosum</i>	Morelle velue	??	??	??						
SPARGANIACEAE	<i>Sparganium angustifolium</i> Michaux	Rubaniér à feuilles étroites	E								
SPARGANIACEAE	<i>Sparganium emersum</i> Rehm.	Rubaniér simple	I	R	VU			oui			R
SPARGANIACEAE	<i>Sparganium erectum</i> L.	Rubaniér rameux (s.l.)	I	PC	LC						
SPARGANIACEAE	<i>Sparganium erectum</i> L. subsp. <i>erectum</i>	Rubaniér rameux	I	?	DD						
SPARGANIACEAE	<i>Sparganium erectum</i> L. subsp. <i>neglectum</i> (Beeby) K. Richt.	Rubaniér négligé	I	PC	LC						
SPARGANIACEAE	<i>Sparganium natans</i> L.	Rubaniér nain	I	D	EX			(oui)			(R)
STAPHYLEACEAE	<i>Staphylea pinnata</i> L.	Staphylier penné [Faux-pistachier]	C(NS)	E?	H	j	?				
TAMARICACEAE	<i>Tamarix gallica</i> L.	Tamaris de France	C(S?)	?	H	pj	?				
THYMELAEACEAE	<i>Daphne laureola</i> L.	Daphné lauréole [Laurier des bois]	I	AC	LC						
THYMELAEACEAE	<i>Daphne mezereum</i> L.	Daphné mézéréon [Bois-gentil]	I	R	VU			oui		C0	R

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
THYMELAEACEAE	<i>Thymelaea passerina</i> (L.) Coss. et Germ.	Passerine annuelle	I	D	EX			(oui)			(R)
TILIACEAE	<i>Tilia cordata</i> Mill.	Tilleul à petites feuilles	I(N?C)	AC?	DD	pj	?				
TILIACEAE	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tilleul à larges feuilles (s.l.)	NC(I?)	PC	NE	p(j)	?				
TILIACEAE	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop. subsp. <i>cordifolia</i> (Besser) C.K. Schneider	Tilleul à feuilles cordées	NC(I?)	PC	NE	p(j)	?				
TILIACEAE	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop. subsp. <i>platyphyllos</i>	Tilleul à larges feuilles	??	??	??						
TILIACEAE	<i>Tilia ×europaea</i> L. [<i>Tilia cordata</i> Mill. × <i>Tilia platyphyllos</i> Scop.]	Tilleul de Hollande	C(I?S)	?	H	j(p)	AC				
TROPAEOLACEAE	<i>Tropaeolum majus</i> L.	Capucine à grandes fleurs [Grande capucine]	C(S)	?	H	j	P				
TYPHACEAE	<i>Typha angustifolia</i> L.	Massette à feuilles étroites	I	R	VU			oui			R
TYPHACEAE	<i>Typha latifolia</i> L.	Massette à larges feuilles	I	C	LC						
TYPHACEAE	<i>Typha minima</i> Funck	Massette naine	C		H	p	E				
TYPHACEAE	<i>Typha ×glauca</i> Godr. [<i>Typha latifolia</i> L. × <i>Typha angustifolia</i> L.]	Massette glauque	I	E?	H						
ULMACEAE	<i>Ulmus glabra</i> Huds.	Orme des montagnes	I(C)	AR	LC	p	?				
ULMACEAE	<i>Ulmus laevis</i> Pallas	Orme lisse	C(N?)	E	H	p	?				
ULMACEAE	<i>Ulmus minor</i> Mill.	Orme champêtre	I(NC)	CC	LC	p	?				
ULMACEAE	<i>Ulmus minor</i> Mill. var. <i>cornubiensis</i> (Weston) Richens	Orme champêtre (var.)	??	??	??						
ULMACEAE	<i>Ulmus minor</i> Mill. var. <i>minor</i>	Orme champêtre (var.)	??	??	??						
ULMACEAE	<i>Ulmus minor</i> Mill. var. <i>vulgaris</i> (Ait.) Richens	Orme champêtre (var.)	??	??	??						
ULMACEAE	<i>Ulmus ×hollandica</i> Mill. [<i>Ulmus glabra</i> Huds. × <i>Ulmus minor</i> Mill.]	Orme de Hollande	I(N?C)	?	H	p	?				
URTICACEAE	<i>Parietaria judaica</i> L.	Pariétaire diffuse	I	PC	LC						
URTICACEAE	<i>Parietaria officinalis</i> L.	Pariétaire officinale	I	RR?	DD			oui			
URTICACEAE	<i>Soleirolia soleirolii</i> (Req.) Dandy	Helxine de Soleirol [Helxine]	C(NS)	E?	H	j	?				
URTICACEAE	<i>Urtica dioica</i> L.	Ortie dioïque [Grande ortie]	I	CC	LC						
URTICACEAE	<i>Urtica urens</i> L.	Ortie brûlante [Petite ortie]	I	PC?	DD						
VALERIANACEAE	<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.	Centranthe rouge	Z(SC)	AR	ZLC	j	?				
VALERIANACEAE	<i>Valeriana dioica</i> L.	Valériane dioïque	I	RR	CR			oui			R
VALERIANACEAE	<i>Valeriana repens</i> Host	Valériane rampante [Herbe aux chats]	I	AC	LC						
VALERIANACEAE	<i>Valeriana sambucifolia</i> Mikan f.	Valériane à feuilles de sureau	E								
VALERIANACEAE	<i>Valeriana wallrothii</i> Kreyer	Valériane des collines	I	R?	DD						
VALERIANACEAE	<i>Valerianella carinata</i> Loisel.	Valérianelle carénée	I	PC?	DD						
VALERIANACEAE	<i>Valerianella coronata</i> (L.) DC.	Valérianelle couronnée	A	E	H						

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
VALERIANACEAE	<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich	Valérianelle dentée	I	R	VU			oui			R
VALERIANACEAE	<i>Valerianella eriocarpa</i> Desv.	Valérianelle à fruits velus	I	RR	EN			oui			R
VALERIANACEAE	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Valérianelle potagère [Mâche]	I(C)	C	LC	a	AC				
VALERIANACEAE	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. var. <i>locusta</i>	Valérianelle potagère (var.) [Mâche]	I	C	LC						
VALERIANACEAE	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. var. <i>oleracea</i> (Schlecht.) Breistr.	Valérianelle potagère (var.) [Mâche]	C		H	a	AC				
VALERIANACEAE	<i>Valerianella rimosa</i> Bast.	Valérianelle à oreillettes	I	RR	EN			oui			R
VERBENACEAE	<i>Verbena officinalis</i> L.	Verveine officinale	I	C	LC						
VIOLACEAE	<i>Viola arvensis</i> Murray	Violette des champs [Pensée des champs]	I	CC	LC						
VIOLACEAE	<i>Viola canina</i> L.	Violette des chiens (s.l.)	I	R	NT			oui			
VIOLACEAE	<i>Viola canina</i> L. subsp. <i>canina</i>	Violette des chiens	I	R	NT			oui			
VIOLACEAE	<i>Viola canina</i> L. subsp. <i>canina</i> var. <i>canina</i>	Violette des chiens (var.)	I	R	NT			oui			
VIOLACEAE	<i>Viola curtisii</i> E. Forster	Violette de Curtis [Pensée des dunes]	I	D	EX			(oui)		N2	(R)
VIOLACEAE	<i>Viola hirta</i> L.	Violette hérissée (s.l.)	I	C	LC						
VIOLACEAE	<i>Viola hirta</i> L. subsp. <i>hirta</i>	Violette hérissée	I	C	LC						
VIOLACEAE	<i>Viola hispida</i> Lam.	Violette de Rouen [Pensée de Rouen]	I(C)	RR	CR	pj	E?	oui		H2!;B;N1	E(E);F1(V);R
VIOLACEAE	<i>Viola odorata</i> L.	Violette odorante	I(N?C)	AC?	DD	j	?				
VIOLACEAE	<i>Viola odorata</i> L. f. <i>albiflora</i> Oborny	Violette odorante (f.)	I(N?C)	?	DD	j	?				
VIOLACEAE	<i>Viola odorata</i> L. f. <i>odorata</i>	Violette odorante (f.)	I(N?C)	AC?	DD	j	?				
VIOLACEAE	<i>Viola palustris</i> L.	Violette des marais	I	D	EX			(oui)			(R)
VIOLACEAE	<i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau	Violette de Reichenbach	I	C?	DD						
VIOLACEAE	<i>Viola riviniana</i> Reichenb.	Violette de Rivinus	I	C	LC						
VIOLACEAE	<i>Viola riviniana</i> Reichenb. var. <i>nemorosa</i> Neuman, Wahlst. et Murb.	Violette de Rivinus (var.)	??	??	??						
VIOLACEAE	<i>Viola riviniana</i> Reichenb. var. <i>riviniana</i>	Violette de Rivinus (var.)	I	C	LC						
VIOLACEAE	<i>Viola tricolor</i> L.	Violette tricolore [Pensée sauvage]	I	E?	DD			oui			
VIOLACEAE	<i>Viola</i> × <i>bavarica</i> Schrank [<i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau × <i>Viola riviniana</i> Reichenb.]	Violette de Bavière	??	??	??						
VIOLACEAE	<i>Viola</i> × <i>contempta</i> Jord. [<i>Viola arvensis</i> Murray × <i>Viola tricolor</i> L.]	Violette méprisée	??	??	??						
VIOLACEAE	<i>Viola</i> × <i>wittrockiana</i> Gams ex Kappert	Violette de Wittrock [Pensée des fleuristes]	C(S)	?	H	j	CC				
VITACEAE	<i>Parthenocissus inserta</i> (A. Kerner) Fritsch	Vigne-vierge commune	C(N?S)	?	H	j	?				
VITACEAE	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch.	Vigne-vierge à cinq feuilles	E?(N?SC)	(?)	(H)	j	?				
VITACEAE	<i>Vitis vinifera</i> L.	Vigne porte-vin (s.l.)	C(S)	RR?	H	a	RR?			[N1p]	

Famille	Taxon	Nom commun	Stat. HN	Rar. HN	Men. HN	Us. cult. HN	Freq. cult. HN	Patrim. HN	Invas. HN	Legisl.	L. rouges
VITACEAE	<i>Vitis vinifera</i> L. subsp. <i>vinifera</i>	Vigne porte-vin [Vigne]	C(S)	RR?	H	a	RR?				
ZANNICHELLIACEAE	<i>Zannichellia palustris</i> L.	Zannichellie des marais (s.l.)	I	R	NT			oui			Rp
ZANNICHELLIACEAE	<i>Zannichellia palustris</i> L. subsp. <i>palustris</i>	Zannichellie des marais	I	R	NT			oui			
ZANNICHELLIACEAE	<i>Zannichellia palustris</i> L. subsp. <i>pedicellata</i> (Wahlenb. et Rosén) Hegi	Zannichellie pédicellée	I	RR	EN			oui			R
ZOSTERACEAE	<i>Zostera marina</i> L.	Zostère marine	I	D	EX			(oui)			(R)
ZOSTERACEAE	<i>Zostera marina</i> L. var. <i>marina</i>	Zostère marine (var.)	I	D	EX			(oui)			(R)
ZOSTERACEAE	<i>Zostera marina</i> L. var. <i>stenophylla</i> Aschers. et Graebn.	Zostère marine (var.)	??	??	??			[(oui)]			[(R)]